

Bipacksedel: information till patienten

Campral, magsaftresistenta tabletter 333 mg  
akamprosat

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar ta detta läkemedel eftersom det finns viktig information i för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kanske behöver läsa den igen senare.
- Har du fler frågor? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.
- Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det endast är förskrivet till dig. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du biverkningar som nämns i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte nämns i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

Innehåll av denna bipacksedel:

1. Vad är Campral och vad används detta läkemedel för?
2. När ska du inte ta detta läkemedel eller vara extra försiktig med det?
3. Hur tar du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar.
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad är Campral och vad används detta läkemedel för?

Campral är ett läkemedel från gruppen av läkemedel som används vid alkoholberoende. Campral minskar suget efter alkohol.

Campral ordineras vid behandling av kronisk alkoholism och fungerar som stöd för psyko-social vägledning för att förhindra återfall i alkoholanvändning. Behandlingen med Campral påbörjas direkt efter avgiftningskuren.

2. När ska du inte ta detta läkemedel eller vara extra försiktig?

När ska du inte använda detta läkemedel?

Du är allergisk mot något av innehållsämnen i detta läkemedel. Dessa ämnen finns listade i avsnitt 6.

Vid allvarliga njurproblem..

När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?

Under den fysiska avgiftningsperioden. Det är meningslöst att

Under den fysiska abstinensperioden. Det är meningslöst att Campral under denna period eftersom det då inte har någon effekt. –

Vid barn eller äldre.

Vid njurproblem: hos patienter med måttliga njurproblem kan det vara nödvändigt att justera dosen.

Vid allvarliga leverproblem

Hos patienter med alkoholberoende kan symtom på nedstämdhet (depression) och självmordstankar uppstå. Kontakta omedelbart din läkare vid sådana symtom.

Familjemedlemmar och anhöriga bör omedelbart söka medicinsk rådgivning vid förekomst av dessa symtom.

Tar du andra läkemedel?

Det finns inga kända interaktioner med andra läkemedel.

Tar du förutom Campral andra läkemedel och har du det nyligen gjort eller finns det möjlighet att du i den närmaste framtiden kommer att ta andra läkemedel? Berätta det då för din läkare eller apotekare. Detta gäller även läkemedel som du kan få utan recept.

Vad ska du tänka på med mat, dryck och alkohol?

Mat påverkar mängden acamprosat som tas upp i kroppen. Ändå bör Campral tas med mat eftersom det då tolereras bättre.

Samtidig användning av Campral och alkohol har ingen interaktion som följd.

Graviditet, amning och fertilitet

Är du gravid, tror du att du är gravid, vill du bli gravid eller ammar du? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du använder detta läkemedel.

Effekten av Campral under graviditet är inte känd. Därför får Campral endast användas efter noggrann övervägning av fördelar och risker under graviditet.

Effekten av Campral vid amning är inte känd, därför får Campral bör inte användas vid amning.

Hittills har inga skadliga effekter observerats i djurförsök. Det är inte känt om Campral påverkar fertiliteten hos människor.

Campral innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 4,2 mg propylenglykol per tablett.

Campral innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, vilket innebär att det i huvudsak är 'natriumfritt'.

3. Hur tar du detta läkemedel?

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningarna från din läkare eller apotekare. Är du osäker på hur du ska använda det? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Din läkare kommer att ordinera doseringen. Följ noggrant din läkares råd när du tar Campral.

Rådfråga din läkare eller apotekare vid tveksamhet. Den vanliga doseringen är:

För vuxna upp till 60 kg är doseringen 4 tabletter Campral per dag. Ta tabletterna under måltid enligt följande:

2 tabletter på morgonen, 1 tablett på eftermiddagen och 1 tablett på kvällen.

För vuxna från 60 kg är doseringen 6 tabletter per dag. Ta tabletterna under måltid enligt följande:

2 tabletter på morgonen, 2 tabletter på eftermiddagen och 2 tabletter på kvällen.

För patienter med måttliga njurproblem kan det vara nödvändigt att justera dosen. Startdosen är då som följer:

1 tablett på morgonen, 1 tablett på eftermiddagen och 1 tablett på kvällen (under måltid).  
Diskutera detta först med din läkare.

Inte tugga.

Om du märker att Campral är för starkt eller för svagt, kontakta din läkare eller apotekare.

Den rekommenderade behandlingstiden är 1 år. Behandlingen med Campral bör startas så snart som möjligt efter avvänjningsperioden. Om du ändå använder alkohol kortvarigt, fortsätt att ta Campral som vanligt.

Har du tagit för mycket av detta läkemedel?

Om du har tagit för mycket av Campral, kontakta omedelbart din läkare eller apotekare.

Diarré kan eventuellt tyda på en överdosering.

Har du glömt att ta detta läkemedel?

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

Om du slutar ta detta läkemedel

Rådfråga alltid din läkare om du överväger att sluta använda Campral.

#### 4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel ha biverkningar, men alla användare får inte dem.

Biverkningar kan:

- mycket vanliga (hos fler än 1 av 10 patienter);
- vanliga (hos fler än 1 av 100, men hos färre än 1 av 10 patienter);
- ibland förekommande (hos fler än 1 av 1.000, men hos färre än 1 av 100 patienter);
- sällsynta (hos fler än 1 av 10.000, men hos färre än 1 av 1.000 patienter);
- mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10 000 patienter).

Följande biverkningar är mycket vanliga:

Diarré

Följande biverkningar är vanliga:

Buksmärtor, illamående, kräkningar, gasbildning, klåda, hudutslag med fläckar och knölar (makulopapulöst utslag), sexuell okänslighet (frigiditet) eller impotens, minskad lust till samlag/sex (libido)

Följande biverkningar är ibland förekommande:

Ökad lust till samlag/sex (libido)

Mycket sällsynta är:

Överkänslighetsreaktioner inklusive hudutslag med intensiv klåda och bildning av knölar (nässelutslag eller urtikaria), plötslig vätskeansamling i hud och slemhinnor (t.ex. hals eller tunga), andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag, ofta som en allergisk reaktion (angioödem) eller kraftig blodtrycksfall, blekhet, oro, svag snabb puls, kallsvettig hud, nedsatt medvetande på grund av en plötslig kraftig kärlutvidgning till följd av allvarlig överkänslighet mot vissa ämnen (anafylaktiska reaktioner).

Om någon av biverkningarna blir allvarlig eller om du upplever biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur förvarar du detta läkemedel?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet. Det står på kartongen och blistret efter "EXP". Det anges med en månad och ett år. Sista dagen i den månaden är utgångsdatumet.

Spola inte ner läkemedel i avloppet eller toaletten och släng dem inte i soporna. Fråga din apotekspersonal vad du ska göra med läkemedel som du inte längre använder. De förstörs på ett ansvarsfullt sätt och hamnar inte i miljön.

6. Förpackningens innehåll och övrig information

Vilka ämnen finns i detta läkemedel?

- Den aktiva substansen i detta läkemedel är akamprosot.
- De andra ämnena i detta läkemedel är kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, magnesiumsilikat, natriumstärkelseglykolat, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, polyakrylatharts, talk och propylenglykol.

Hur ser Campral ut och hur mycket finns det i en förpackning?

Campral är en filmdragerad, magsaftresistent tablett. Tabletterna är vita och runda och är förpackade i kartonger med 7 blisterförpackningar (PVC/PVDC Aluminium) med 12 tabletter vardera.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck BV

Tupolevlaan 41-61

1119 NW Schiphol-Rijk

Tillverkare

Merck Santé s.a.s.

Semoy 45400

Frankrike

Registrerad under: RVG 18220

Denna bipacksedel godkändes senast i februari 2021

Transtoyou