

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

Canesten gyno 3, kreem vaginaalseks kasutamiseks 20 mg/g

Canesten gyno 3, tablett vaginaalseks kasutamiseks 200 mg

Toimeaine: klotrimasool

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab teile olulist teavet.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.

Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on ette nähtud ainult teile.

See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samadkaebused nagu teil. u.

Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või kas teil mõni kõrvaltoime mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Sisu selle infolehe Mis on

1. Canesten gyno 3 ja milleks seda ravimit kasutatakse Mida peate teadma enne selle ravimi kasutamist
2. Kuidas seda ravimit kasutada?
3. Võimalikud
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS ON Canesten gyno 3 JA MILLEKS SEDA RAVIMIT KASUTATAKSE

Canesten gyno 3 sisaldab toimeainena klotrimasool. Klotrimasool on aine, mis teatud seene- või pärmiliike tapab või nende kasvu pidurdab.

Teie arst on diagnoosinud teil seeninfektsiooni tupes (vagiinas). Kõige sagedasem põhjustaja on Candida albicans. See seen on tavaliselt nahal olemas ja võib teatud tingimustel põhjustada kaebusi, nagu tekke tupest väljumine, tundud kui valgevoolus. Canesten gyno 3 kasutatakse tupeinfektsioonide korral, mis on põhjustatud teatud seene- või pärmiliikidest.

2. MIDA TE PEATE TEADMA ENNE SELLE RAVIMI KASUTAMIST

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes, nagu tsetüülstearüülalkohol.

Neid aineid leiate jaotisest 6. Millal peate selle ravimiga olema eriti ettevaatlik? Canesten gyno 3 vaginaalset kreemi ja Canesten gyno 3 vaginaalset tabletti ei tohi menstruatsiooni ajal kasutada, kuna siis ei saa täielikult toimekindlusele tugineda. Seetõttu veenduge, et kuur oleks enne seda aega lõpetatud.

See vahend sisaldab 2 grammi bensüülalkoholi iga 100 grammi kreemi kohta, mis vastab 20

mg/g kreemi. Bensüülalkohol võib põhjustada kerget kohalikku ärritust.

Vaginaalset kreemi ei tohi kasutada ülitundlikkuse korral setüülstearüülalkoholisuhtes, kuna see aine on kreemi abiaineks. Sel juhul võib kasutada vaginaaltabletti. Setüülstearüülalkohol võib põhjustada kohalikke nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

Canesten gyno 3 kreem ja tablett võivad vähendada kummitoodete nagu kondoomid ja pessaarid tõhusust ja ohutust. Mõju on ajutine ja esineb ainult ravi ajal.

Canesten gyno 3 kasutamine koos teiste ravimitega Ei ole teada koostoimeid 3 koos teiste ravimitega Ei ole koostoimeid Canesten gyno 3 teiste ravimitega teada.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate teisi ravimeid või hiljuti onkasutanud. See kehtib ka ravimite kohta, mida saate ilma retseptita kasutada. Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Canesten

gyno 3 võib teadaolevalt kasutada ohutult lootele soovitatud annustes raseduse ajal, kui see on vajalik. Raseduse ajal tuleks vältida aplikaatori kasutamist ja eelistada vaginaalsete tablettide manustamist käsitsi. Vaginaalset tabletti saab käsitsi sisestada. 3 võib teadaolevalt kasutada raseduse ajal soovitatud annustes ilma ohuta lootele, kui see on vajalik. Raseduse ajal tuleks aplikaatori kasutamist vältida ja eelistada vaginaalsete tablettide manustamist käsitsi. Vaginaalset tabletti saab käsitsi sisestada.

Canesten

gyno 3 võib kasutada vastavalt ettekirjutusele imetamise ajal. viljakus imetamine.

Viljakus

Inimeste seas ei ole läbi viidud uuringuid klotrimasooli mõju kohta viljakusele, kuid loomkatsed ei ole näidanud ravimi mõju viljakusele tõestatud.

Kas olete rase, arvate, et võite olla rase, plaanite rasestuda või toidate last rinnaga? Võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Ei ole oodata, et see ravim mõjutaks neid funktsioone.

3. KUIDAS SEDA RAVIMIT KASUTADA?

Järgige Canesten Gyno 3 kasutamisel täpselt oma arsti nõuandeid. Kahtluse korral pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Canesten gyno 3 vaginaalkreem

Üldiselt on teie arsti ettekirjutus järgmine: kolm järjestikust päeva üks kord päevas – õhtul enne magamaminekut – sisestada üks aplikaatori täis (u. 5 grammi) vaginaalkreemi võimalikult sügavale tuppe. Iga manustamise jaoks tuleb kasutada uut aplikaatorit, mis seejärel võib ära visata.

Canesten gyno 3 vaginaaltabletti

Üldiselt on teie arsti ettekirjutus: kolm järjestikust päeva üks kord päevas - õhtul enne magamaminekut - üks Canesten gyno 3 vaginaaltabletti võimalikult sügavale tuppe sisestada.

Kui infektsioon on levinud ka väljapoole tuppe, häbememokkade ümber, võib arsti ettekirjutusel lisaks uuesti nakatumistvältida, kasutades klotrimasool kreemi vaginaalseks kasutamiseks 10 mg/g. Kandke seda kreemi kaks korda päevas õhukeselt kahjustatud kohtadele umbes ühe nädala jooksul.

Kasutusjuhend

Vaginaalse kreemi ja vaginaaltableti sisestamine on kõige parem teha selili asendis kergelt tõstetud ja laiali sirutatud jalgadega.

Canesten gyno 3 vaginaalkreemi manustatakse järgmiselt:

1. Avage tuub, surudes tuubi korgi tagurpidi alumiiniumist sulgemise kaudu.
2. Tõmmake aplikaatori varras tõkkeni välja.
3. Asetage aplikaator tuubi peale, hoidke kindlalt ja täitke täielikult, pigistades ettevaatlikult tuubi. ettevaatlikult tuubi pigistada.
4. Eemaldage aplikaator tuubist, sisestage see võimalikult sügavale tuppe (parim lamavas asendis) ja tühjendage, vajutades varrast. Eemaldage aplikaator ja visake ära.
5. Canesten

gyno 3 vaginaaltabletti manustatakse järgmiselt: Manustamine kaasasoleva aplikaatori abil

Aplikaatorit kasutatakse tableti võimalikult sügavale tuppe viimiseks, eelistatavalt enne magamaminekut.

Peske käed enne, kui võtate vaginaaltableti ja aplikaatori pakendist välja, ja pärast aplikaatori kasutamist.

Võtke aplikaator pakendist välja ja tõmmake varras

1. Eemaldage aplikaator pakendist ja tõmmake pulka punase lukustuseni välja. punane lukustus välja.
2. Seejärel eemaldage varrast lukustus ja asetage aplikaator ettevaatlikult tuppe kuni sälguni.
3. Hoidke aplikaatorit sälgu juures ja suruge varrast ettevaatlikult täielikult sisse, kuni see enam edasi ei liigu, et vaginaaltablett sisestada.
4. Pärast kasutamist võtke osad lahti ja peske neid põhjalikult soojas (mitte keeva) seebivees. Loputage neid 30 sekundit puhta veega ja pühkige osad hoolikalt kuivaks. Hoidke puhtas ja ohutus kohas. Taaskasutamiseks veenduge, et punane lukustus on vardale tagasi pandud, ja korrake protsessi alates 2. sammust. Visake aplikaator pärast viimast kasutamist ohutusse kohta, laste käeulatuses välja. Aplikaatorit ei tohi tualetist alla lasta.
5. Pärast kasutamist võtke osad lahti ja peske neid põhjalikult soojas (mitte keeva) seebivees. Loputage neid 30 sekundit puhta veega ja pühkige osad hoolikalt kuivaks. Hoidke seda puhtas ja ohutus kohas. Taaskasutamiseks veenduge, et punane lukustus oleks pulgale

tagasi pandud ja korrake protsessi alates 2. sammust. Visake aplikaator pärast viimast kasutamist ohutusse kohta, lastele kättesaamatusse kohta. Aplikaatorit ei tohi tualetist alla lasta.

Manustamine ilma aplikaatorita

Hoidke vaba käega häbememokad lahus ja suruge tablett kumer pool ülespoole ja sõrmega tableti lamedale küljele ettevaatlikult nii sügavale tuppe kui võimalik.

Üldine

Partnerit tuleb peenise infektsiooni korral ravida seenevastase kreemiga, et vältida vastastikust nakatumist.

Püsivate infektsioonide korral tuleb mõelda võimalikule nakatumisele pärasoolekaudu, mis tuleb siis ravida.

Tabletid vajavad lahustumiseks niiskust tupes.

Lahustumata tableti osakesed võivad tupest erituda. Selle vältimiseks on oluline tablett võimalikult sügavale tuppe viia, enne magamaminekut. Kui tablett ei lahustu ühe ööga, võib kaaluda kasutamist klotrimasooli sisaldava kreemi. Kui märkate, et

Canesten gyno 3 on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 3 liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Konsulteerige arstiga kui sümptomid püsivad kauem kui 7 päeva.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Üleannustamise juhtumeid ei ole teada, kui kasutatakse Canesten gyno 3 vastavalt kasutusjuhendile. Konsulteerige oma arstiga, kui tablett on kogemata suu kaudu võetud.

Kahtluse korral võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kas unustasite seda ravimit kasutada? Sellisel juhul võite kasutada tavalist annust järgmisel järgmine 4. **VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu iga ravim, võib ka see

ravim põhjustada kõrvaltoimeid, ravimi kõrvaltoimed kasutamise ajal klotrimasool.

Immuunsüsteemi häired: ülitundlikkus, mis võib rasketel juhtudel põhjustada huulte, keele ja kurgu turset või anafülaktilist reaktsiooni (võib kaasneda iiveldus, kõhulahtisus, madal vererõhk, hingamisraskused, teadvusetus). hingamine, teadvusetus).

Naha- ja nahaaluskoe häired: punane nahk, sügelev lööve, nahalööve, kipitav/põletav tunne nahal.

Üldised häired ja manustamiskoha häired: ärritus või reaktsioon manustamiskohal, vedelikupeetus. Kreemi ja tableti kasutamisel võib partneril tekkida peenise ärritus. manustamiskohtPaljunemis- ja

rinnanäärmete häired: vaginaalne veritsus. Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles pakendi infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest võite ka

otse 5. KUIDAS SEDA RAVIMIT SÄILITADA?

5. KUIDAS SEDA RAVIMIT SÄILITADA?

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jaaks Canesten gyno 3 kreemile ei ole eritingimusi säilitamiseks. Hoida Canesten gyno 3 tabletti alla 25°C. Pärast tuubi avamist on Canesten gyno 3 kreem, 3 kuud kasutuskõlblik.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud karbil, tuubil või blistril pärast "EXP.". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei vaja. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Millised ained on selles ravimis?

Canesten gyno 3 on ravim, mis on saadaval kahes vormis, vaginaalne kreem ja vaginaalne tablett. Selle ravimi toimeaine on klotrimasool.

Selle ravimi teised abiained on:

Canesten gyno 3 kreem: sorbiitstearaat (E 491), polüsorbaat 60 (E 435), setüülstearüülalkohol, setüülpalmiit, 2-oktildodekanool, bensüülalkohol, vesi.

Canesten gyno 3 tablett: kaltsiumlaktaat (E327), kolloidne ränidioksiid (E551), krospovidoon (E1202), laktoos, magneesiumstearaat (E470B), maisitärklis, piimhape (E270), mikrokristalne tselluloos (E460 (i)), hüpromelloos (E464).

Kuidas näeb välja Canesten gyno 3 välja ja kui palju on pakendis?

Canesten gyno 3 vaginaalkreem on saadaval pakendis, mis sisaldab 20 grammi kreemi ja 3 aplikaatorit.

Canesten gyno 3 vaginaaltablett on saadaval pakendis, mis sisaldab 3 tabletti ja aplikaatorit.

Müügiloa hoidja ja tootja

Registreerija: Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp

Teabe saamiseks: Consumer Health Division, Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp.

Tootja

Canesten gyno 3 kreem: Kern Pharma, s.l, Terrassa, Hispaania.

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksamaa.

Canesten gyno 3 tabletti: GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksamaa.

Canesten gyno 3 vaginaalkreem on registreeritud kantud RVG 08935 all.

Canesten gyno 3 vaginaaltablett on registreeritud kantud RVG 08934 all.

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud augustis 2022.

Transtoyou