

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Canesten gyno 3, emätinvoide 20 mg/g
Canesten gyno 3, emätintabletti 200 mg
Vaikuttava aine: klotrimatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, koska se sisältää tärkeitä tietoja sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle.

määrättySe voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi sama kuin sinulla. u.

Onko sinulla jokin kohta 4 mainituista haittavaikutuksista? Tai onko sinulla jokin haittavaikutus jota ei ole tässä pakkausselosteessa? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Sisältö tästä pakkausselosteesta Mitä

1. Canesten gyno 3 on ja mihin tätä lääkettä käytetään Mitä sinun on tiedettävä ennen tämän lääkkeen käyttöä
2. Kuinka käytät tätä lääkettä?
3. Mahdolliset
4. Mahdollinen sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ ON Canesten gyno 3 JA MIHIN TÄTÄ LÄÄKETTÄ KÄYTETÄÄN

Canesten gyno 3 sisältää vaikuttavana aineena klotrimatsoli. Klotrimatsoli on aine, joka tiettyjä sieni- tai hiivalajeja tappaa tai estää niiden kasvua.

Lääkärisi on todennut sinulla emättimen (vagina) sieni-infektion. Yleisin esiintyvä aiheuttaja on Candida albicans. Tämä sieni on normaalisti iholla läsnä ja voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa oireita, kuten syntymistä emätinvuodosta, joka tunnetaan valkovuotona. Canesten gyno 3 käytetään emättimen infektioiden, jotka johtuvat tietyistä sieni- tai hiivalajeista.

2. MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle, kuten setyylistearyylialkoholi.

Nämä aineet löydät kohdasta 6. Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa? Canesten gyno 3 emättimen voide ja Canesten gyno 3 emätintabletti eivät saa kuukautisten aikana, koska silloin ei voida täysin luottaa tehoon. Varmista siksi, että kuuri on päättynyt ennen sitä aikaa.

Tämä valmiste sisältää 2 grammaa bentsyylialkoholia jokaista 100 grammaa voidetta kohden, mikä vastaa 20 mg/g voidetta. Bentsyylialkoholi voi aiheuttaa lievää paikallista ärsytystä.

Emätinvoidetta ei saa käyttää yliherkkyyden sattuessa setyylistearyylialkoholille, koska tämä aine on käytetty voiteen apuaineena. Tällöin voidaan käyttää emätintablettia. Setyylistearyylialkoholi voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Canesten gyno 3 voide ja tabletti voivat heikentää kumituotteiden, kuten kondomien ja pessaarien, tehoa ja turvallisuutta. Vaikutus on tilapäinen ja ilmenee vain hoidon aikana.

Canesten gyno 3:n käyttö yhdessä muiden lääkkeiden kanssa Ei ole havaittu yhteisvaikutuksia 3 yhdessä muiden lääkkeiden kanssa Ei ole yhteisvaikutuksia Canesten gyno 3 muiden lääkkeiden kanssa tunnettu.

Kerro lääkäriillesi tai apteekkarillesi, jos käytät muita lääkkeitä tai äskettäin oletkäyttänyt. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita voit käyttää ilman reseptiä. Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Canesten

gyno 3 voidaan, tietävästi, käyttää ilman vaaraa sikiölle suositellulla annoksella raskauden aikana, jos tarpeen. Raskauden aikana applikaattorin käyttöä tulee välttää ja emätintablettien asettaminen käsin on suositeltavaa. Emätintabletti voidaan asettaa käsin. 3 voidaan, siltä osin kuin tiedetään, käyttää suositellulla annoksella ilman vaaraa sikiölle raskauden aikana, jos tarpeen. Raskauden aikana applikaattorin käyttöä tulee välttää, ja emätintablettien asettaminen käsin on suositeltavaa. Emätintabletti voidaan asettaa käsin.

Canesten

gyno 3 voidaan käyttää ohjeen mukaisesti imetyksen aikana. hedelmällisyys imetys.

Hedelmällisyys

Ihmisillä ei ole tehty tutkimuksia vaikutuksista klotrimatsoli hedelmällisyyteen, mutta eläintutkimukset eivät ole osoittaneet lääkkeen vaikutusta hedelmällisyyteen, mutta eläinkokeet eivät ole osoittaneet lääkkeen vaikutusta hedelmällisyyteen osoitettu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei ole odotettavissa, että tämä lääke vaikuttaisi näihin toimintoihin.

3. KUINKA KÄYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

Ei ole odotettavissa, että tämä lääke vaikuttaisi näihin toimintoihin.

Canesten

Gyno Canesten Canesten 3 noudata tarkasti lääkärisi ohjeita. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

3 emätinvoide Yleensä lääkärisi määräys on: kolmen peräkkäisen päivän ajan kerran päivässä – illalla ennen nukkumaanmenoa – yksi applikaattoritäyte (n. 5 grammaa) emätinvoidetta mahdollisimman syväälle emättimeen. Jokaista annostelua varten tulee käyttää uutta applikaattoria, joka voidaan sen jälkeen hävittää. 3 emätinvoide

Yleensä lääkärisi määräys on seuraava: kolmen peräkkäisen päivän ajan kerran päivässä – illalla ennen nukkumaanmenoa – yksi applikaattorin täyttö (n. 5 grammaa) emätinvoidetta asetetaan mahdollisimman syväälle emättimeen. Jokaista annostelua varten on käytettävä uutta applikaattoria, joka voidaan sen jälkeen hävittää.

Canesten gyno 3 emätintablettia

Yleensä lääkärisi määräys on: kolmen peräkkäisen päivän ajan kerran päivässä - illalla ennen nukkumaanmenoa - yksi Canesten gyno 3 emätintablettia asetetaan mahdollisimman syväälle emättimeen.

Kun infektio on levinnyt myös emättimen ulkopuolelle, häpyhuulten ympärille, voidaan myös uudelleeninfektion estämiseksi uudelleeninfektio, lääkärin määräyksestä lisäksi klotrimatsoli voide emättimen käyttöön 10 mg/g voidaan käyttää. Levitä tätä voidetta ohuesti kahdesti päivässä kärsineille alueille noin viikon ajan.

Käyttöohje

Emättimen voiteen ja emätintabletin asettaminen on parasta tehdä selinmakuulla, hieman kohotetuilla ja levitettyinä jaloin.

Canesten gyno 3 emätinvoide annostellaan seuraavasti:

1. Avaa tuubi painamalla korkki käännettynä alumiinikalvon läpi.
2. Vedä applikaattorin tankoa pysäyttimeen asti.
3. Aseta applikaattori tuubiin, pidä tiukasti kiinni ja täytä kokonaan puristamalla varovasti tuubia. puristamalla varovasti tuubia.
4. Irrota applikaattori tuubista, vie se mahdollisimman syväälle emättimeen (mieluiten selinmakuulla) ja tyhjennä painamalla tankoa. Irrota applikaattori ja hävitä se.
5. Canesten

gyno 3 emätintablettia annetaan seuraavasti: Anto mukana toimitetun applikaattorin avulla

Applikaattoria käytetään tablettien viemiseen mahdollisimman syväälle emättimeen, mieluiten ennen nukkumaanmenoa.

Pese kätesi ennen kuin otat emätintabletin ja applikaattorin pakkauksesta ja sen jälkeen, kun olet käyttänyt applikaattoria.

Ota applikaattori pakkauksesta ja vedä tankoa

1. punaiselle lukitukselle asti. punainen lukitus pois.
2. Poista sitten lukitus tangosta ja aseta applikaattori varovasti emättimeen loven kohdalle asti.

3. Pidä kiinni applikaattorin lovesta ja työnnä emätintabletti sisään painamalla tankoa varovasti kokonaan sisään, kunnes se ei enää liiku.
4. Käytön jälkeen irrota osat toisistaan ja pese ne huolellisesti lämpimässä (ei kiehuva) saippuavedessä. Huuhtelee ne 30 sekunnin ajan puhtaalla vedellä ja kuivaa osat huolellisesti. Säilytä puhtaassa ja turvallisessa paikassa. Uudelleenkäyttöä varten varmista, että punainen lukitus on asetettu takaisin tankoon ja toista prosessi vaiheesta 2 alkaen. Hävitä applikaattori viimeisen käytön jälkeen turvallisesti lasten ulottumattomissa. Applikaattoria ei saa huuhdella alas wc:stä.
5. Irrota käytön jälkeen osat toisistaan ja pese ne huolellisesti lämpimässä (ei kiehuva) saippuavedessä. Huuhtelee ne 30 sekuntia puhtaalla vedellä ja pyyhi osat huolellisesti. Säilytä puhtaassa ja turvallisessa paikassa. Uudelleenkäyttöä varten varmista, että punainen lukitus on asetettu takaisin tikkuun ja toista prosessi kohdasta 2 alkaen. Hävitä applikaattori viimeisen käytön jälkeen turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa. Applikaattoria ei saa huuhdella alas wc:stä.

Antaminen ilman applikaattoria

Pidä häpyhuulet erillään vapaalla kädellä ja työnnä tabletti kupera puoli ylöspäin ja sormi tabletin litteää puolta vasten varovasti niin syväälle kuin mahdollista emättimeen.

Yleistä

Partneri tulee hoitaa peniksen infektion yhteydessä sienilääkkeellä voide estääkseen tartunnan molemminpuolisesti.

Pitkittyneiden infektioiden yhteydessä on syytä harkita mahdollista tartuntaa peräsuolen kautta, joka tulee hoitaa.

Tabletit tarvitsevat kosteutta emättimessä liuetakseen kokonaan.

Liuottamattomat tabletin osat voivat erittyä emättimestä. Tämän estämiseksi on tärkeää asettaa tabletti mahdollisimman syväälle emättimeen ennen nukkumaanmenoa. Jos tabletti ei liukene yhdessä yössä, voidaan harkita käyttämistä clotrimatsolia sisältävää voidetta. Jos huomaat, että

Canesten gyno 3 on liian vahva tai liian heikko, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 3 liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriisi tai apteekkiisi.

Kysy lääkäriltä jos oireet jatkuvat yli 7 päivää.

Oletko käyttänyt tätä lääkettä liikaa?

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu käytettäessä Canesten gyno 3 käyttöohjeiden mukaisesti. Ota yhteys lääkäriin, jos tabletti on vahingossa nielty suun kautta otettu.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä käyttä? Voit tällöin käyttää normaalin annoksen seuraavana ajankohtana. Älä käytä kaksinkertaista annosta unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saakaan. Seuraavat haittavaikutukset on todettu käytettäessä klotrimatsolia.

Immuunijärjestelmän häiriöt: yliherkkyys, vakavissa tapauksissa huulten, kielen ja kurkun turvotus tai anafylaktinen reaktio (voi mahdollisesti liittyä pahoinvointiin, ripuliin, alentuneeseen verenpaineeseen, hengitysvaikeuksiin, tajuttomuuteen). hengittää, tajuttomuus).

Iho- ja ihonalaiskudoksen häiriöt: punainen iho, kutiseva ihottuma, ihottuma, pistävä/polttava tunne iholla.

Yleiset häiriöt ja antopaikan häiriöt: ärsytys tai reaktio antopaikassa Reprodutiivisen järjestelmän ja

rintojen häiriöt: emättimen verenvuoto. Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Tämä koskee Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista

suoraan 5. MITEN SÄILYTÄT TÄMÄN LÄÄKKEEN?

5. KUINKA SÄILYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Varten Canesten gyno 3 voiteelle ei ole erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä Canesten gyno 3 tabletti alle 25°C. Avatun tuubin jälkeen Canesten gyno 3 voide on 3 kuukautta käyttökelpoinen.

Älä käytä tätä lääkettä enää viimeisen käyttöpäivän jälkeen, joka on merkitty pakkaukseen, tuubiin tai läpipainopakkaukseen "EXP." jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä viittaa kuukauden viimeiseen päivään.

Lääkkeitä ei tule hävittää jäteveden tai talousjätteen mukana. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita ei enää tarvita. Nämä toimenpiteet auttavat suojelemaan ympäristöä.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUT TIEDOT

Mitä aineita tämä valmiste sisältää?

Canesten gyno 3 on lääke, joka on saatavilla kahdessa muodossa, emätinvoiteena ja emätintablettina. Tämän valmisteen vaikuttava aine on ja emätinpuikko. Tämän valmisteen vaikuttava aine on klotrimatsoli.

Muut apuaineet tässä valmisteessa ovat:

Canesten gyno 3 voide: sorbiinihappostearaatti (E 491), polysorbaatti 60 (E 435),

setyylistearyylialkoholi, setyylipalmitaatti, 2-oktyylidodekanoli, bentsyylialkoholi, vesi.
Canesten gyno 3 tabletti: kalsiumlaktaatti (E327), kolloidinen piidioksidi (E551),
krospovidoni (E1202), laktoosi, magnesiumstearaatti (E470B), maissitärkkelys, maitohappo
(E270), mikrokiteinen selluloosa (E460 (i)), hypromelloosi (E464).

Miltä näyttää Canesten gyno 3 ulos ja kuinka paljon on pakkauksessa?

Canesten gyno 3 emätinvoide on saatavana pakkauksessa, joka sisältää 20
grammaa voidetta ja 3 applikaattoria.

Canesten gyno 3 emätintabletti on saatavana pakkauksessa, joka sisältää 3 tablettia ja yhden
applikaattorin.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Rekisteröinnin haltija: Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp

Lisätietoja: Consumer Health Division, Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp.

Valmistaja

Canesten gyno 3 voide: Kern Pharma, s.l, Terrassa, Espanja.

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa.

Canesten gyno 3 tabletti: GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen,
Saksa.

Canesten gyno 3 emätinvoide on rekisteröity numerolla RVG 08935.

Canesten gyno 3 emätintabletti on rekisteröity numerolla RVG 08934.

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty elokuussa 2022.