

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Canesten gyno 3, crème pour usage vaginal 20 mg/g
Canesten gyno 3, comprimé pour usage vaginal 200 mg
Substance active : clotrimazole

Lisez attentivement toute la notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Conservez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin plus tard.

Avez-vous encore des questions ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, car il vous a été prescrit. Cela pourrait être nocif pour d'autres personnes, même si elles ont les mêmes symptômes que vous.

Avez-vous des effets secondaires mentionnés dans la rubrique 4 ? Ou avez-vous des effets

secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Canesten gyno 3 et à quoi sert ce médicament
2. Ce que vous devez savoir avant d'utiliser ce médicament
3. Comment utiliser ce médicament ?
4. Effets secondaires
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE Canesten gyno 3 ET À QUOI SERT CE MÉDICAMENT

Canesten gyno 3 contient comme substance active clotrimazole. Le clotrimazole est une substance qui tue ou inhibe leur croissance certaines espèces de champignons ou de levures.

Votre médecin a diagnostiqué une infection fongique dans le vagin (vagin). Le plus fréquent responsable est *Candida albicans*. Ce champignon est normalement présent sur la peau et peut, dans certaines circonstances, causer des symptômes tels que l'apparition de pertes vaginales, connues sous le nom de leucorrhée. Canesten gyno 3 est utilisé pour les infections vaginales causées par certains types de champignons ou de levures.

2. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT

Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament?

Vous êtes allergique à l'une des substances contenues dans ce médicament, comme alcool cétylstéarylique.

Vous pouvez trouver ces substances à la rubrique 6. Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament? Canesten gyno 3 crème vaginale et Canesten gyno 3 comprimé

vaginal ne doivent pas pendant les menstruations, car on ne peut pas se fier entièrement à l'efficacité. Assurez-vous donc que le traitement est terminé avant cette période.

Ce médicament contient 2 grammes de benzylalcool pour chaque 100 grammes de crème, ce qui correspond à 20 mg/g de crème. Le benzylalcool peut provoquer une légère irritation locale.

La crème vaginale ne doit pas être utilisée en cas d'hypersensibilité à l'alcool cétylstéarylique, car cette substance est utilisée comme excipient dans la crème. Dans ce cas, le comprimé vaginal peut être utilisé. L'alcool cétylstéarylique peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, une dermatite de contact).

Canesten gyno 3 crème et comprimé peuvent réduire l'efficacité et la sécurité des produits en caoutchouc tels que les préservatifs et les diaphragmes. L'effet est temporaire et ne se produit que pendant le traitement .

Utilisation de Canesten gyno 3 en combinaison avec d'autres médicaments Il n'y a pas d'interactions de Canesten gyno 3 avec d'autres médicaments connus.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez d'autres médicaments ou récemment avez utilisé. Cela s'applique également aux médicaments que vous pouvez utiliser sans ordonnance. Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse

Canesten

gyno 3 peut, autant que l'on sache, être utilisé sans danger pour le fœtus à la posologie recommandée pendant la grossesse, si nécessaire. Pendant la grossesse, l'utilisation de l'applicateur doit être évitée et l'administration des comprimés vaginaux à la main est préférable. Le comprimé vaginal peut être inséré à la main. 3 peut, pour autant que l'on sache, être utilisé sans danger pour le fœtus à la posologie recommandée pendant la grossesse, si nécessaire. Pendant la grossesse, l'utilisation de l'applicateur doit être évitée et l'administration des comprimés vaginaux à la main est préférable. Le comprimé vaginal peut être inséré à la main.

Canesten

gyno 3 peut être utilisé conformément à la prescription pendant l' allaitement allaitement.

Fertilité

Aucune étude n'a été réalisée chez l'homme sur les effets de clotrimazole sur la fertilité, mais les études animales n'ont montré aucun effet du médicament sur la fertilité démontré.

Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte, souhaitez-vous le devenir ou allaitez-vous ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'est pas attendu que ce médicament ait une influence sur ces fonctions.

3. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Suivez les conseils de votre médecin lors de l'utilisation de Canesten Gyno 3. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Canesten gyno 3 crème vaginale

En général, la prescription de votre médecin sera : pendant trois jours consécutifs, une fois par jour - le soir avant de se coucher - introduire une dose d'applicateur (environ 5 grammes) de crème vaginale aussi profondément que possible dans le vagin. Pour chaque administration, un nouvel applicateur doit être utilisé, qui peut ensuite être jeté.

Canesten gyno 3 comprimé vaginal

En général, la prescription de votre médecin sera : pendant trois jours consécutifs, une fois par jour - le soir avant de se coucher - insérer un Canesten gyno 3 comprimé vaginal aussi profondément que possible dans le vagin.

Lorsque l'infection s'est également étendue à l'extérieur du vagin, autour des lèvres, il est possible, également pour prévenir une réinfection, sur prescription du médecin, d'appliquer en plus une crème de clotrimazole pour usage vaginal 10 mg/g. Appliquez cette crème en fine couche deux fois par jour sur les zones affectées pendant environ une semaine. pour usage vaginal 10 mg/g doivent être appliqués. Appliquez cette crème deux fois par jour en fine couche sur les zones affectées pendant environ une semaine.

Mode d'emploi

, avec les jambes légèrement repliées et écartées. Canesten

gyno 3 crème vaginale est administrée comme suit : Ouvrir le tube en appuyant le bouchon à l'envers à travers la fermeture en aluminium.

1. Ouvrir le tube en appuyant le bouchon de fermeture du tube à l'envers contre la fermeture en aluminium.
2. Tirez la tige de l'applicateur jusqu'à la butée.
3. Placez l'applicateur sur le tube, maintenez-le fermement et remplissez-le complètement en pressant doucement le tube.
4. Retirez l'applicateur du tube, insérez-le aussi profondément que possible dans le vagin (de préférence en position allongée) et videz-le en appuyant sur la tige.
5. Retirez l'applicateur et jetez-le.

Canesten gyno 3 comprimé vaginal est administré comme suit :

Administration à l'aide de l'applicateur fourni

L'applicateur est utilisé pour insérer le comprimé aussi profondément que possible dans le vagin, de préférence avant de se coucher.

Lavez-vous les mains avant de retirer le comprimé vaginal et l'applicateur de l'emballage et après avoir utilisé l'applicateur.

1. Retirez l'applicateur de l'emballage et tirez la tige jusqu'à la verrou rouge.
2. Placez le comprimé vaginal dans l'extrémité ouverte de l'applicateur avec le côté bombé du comprimé vaginal vers le bas. Appuyez sur la tige et verrouillez l'applicateur jusqu'à ce qu'il clique.
3. Ensuite, retirez le verrou de la tige et insérez l'applicateur délicatement dans le vagin jusqu'à l'encoche.
4. Tenez l'applicateur à l'encoche et poussez doucement la tige complètement à l'intérieur pour insérer le comprimé vaginal jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer.
5. Après utilisation, démontez les pièces et lavez-les soigneusement à l'eau chaude (non bouillante) savonneuse. Rincez-les pendant 30 secondes à l'eau claire et essuyez soigneusement les pièces. Conservez-le dans un endroit propre et sûr. Pour une réutilisation, assurez-vous que le verrou rouge est remis sur la tige et répétez le processus à partir de l'étape 2. Jetez l'applicateur après la dernière utilisation dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. L'applicateur ne doit pas être jeté dans les toilettes.

Administration sans applicateur

Écartez les lèvres avec la main libre et insérez délicatement le comprimé, côté bombé vers le haut et le doigt contre le côté plat du comprimé, aussi profondément que possible dans le vagin.

Général

Le partenaire doit être traité avec une crème antifongique en cas d'infection du pénis crème pour éviter une contamination mutuelle.

En cas d'infections persistantes, il faut envisager une possible contamination via le rectum, qui doit alors être traité.

Les comprimés nécessitent de l'humidité dans le vagin pour se dissoudre complètement. Des particules non dissoutes du comprimé peuvent être expulsées du vagin. Pour éviter cela, il est important d'insérer le comprimé aussi profondément que possible dans le vagin, avant de se coucher. Si le comprimé ne se dissout pas en une nuit, on peut envisager d'utiliser une crème contenant clotrimazole crème contenant.

Si vous remarquez que Canesten gyno 3 est trop fort ou pas assez efficace, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Consultez un médecin si les symptômes persistent plus de 7 jours.

Avez-vous utilisé trop de ce médicament ?

Aucun cas de surdosage n'est connu lors de l'utilisation de Canesten gyno 3 selon les instructions d'utilisation. Consultez votre médecin si le comprimé a été accidentellement ingéré par voie orale.

En cas de doute, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Avez-vous oublié d'utiliser ce médicament à moment suivant. Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée.

4. EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES Comme tout médicament, ce

4. EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

clotrimazole effets secondaires du médicament ont été observés avec une fréquence indéterminée lors de l'utilisation de clotrimazole.

Affections du système immunitaire : hypersensibilité dans les cas graves pouvant entraîner un gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou une réaction anaphylactique (pouvant éventuellement s'accompagner de nausées, de diarrhée, d'une baisse de la pression artérielle, de difficultés à respirer, d'une perte de conscience).

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : peau rouge, éruption cutanée prurigineuse, éruption cutanée, sensation de picotement/de brûlure de la peau.

Affections générales et troubles au site d'administration : irritation ou réaction au site d'administration, rétention de liquide. Lors de l'utilisation de la crème et du comprimé, une irritation du pénis peut survenir chez le partenaire.

Affections du système reproducteur et des seins : saignement vaginal.

Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez des effets indésirables, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux effets indésirables possibles qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via www.lareb.nl. En signalant les effets indésirables, vous pouvez nous aider à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pour Canesten gyno 3 crème, il n'y a pas de conditions de conservation particulières. Conserver Canesten

gyno 3 comprimé en dessous de 25°C. Après ouverture du tube, Canesten gyno 3 crème est utilisable pendant 3 mois.

N'utilisez plus ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte, le tube ou la plaquette après « EXP. ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les eaux usées ou avec les déchets ménagers. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Quelles substances contient ce médicament?

Canesten gyno 3 est un médicament disponible sous deux formes, une crème vaginale et un comprimé vaginal. La substance active de ce médicament est clotrimazole.

Autres excipients dans ce médicament sont :

Canesten gyno 3 crème : stéarate de sorbitan (E 491), polysorbate 60 (E 435), alcool cétylstéarylique, palmitate de cétyle, 2-octyldodécanol, alcool benzylique, eau.

Canesten gyno 3 comprimé : lactate de calcium (E327), dioxyde de silicium colloïdal (E551), crospovidone (E1202), lactose, stéarate de magnésium (E470B), amidon de maïs, acide lactique (E270), cellulose microcristalline (E460 (i)), hypromellose (E464).

À quoi ressemble Canesten gyno 3 sortie et combien y en a-t-il dans un emballage ?

Canesten gyno 3 crème vaginale est disponible dans un emballage avec un tube de 20 grammes de crème et 3 applicateurs.

Canesten gyno 3 comprimé vaginal est disponible dans un emballage avec 3 comprimés et un applicateur.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'enregistrement : Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp

Pour informations : Consumer Health Division, Boîte postale 88, 2130 AB Hoofddorp.

Fabricant

Canesten gyno 3 crème : Kern Pharma, s.l, Terrassa, Espagne.

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Allemagne.

Canesten gyno 3 comprimé: GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Allemagne.

Canesten gyno 3 crème vaginale est inscrite au registre sous RVG 08935.

Canesten gyno 3 comprimé vaginal est inscrit au registre sous RVG 08934.

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en août 2022.