

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Canesten gyno 3, kremas makšties naudojimui 20 mg/g

Canesten gyno 3, tabletė makšties naudojimui 200 mg

Veiklioji medžiaga: klotrimazolas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame yra svarbi informacija jums.

Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.

Jei turite klausimų, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums

paskirtas. Tai gali būti kenksminga kitiems, net jei jų simptomai yra tokie patys kaip jūsų. u.

Ar pasireiškė kuri nors iš 4 skyriuje nurodytų šalutinių poveikių? Arba jums pasireiškė šalutinis

poveikis kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje? Susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.

Turinys šio pakuotės lapelio

1. Kas yra Canesten gyno 3 ir kam šis vaistas vartojamas
2. Ką turėtumėte žinoti prieš vartodami šį vaistą
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimi šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. KAS YRA Canesten gyno 3 IR KAM ŠIS VAISTAS NAUDOJAMAS

Canesten gyno 3 sudėtyje yra veiklioji medžiaga klotrimazolas. Klotrimazolas yra medžiaga, kuri tam tikras grybelių ar mielių rūšis naikina arba stabdo jų augimą.

Jūsų gydytojas nustatė, kad turite grybelinę infekciją makštyje (vaginoje). Dažniausias dažniausiai sukėlėjas yra Candida albicans. Šis grybelis paprastai yra ant odos esantis ir tam tikromis sąlygomis gali sukelti nusiskundimų, tokių kaip atsiradimas makšties išskyry, žinomų kaip baltosios išskyros. Canesten gyno 3 naudojamas makšties infekcijoms, kurias sukelia tam tikros grybelio ar mielių rūšys, gydyti.

2. KĄ TURITE ŽINOTI PRIEŠ VARTODAMI ŠĮ VAISTĄ

Kada negalima vartoti šio vaisto?

Esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai, pavyzdžiui, cetilstearilo alkoholiui.

Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje. Kada turite būti ypač atsargūs vartodami šį vaistą?

Canesten gyno 3 makšties kremas ir Canesten gyno 3 makšties tabletės neturėtų būti menstruacijų metu, nes tada negalima visiškai pasitikėti veiksmingumu. Todėl įsitikinkite, kad gydymas baigtas iki to laiko.

Ši priemonė turi 2 gramus benzilo alkoholio kiekviename 100 gramų kremo, atitinkančio 20

mg/g kremo. Benzilo alkoholis gali sukelti lengvą vietinį dirginimą.

Makšties kremas neturėtų būti naudojamas esant padidėjusiam jautrumui cetilstearilo alkoholiui, nes ši medžiaga yra naudojama kaip pagalbinė medžiaga kreme. Tokiu atveju gali būti naudojama makšties tabletė. Cetilstearilo alkoholis gali sukelti vietinės odos reakcijas (pvz., kontaktinį dermatitą).

Canesten gyno 3 kremas ir tabletė gali sumažinti guminių gaminių tokių kaip prezervatyvai ir pessaria veiksmingumą ir saugumą. Poveikis yra laikinas ir pasireiškia tik gydymo metu.

Naudojimas Canesten gyno 3 kartu su kitais vaistais. Nėra sąveikų su Canesten gyno 3 su kitais vaistais žinoma.

Pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui, jei vartojate kitus vaistus arba neseniai vartojotėte vaistus. Tai taip pat taikoma vaistams, kuriuos galite vartoti be recepto.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Nėštumas

Canesten gyno 3, kiek žinoma, gali būti vartojamas be pavojaus vaisiui rekomenduojamomis dozėmis nėštumo metu, jei reikia. Nėštumo metu reikėtų vengti aplikatoriaus naudojimo ir pirmenybę teikti makšties tablečių įvedimui ranka. Makšties tabletę galima įvesti ranka.

Žindymas

Canesten gyno 3 gali būti vartojamas pagal receptą žindymo metu. Žindymo.

Vaisingumas

Nėra atlikta tyrimų su žmonėmis dėl klotrimazolo poveikio vaisingumui, tačiau tyrimai su gyvūnais neparodė vaisto poveikio vaisingumui įrodyta.

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, planuojate pastoti ar maitinate krūtimi? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką prieš vartodami šį vaistą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Nesitikima, kad šis vaistas turės įtakos šioms funkcijoms.

3. KAIP VARTOTI ŠĮ VAISTĄ?

Vartodami Canesten Gyno 3, atidžiai laikykitės gydytojo nurodymų. Jei abejojate, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Canesten gyno 3 makšties kremas

Paprastai gydytojo nurodymas bus: tris dienas iš eilės vieną kartą per dieną – vakare prieš miegą – įvesti vieną aplikatoriaus užpildą (apie 5 gramus) makšties kremo kuo giliau į makštį. Kiekvienam vartojimui turi būti naudojamas naujas aplikatorius, kurį po to galima išmesti.

Canesten gyno 3 makšties tabletės

Paprastai gydytojo nurodymas bus: tris dienas iš eilės vieną kartą per dieną - vakare prieš miegą - vieną Canesten gyno 3 makšties tabletę įvesti kuo giliau į makštį.

Kai infekcija taip pat išplito už makšties, aplink lytines lūpas, gydytojas gali skirti, taip pat siekiant išvengti pakartotinės infekcijos, papildomai naudoti klotrimazolio kremą makšties naudojimui 10 mg/g. Šį kremą tepkite plonai ant pažeistų vietų du kartus per dieną apie vieną savaitę.

Naudojimo instrukcija

Makšties kremo ir makšties tabletės įvedimas geriausiai atliekamas gulint ant nugaros su šiek tiek pakeltomis ir išskėstomis kojomis.

Canesten gyno 3 makšties kremas naudojamas taip:

1. Atidarykite tūbelę, paspausdami uždarymo dangtelį atvirkščiai per aliuminio uždarymą.
2. Ištraukite aplikatoriaus lazdelę iki sustojimo.
3. Uždėkite aplikatorių ant tūbelės, tvirtai laikykite ir visiškai užpildykite, atsargiai spausdami tūbelę.
4. Nuimkite aplikatorių nuo tūbelės, įveskite kuo giliau į makštį (geriausia gulint ant nugaros) ir ištuštinkite, spausdami lazdelę. Pašalinkite aplikatorių ir išmeskite.
5. Canesten

gyno 3 makšties tabletė skiriama taip: Vartojimas su pridedamu aplikatoriumi

Aplikatorius naudojamas tabletei kuo giliau į makštį įvesti, geriausia prieš miegą.

Prieš išimdami makšties tabletę ir aplikatorių iš pakuotės ir po aplikatoriaus naudojimo nusiplaukite rankas.

Išimkite aplikatorių iš pakuotės ir ištraukite lazdelę

1. Išimkite aplikatorių iš pakuotės ir ištraukite lazdelę raudono užrakto. Išimkite raudoną užraktą.
2. Tada nuimkite užraktą nuo lazdelės ir atsargiai įveskite aplikatorių į makštį iki įpjovos.
3. Laikykite aplikatorių prie įpjovos ir atsargiai stumkite lazdelę visiškai į vidų, kol ji nebegalės judėti toliau, kad įvestumėte makšties tabletę.
4. Po naudojimo, išardykite dalis ir kruopščiai nuplaukite šiltu (ne verdančiu) muiluotu vandeniu. Skalaukite jas 30 sekundžių švariu vandeniu ir kruopščiai nuvalykite dalis. Laikykite švarioje ir saugioje vietoje. Prieš pakartotinį naudojimą, įsitikinkite, kad raudonas užraktas yra grąžintas ant lazdelės ir pakartokite procesą nuo 2 žingsnio. Po paskutinio naudojimo išmeskite aplikatorių saugioje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Aplikatoriaus negalima nuleisti į tualetą.
5. Po naudojimo išardykite dalis ir kruopščiai nuplaukite šiltu (ne verdančiu) muiluotu vandeniu. 30 sekundžių nuplaukite švariu vandeniu ir atsargiai nuvalykite dalis. Laikykite švarioje ir saugioje vietoje. Prieš pakartotinį naudojimą įsitikinkite, kad raudonas užraktas ant lazdelės yra atgal uždėtas ir pakartokite procesą nuo 2 žingsnio. Po paskutinio naudojimo išmeskite aplikatorių saugioje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Aplikatoriaus negalima nuleisti į tualetą.

Vartojimas be aplikatoriaus

Laikykite lytines lūpas laisva ranka ir atsargiai įstumkite tabletę su išgaubta puse į viršų ir pirštu prie plokščiosios tabletės pusės kuo giliau į makštį.

Bendrai

Partneris turi būti gydomas priešgrybeliniu kremu, jei yra varpos infekcija, krėme kad būtų išvengta abipusės infekcijos.

Esant užsispyrusioms infekcijoms, reikėtų pagalvoti apie galimą užkrėtimą per tiesiąją žarną, kurią tada reikia gydyti.

Tabletėms reikia drėgmės makštyje, kad jos visiškai ištirtų.

Neištirpę tabletės dalelės gali būti pašalintos iš makšties. Kad to išvengtumėte, svarbu tabletę įvesti kuo giliau į makštį prieš miegą. Jei tabletė neištirpsta per vieną naktį, galima pagalvoti apie naudojimą kremo, kuriame yra klotrimazolo. Jei pastebėjote, kad

Canesten gyno 3 veikia per stipriai arba per silpnai, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku. 3 per stipriai arba per silpnai veikia, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Pasitarkite su gydytoju jei simptomai išlieka ilgiau nei 7 dienas.

Ar vartojote per daug šio vaisto?

Nėra žinomų perdozavimo atvejų vartojant Canesten gyno 3 pagal naudojimo instrukcijas. Pasitarkite su gydytoju, jei tabletė netyčia buvo praryta.

Jei abejojate, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Ar pamiršote šį vaistą vartoti? Tokiu atveju galite vartoti įprastą dozę kitą kartą. Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

4. GALIMOS ŠALUTINĖS REAKCIJOS

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali turėti šalutinių reakcijų, nors ne visi jas patiria. Nežinomo dažnio šios šalutinės reakcijos buvo nustatytos vartojant klotrimazolą.

Imuninės sistemos sutrikimai: padidėjęs jautrumas, sunkiais atvejais sukiantis lūpų, liežuvio ir gerklės patinimą arba anafilaksinę reakciją (gali būti kartu su pykinimu, viduriavimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, kvėpavimo sunkumais, sąmonės netekimu).

Odos ir poodinio audinio sutrikimai: raudona oda, niežintis bėrimas, odos bėrimas, dilgčiojimas/deginimo pojūtis odoje.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai: dirginimas arba reakcija vartojimo vietoje, skysčių kaupimasis. Naudojant kremą ir tabletes, partneriui gali atsirasti varpos dirginimas.

Dauginimosi sistemos ir krūties sutrikimai: makšties kraujavimas.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai per www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. KAIP LAIKYTI ŠĮ VAISTĄ?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Skirta Canesten gyno 3 kremui nėra specialių laikymo sąlygų. Laikyti Canesten gyno 3 tabletę žemiau 25°C. Atidarius tūbelę, Canesten gyno 3 kremas galioja 3 mėnesius.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus galiojimo laikui, nurodytam ant dėžutės, tūbelės ar lizdinės plokštelės po „EXP.“. Galiojimo data nurodo paskutinę to mėnesio dieną.

Vaistai neturėtų būti išmetami su nuotekomis ar buitinėmis atliekomis. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebereikia. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. PAKUOTĖS TURINYS IR KITA INFORMACIJA

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Canesten gyno 3 yra vaistas, kuris yra dviejų formų: makšties kremas ir makšties tabletė. Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra klotrimazolas.

Kitos pagalbinės medžiagos šiame vaistiniame preparate yra:

Canesten gyno 3 kremas: sorbitano stearatas (E 491), polisorbatai 60 (E 435), cetilstearilo alkoholis, cetilpalmitatas, 2-oktilodekanolis, benzilo alkoholis, vanduo.

Canesten gyno 3 tabletė: kalcio laktatas (E327), koloidinis silicio dioksidas (E551), krospovidonas (E1202), laktozė, magnio stearatas (E470B), kukurūzų krakmolai, pieno rūgštis (E270), mikrokristalinė celiuliozė (E460 (i)), hipromeliozė (E464).

Kaip atrodo Canesten gyno 3 ir kiek yra pakuotėje? ir kiek yra pakuotėje?

Canesten gyno 3 makšties kremas yra prieinamas pakuotėje su tūbele, kurioje yra 20 gramų kremo ir 3 aplikatoriai.

Canesten gyno 3 makšties tabletė yra prieinama pakuotėje su 3 tabletėmis ir aplikatoriumi.

Leidimo prekiauti turėtojas ir gamintojas

Registracijos turėtojas: Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp

Informacijai: Consumer Health Division, Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp.

Gamintojas

Canesten gyno 3 kremas: Kern Pharma, s.l, Terrassa, Ispanija.

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Vokietija.

Canesten gyno 3 tabletės: GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Vokietija.

Canesten gyno 3 makšties kremas yra įregistruotas registre su RVG 08935.
Canesten gyno 3 makšties tabletė yra įregistruota registre su RVG 08934.

Ši pakuotės lapelis paskutinį kartą buvo patvirtintas 2022 m. rugpjūčio mėn.

Transtoyou