

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Canesten gyno 3, cremă pentru uz vaginal 20 mg/g
Canesten gyno 3, comprimat pentru uz vaginal 200 mg
Substanța activă: clotrimazol

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.

Aveți întrebări suplimentare? Contactați medicul sau farmacistul.

Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră.

Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră. u.

Aveți probleme cu una dintre reacțiile adverse menționate în secțiunea 4? Sau aveți dumneavoastră o

reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Conținutul acestui prospect Ce este

1. Canesten gyno 3 și pentru ce se utilizează acest medicament Ce trebuie să știți înainte de a utiliza acest medicament
2. Cum să utilizați acest medicament?
3. Posibile
4. Posibil efecte secundare
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE Canesten gyno 3 ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ ACEST MEDICAMENT

Canesten gyno 3 conține ca substanță activă clotrimazol. Clotrimazol este o substanță care anumite tipuri de ciuperci sau drojdii le omoară sau le inhibă creșterea.

Medicul dumneavoastră a diagnosticat o infecție fungică în vagin (vagin). Cel mai frecvent cauzator este *Candida albicans*. Această ciupercă este în mod normal pe piele prezentă și poate provoca simptome în anumite condiții, cum ar fi apariția secreției vaginale, cunoscută sub numele de leucoree. Canesten gyno 3 este utilizat pentru infecțiile vaginale cauzate de anumite tipuri de ciuperci sau drojdii.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST MEDICAMENT

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la una dintre substanțele din acest medicament, cum ar fi alcool cetilstearyl.

Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6. Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament? Canesten gyno 3 cremă vaginală și Canesten gyno 3 comprimat vaginal nu trebuie

În timpul menstruației, deoarece atunci nu se poate avea încredere deplină în eficacitate. Asigurați-vă, așadar, că tratamentul este finalizat înainte de acea perioadă.

Acest medicament conține 2 grame de alcool benzilic în fiecare 100 de grame de cremă, corespunzător cu 20 mg/g cremă. Alcoolul benzilic poate provoca iritații locale ușoare.

Crema vaginală nu trebuie utilizată în caz de hipersensibilitate la alcool cetilstearyl, deoarece această substanță este utilizată ca excipient în cremă. În acest caz, poate fi utilizat comprimatul vaginal. Alcoolul cetilstearyl poate provoca reacții cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

Canesten gyno 3 cremă și comprimat pot reduce eficacitatea și siguranța produselor din cauciuc cum ar fi prezervativele și diafragmele. Efectul este temporar și apare doar în timpul tratamentului.

Utilizarea Canesten gyno 3 în combinație cu alte medicamente Nu există interacțiuni cu Canesten gyno 3 cu alte medicamente cunoscute.

Informați medicul sau farmacistul dacă utilizați alte medicamente sau recent ați utilizat. Acest lucru este valabil și pentru medicamentele pe care le puteți utiliza fără prescripție medicală. Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Sarcina

Canesten

gyno 3 poate fi utilizat, pe cât se știe, fără pericol pentru făt în doza recomandată în timpul sarcinii, dacă este necesar. În timpul sarcinii, utilizarea aplicatorului trebuie evitată și administrarea comprimatelor vaginale cu mâna este de preferat. Comprimatul vaginal poate fi introdus cu mâna. 3 poate fi utilizat, din câte se știe, fără pericol pentru făt în doza recomandată în timpul sarcinii, dacă este necesar. În timpul sarcinii, utilizarea aplicatorului trebuie evitată și administrarea comprimatelor vaginale cu mâna este de preferat. Comprimatul vaginal poate fi introdus cu mâna.

Canesten

gyno 3 poate fi utilizat conform prescripției în timpul alăptării alăptare.

Fertilitate

Nu au fost efectuate studii la oameni privind efectele clotrimazol asupra fertilității, dar studiile pe animale nu au demonstrat niciun efect al medicamentului asupra fertilității demonstrat.

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nu se așteaptă ca acest medicament să aibă un efect asupra acestor funcții.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ ACEST MEDICAMENT?

Urmați cu strictețe sfatul medicului dumneavoastră atunci când utilizați Canesten Gyno 3. Consultați medicul sau farmacistul în caz de îndoială.

Canesten gyno 3 cremă vaginală

În general, prescripția medicului dumneavoastră va fi: timp de trei zile consecutive, o dată pe zi - seara înainte de culcare - introduceți cât mai adânc posibil în vagin o aplicare (aproximativ 5 grame) de cremă vaginală. Pentru fiecare administrare trebuie folosit un aplicator nou, care poate fi aruncat după utilizare.

Canesten gyno 3 comprimat vaginal

În general, prescripția medicului dumneavoastră va fi: timp de trei zile consecutive, o dată pe zi - seara înainte de culcare - introduceți un Canesten gyno 3 comprimat vaginal cât mai adânc posibil în vagin.

Când infecția s-a extins și în afara vaginului, în jurul labiilor, se poate, de asemenea, pentru a preveni reinfecția, la prescripția medicului, aplica clotrimazol cremă pentru uz vaginal 10 mg/g. Aplicați această cremă de două ori pe zi, subțire, pe zonele afectate timp de aproximativ o săptămână.

Instrucțiuni de utilizare

Introducerea cremei vaginale și a comprimatului vaginal se face cel mai bine în poziție culcată pe spate, cu picioarele ușor ridicate și depărtate.

Canesten gyno 3 cremă vaginală se administrează astfel:

1. Deschideți tubul apăsând capacul tubului inversat prin sigiliul de aluminiu.
2. Trageți tija aplicatorului până la opritor.
3. Așezați aplicatorul pe tub, țineți-l apăsat și umpleți-l complet prin strângerea ușoară a tubului.
4. Scoateți aplicatorul de pe tub, introduceți-l cât mai adânc în vagin (de preferință în poziție culcată) și goliți-l prin apăsarea tijei.
5. Scoateți și aruncați aplicatorul.

Canesten gyno 3 comprimat vaginal se administrează după cum urmează:

Administrare cu ajutorul aplicatorului furnizat

Aplicatorul este utilizat pentru a introduce comprimatul cât mai adânc în vagin, de preferință înainte de culcare.

Spălați-vă pe mâini înainte de a scoate comprimatul vaginal și aplicatorul din ambalaj și după ce ați folosit aplicatorul.

1. Scoateți aplicatorul din ambalaj și trageți tija până la blocajul roșu.
2. Plasați comprimatul vaginal în capătul deschis al aplicatorului cu partea bombată a comprimatului în jos. Apăsați pe tijă și blocați aplicatorul până când face clic.

3. Apoi, scoateți blocajul de pe tijă și introduceți aplicatorul cu grijă în vagin până la creștătură.
4. Țineți aplicatorul de creștătură și împingeți ușor tija complet înăuntru pentru a introduce comprimatul vaginal până când nu mai poate avansa.
5. După utilizare, demontați componentele și spălați-le bine în apă caldă (nu fierbinte) cu săpun. Clătiți-le timp de 30 de secunde cu apă curată și ștergeți-le cu atenție. Păstrați-le într-un loc curat și sigur. Pentru reutilizare, asigurați-vă că blocajul roșu este pus înapoi pe tijă și repetați procesul de la pasul 2. Aruncați aplicatorul după ultima utilizare într-un loc sigur, departe de copii. Aplicatorul nu trebuie aruncat în toaletă.

Administrare fără aplicator

Țineți labiile despărțite cu mâna liberă și introduceți comprimatul cu partea bombată în sus și degetul pe partea plată a comprimatului, cu grijă, cât mai adânc posibil în vagin.

General

Partenerul trebuie tratat cu o cremă antifungică în caz de infecție a penisului cremă pentru a preveni contaminarea reciprocă.

În cazul infecțiilor persistente, trebuie luată în considerare o posibilă contaminare prin rect, care trebuie tratată.

Comprimatele au nevoie de umiditate în vagin pentru a se dizolva complet. Particulele nedizolvate ale comprimatului pot fi eliminate din vagin. Pentru a preveni acest lucru, este important să introduceți comprimatul cât mai adânc posibil în vagin, înainte de culcare. Dacă comprimatul nu se dizolvă într-o singură noapte, se poate lua în considerare utilizarea unei creme care conține clotrimazol. Dacă observați că

Canesten gyno 3 este prea puternic sau prea slab, consultați medicul sau farmacistul. 3 prea puternic sau prea slab, consultați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Consultați un medic dacă simptomele persistă mai mult de 7 zile.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj la utilizarea Canesten gyno 3 conform instrucțiunilor de utilizare. Consultați medicul dumneavoastră dacă comprimatul a fost ingerat accidental pe cale orală. ingestie.

În caz de îndoială, contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Ați uitat să utilizați acest medicament Puteți în acest caz să aplicați doza normală la următoarea oră. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

4. POSIBILE REACȚII ADVERSE

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea le experimentează. Cu frecvență necunoscută, următoarele reacții adverse au fost observate în timpul utilizării clotrimazol.

Tulburări ale sistemului imunitar: hipersensibilitate în cazuri severe ducând la umflarea buzelor, limbii și gâtului sau o reacție anafilactică (poate fi însoțită de greață, diaree, tensiune arterială scăzută, dificultăți de respirație, pierderea cunoștinței).

Tulburări cutanate și ale țesutului subcutanat: piele roșie, erupție cutanată cu mâncărime, erupție cutanată, senzație de înțepătură/arsură a pielii.

Tulburări generale și la locul de administrare: iritație sau reacție la locul de administrare, retenție de lichide. La utilizarea cremei și a comprimatului, poate apărea iritația penisului la partener.

Tulburări ale sistemului reproducător și ale sânelui: sângerare vaginală.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru este valabil și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin www.lareb.nl. Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ACEST MEDICAMENT?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Pentru Canesten gyno 3 cremă nu există condiții speciale de păstrare. Păstrați Canesten gyno 3 comprimat sub 25°C. După deschiderea tubului, Canesten gyno 3 cremă este valabilă timp de 3 luni.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, tub sau pe blister după „EXP.". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate prin sistemul de canalizare sau cu deșeurile menajere. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce substanțe conține acest medicament?

Canesten gyno 3 este un medicament disponibil în două forme, o cremă vaginală și un comprimat vaginal. Substanța activă din acest medicament este clotrimazol.

Alte excipienți din acest medicament sunt:

Canesten gyno 3 cremă: sorbat de stearat (E 491), polisorbit 60 (E 435), alcool cetilstearyl, cetilpalmitat, 2-octildodecanol, alcool benzilic, apă.

Canesten gyno 3 tabletă: lactat de calciu (E327), dioxid de siliciu coloidal (E551),

crospovidonă (E1202), lactoză, stearat de magneziu (E470B), amidon de porumb, acid lactic (E270), celuloză microcristalină (E460 (i)), hipromeloză (E464).

Cum arată Canesten gyno 3 erupție și cât conține un ambalaj?

Canesten gyno 3 cremă vaginală este disponibilă într-un ambalaj cu un tub de 20 gram cremă și 3 aplicatoare.

Canesten gyno 3 comprimat vaginal este disponibil într-un ambalaj cu 3 comprimate și un aplicator.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producător

Deținătorul înregistrării: Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp

Pentru informații: Consumer Health Divizia, Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp.

Producător

Canesten gyno 3 cremă: Kern Pharma, s.l, Terrassa, Spania.

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Germania.

Canesten gyno 3 tablet: GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Germania.

Canesten gyno 3 cremă vaginală este înregistrată sub RVG 08935.

Canesten gyno 3 tabletă vaginală este înregistrată sub RVG 08934.

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în august 2022.