

## BIPACKSEDEL: INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN

Canesten gyno 3, kräm för vaginal användning 20 mg/g  
Canesten gyno 3, tablett för vaginal användning 200 mg  
Aktiv substans: klotrimazol

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar använda detta läkemedel eftersom det finns viktig information för dig.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

Har du fler frågor? Kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det är förskrivet endast till dig.

Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma som du. u.

Får du någon av de biverkningar som anges i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte står i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare eller apotekare.

### Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Canesten gyno 3 och vad används detta läkemedel för
2. Vad du behöver veta innan du använder detta läkemedel
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

### 1. VAD ÄR Canesten gyno 3 OCH VAD ANVÄNDS DETTA LÄKEMEDEL FÖR

Canesten gyno 3 innehåller den aktiva substansen klotrimazol. Klotrimazol är ett ämne som vissa svamp- eller jästtyper dödar eller hämmar tillväxten av.

Din läkare har fastställt att du har en svampinfektion i slidan (vagina). Den vanligaste förekommande orsakaren är *Candida albicans*. Denna svamp är normalt på huden närvarande och kan under vissa omständigheter orsaka besvär, såsom uppkomst av vaginalt utsöndring, känt som vit flytning. Canesten gyno 3 används vid infektioner i slidan, som orsakas av vissa svamp- eller jästtyper.

### 2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DETTA LÄKEMEDEL

När ska du inte använda detta läkemedel?

Du är allergisk mot någon av ingredienserna i detta läkemedel, såsom cetylstearylalcohol. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6. När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?

Canesten gyno 3 vaginal kräm och Canesten gyno 3 vaginal tablett bör inte under menstruationen, eftersom man då inte helt kan lita på effekten. Se därför till att behandlingen är avslutad innan dess.

Detta medel innehåller 2 gram bensylalkohol i varje 100 gram kräm, motsvarande 20

mg/g kräm. Bensylalkohol kan orsaka lätt lokal irritation.

Den vaginala krämen bör inte användas vid överkänslighet mot cetylstearylalkohol, eftersom detta ämne används som hjälpämne i krämen. I så fall kan den vaginala tablett användas. Cetylstearylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Canesten gyno 3 kräm och tablett kan minska effekten och säkerheten hos gummiprodukter såsom kondomer och pessar. Effekten är tillfällig och uppstår endast under behandlingen .

Användning av Canesten gyno 3 i kombination med andra läkemedel Det finns inga interaktioner med Canesten gyno 3 med andra läkemedel kända.

Berätta för din läkare eller apotekare om du använder andra läkemedel eller nyligen har använt. Detta gäller även läkemedel som du kan använda utan recept. Graviditet, amning och fertilitet

#### Graviditet

##### Canesten

gyno 3 kan, såvitt känt, utan fara för fostret användas i den rekommenderade doseringen under graviditet, om det behövs. Under graviditet bör användning av applikatorn undvikas och administrering av de vaginala tabletterna för hand föredras. Den vaginala tablett kan föras in med handen. 3 kan, såvitt känt, utan fara för fostret användas i den rekommenderade doseringen under graviditet, om det behövs. Under graviditeten bör användning av applikatorn undvikas och administrering av de vaginala tabletterna för hand föredras. Den vaginala tablett kan införas med handen.

##### Canesten

gyno 3 kan användas enligt föreskrift under 3 kan användas enligt föreskriften under amning.

#### Fertilitet

Det finns inga studier på människor om effekterna av klotrimazol på fertiliteten, men djurstudier har inte visat någon effekt av läkemedlet på fertiliteten påvisats.

Är du gravid, tror du att du är gravid, planerar du att bli gravid eller ammar du? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du använder detta läkemedel.

#### Körförmåga och användning av maskiner

Det förväntas inte att detta läkemedel påverkar dessa funktioner.

### 3. HUR ANVÄNDER DU DETTA LÄKEMEDEL?

Följ vid användning av Canesten Gyno 3 noggrant din läkares råd. Rådfråga din läkare eller apotekare vid osäkerhet.

#### Canesten gyno 3 vaginalkräm

I allmänhet kommer din läkares ordination att vara: under tre på varandra följande dagar en gång per dag – på kvällen före sänggåendet – införa en applikatorfyllning (ca 5 gram) vaginalkräm så djupt som möjligt i slidan. För varje administrering ska en ny applikator användas, som sedan kan kastas.

#### Canesten gyno 3 vaginal tablett

I allmänhet kommer din läkares recept att vara: under tre på varandra följande dagar en gång per dag - på kvällen före sänggåendet - en Canesten gyno 3 vaginal tablett så djupt som möjligt i slidan.

När infektionen också har spridit sig utanför slidan, runt blygdläpparna, kan, även för att förhindra återinfektion, på läkares recept dessutom klotrimazol kräm för vaginalt bruk 10 mg/g användas. Applicera denna kräm tunt på de drabbade områdena två gånger om dagen under ungefär en vecka.

#### Bruksanvisning

Införandet av den vaginala krämen och vaginaltablettens kan bäst ske i ryggläge med något uppdragna och isärspridda ben.

Canesten gyno 3 vaginal kräm administreras enligt följande:

1. Öppna tuben genom att trycka den omvända skruvkorken genom aluminiumförseglingen.
2. Dra ut staven från applikatorn till stoppet.
3. Sätt applikatorn på tuben, håll den fast och fyll den helt genom försiktigt klämma på tuben.
4. Ta bort applikatorn från tuben, för in den så djupt som möjligt i slidan (bäst i ryggläge) och töm den genom att trycka in staven.
5. Ta bort applikatorn och kasta den.

Canesten gyno 3 vaginaltablett administreras enligt följande:

Administrering med hjälp av den medföljande applikatorn

Applikatorn används för att föra in tablettens så djupt som möjligt i slidan, helst före sänggåendet. Tvätta händerna innan du tar ut vaginaltablettens och applikatorn ur förpackningen och efter att du har använt applikatorn.

1. Ta ut applikatorn ur förpackningen och dra staven till den röda låsningen.
2. Placera vaginaltablettens i den öppna änden av applikatorn med den rundade sidan av vaginaltablettens nedåt. Tryck på staven och lås applikatorn tills det klickar.
3. Ta sedan bort låsningen från staven och sätt försiktigt in applikatorn i slidan till markeringen.
4. Håll applikatorn vid markeringen och tryck försiktigt in staven helt för att föra in vaginaltablettens tills den inte kan gå längre.
5. Ta isär delarna efter användning och tvätta dem noggrant i varmt (inte kokande) tvålvattnet. Skölj dem i 30 sekunder med rent vatten och torka delarna noggrant. Förvara den på en ren och säker plats. För återanvändning, se till att den röda låsningen sätts tillbaka på staven och upprepa processen från steg 2. Kasta applikatorn på en säker plats utom räckhåll för barn efter sista användningen. Applikatorn får inte spolas ner i toaletten.

## Administrering utan applikator

Håll isär blygdläpparna med den fria handen och tryck in tabletten med den rundade sidan uppåt och fingret mot den platta sidan av tabletten försiktigt så djupt som möjligt i slidan.

## Allmänt

Partnern bör vid infektion av penis behandlas med en svampdödande kräm för att förhindra ömsesidig smitta.

Vid envisa infektioner bör man tänka på en möjlig smitta via ändtarmen, som då måste behandlas.

Tabletterna behöver fukt i slidan för att kunna lösas upp helt. Oupplösta partiklar av tabletten kan utsöndras från slidan. För att förhindra detta är det viktigt att föra in tabletten så djupt som möjligt i slidan, innan man går och lägger sig. Om tabletten inte löser upp sig på en natt, kan man överväga att använda en kräm innehållande klotrimazol innehållande kräm.

Om du märker att Canesten gyno 3 är för stark eller för svag, kontakta din läkare eller apotekare.

Rådfråga en läkare om symtomen kvarstår längre än 7 dagar.

Har du använt för mycket av detta läkemedel?

Det finns inga kända fall av överdosering vid användning av Canesten gyno 3 enligt bruksanvisningen. Rådfråga din läkare om tabletten av misstag har intagits oralt.

Kontakta din läkare eller apotekare vid tveksamhet.

Har du glömt att använda detta läkemedel? I så fall kan du använda den normala dosen vid nästa tillfälle. Använd inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

## 4. MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla får inte dem. Med okänd frekvens har följande biverkningar observerats vid användning av klotrimazol.

Immunsystemsjukdomar: överkänslighet i allvarliga fall som leder till svullnad av läpparna, tungan och halsen eller en anafylaktisk reaktion (kan eventuellt åtföljas av illamående, diarré, sänkt blodtryck, andningssvårigheter, medvetslöshet). andas, medvetslöshet).

Hud- och subkutana sjukdomar: röd hud, kliande utslag, hudutslag, stickande/brännande känsla i huden.

Allmänna sjukdomar och administreringsstörningar: irritation eller reaktion på administreringsstället  
bröstsjukdomar: vaginal

blödning. Rapportering av biverkningar blodförlust.

även

för möjliga biverkningar som inte finns i denna bipacksedel. Du kan också direkt rapportera via [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. HUR FÖRVARAR DU DETTA LÄKEMEDEL? rapportera via [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

## 5. HUR FÖRVARAR DU DETTA LÄKEMEDEL?

Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

För Canesten gyno 3 kräm finns inga speciella förvaringsanvisningar. Förvara Canesten gyno 3 tablett under 25°C. Efter att tuben har öppnats är Canesten gyno 3 kräm hållbar i 3 månader.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen, tuben eller på blisterförpackningen efter "EXP." Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller med hushållsavfall. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

## 6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIG INFORMATION

Vilka ämnen finns i detta läkemedel?

Canesten gyno 3 är ett läkemedel som finns i två former, en vaginal kräm och en vaginal tablett. Den aktiva substansen i detta läkemedel är clotrimazol.

Andra hjälpämnen i detta läkemedel är:

Canesten gyno 3 kräm: sorbitanstearat (E 491), polysorbat 60 (E 435), cetylstearylalkohol, cetylpalmitat, 2-octyldodekanol, bensenalkohol, vatten.

Canesten gyno 3 tablett: kalciumlaktat (E327), kolloidal kiseldioxid (E551), krospovidon (E1202), laktos, magnesiumstearat (E470B), majsstärkelse, mjölksyra (E270), mikrokristallin cellulosa (E460 (i)), hypromellos (E464).

Hur ser Canesten gyno 3 ut och hur mycket finns det i en förpackning?

Canesten gyno 3 vaginalkräm finns tillgänglig i en förpackning med en tub med 20 gram kräm och 3 applikatorer.

Canesten gyno 3 vaginaltablett finns tillgänglig i en förpackning med 3 tabletter och en applikator.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Registreringsinnehavare: Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp

För information: Consumer Health Division, Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp.

Tillverkare

Canesten gyno 3 kräm: Kern Pharma, s.l, Terrassa, Spanien.

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Tyskland.

Canesten gyno 3 tabletter: GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Tyskland.

Canesten gyno 3 vaginal kräm är registrerad under RVG 08935.  
Canesten gyno 3 vaginal tablett är registrerad under RVG 08934.

Denna bipacksedel godkändes senast i augusti 2022.

Transtoyou