

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Canesten gyno 3, Creme zur vaginalen Anwendung 20 mg/g
Clotrimazol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden, denn sie enthält wichtige Informationen.

Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.

Haben Sie noch Fragen? Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an andere weiter, da es nur Ihnen verschrieben wurde.

Es kann anderen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

Bekommen Sie eine der Nebenwirkungen, die in Abschnitt 4 aufgeführt sind? Oder bekommen Sie eine Nebenwirkung, die nicht in dieser Packungsbeilage steht? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt dieser Packungsbeilage Was ist

1. Was ist Canesten gyno 3 und wofür wird dieses Mittel angewendet?
2. Was Sie wissen müssen, bevor Sie dieses Mittel anwenden
3. Wie verwenden Sie dieses Mittel?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren Sie dieses Mittel auf?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST CANESTEN GYNO 3 UND WOFÜR WIRD DIESES MITTEL ANGEWENDET?

Canesten gyno 3 enthält als Wirkstoff Clotrimazol. Clotrimazol ist ein Stoff, der bestimmte Pilz- oder Hefesorten abtötet oder das Wachstum hemmt.

Ihr Arzt hat bei Ihnen eine Pilzinfektion in der Vagina (Scheide) festgestellt. Der häufigste Erreger ist *Candida albicans*. Dieser Pilz ist normalerweise auf der Haut vorhanden und kann unter bestimmten Umständen Beschwerden verursachen, wie das Entstehen von vaginalem Ausfluss, bekannt als Weißfluss. Canesten gyno 3 wird bei Infektionen der Vagina angewendet, die durch bestimmte Pilz- oder Hefepilzarten verursacht werden.

2. WAS SIE WISSEN MÜSSEN, BEVOR SIE DIESES MEDIKAMENT ANWENDEN

Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht anwenden?

Sie sind allergisch gegen einen der Bestandteile dieses Arzneimittels, wie Cetylstearylalkohol. Diese Stoffe finden Sie in Abschnitt 6. Wann müssen Sie besonders vorsichtig sein mit diesem Medikament? Canesten gyno 3 Vaginalcreme sollte nicht während der Menstruation angewendet werden, da dann nicht vollständig auf die Wirksamkeit vertraut werden kann. Stellen Sie daher sicher, dass die Behandlung vor dieser Zeit abgeschlossen ist. Dieses Mittel enthält 2 Gramm Benzylalkohol in jedem 100 Gramm Creme, entsprechend 20 mg/g Creme. Benzylalkohol kann leichte lokale Reizungen verursachen.

Die Vaginalcreme darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen

Cetylstearylalkohol Cetylstearylalkohol, da diese Substanz als Hilfsstoff in die Creme eingearbeitet ist (100 mg pro Gramm). In diesem Fall kann die (auch im Handel erhältliche) Vaginaltablette verwendet werden. Cetylstearylalkohol kann örtliche Hautreaktionen hervorrufen (z.B. Kontaktdermatitis).

Canesten gyno 3 Creme kann die Wirkung und Sicherheit von Gummiprodukten wie Kondomen und Pessaren verringern. Die Wirkung ist vorübergehend und tritt nur während der Behandlung auf.

Verwendung von Canesten gyno 3 in Kombination mit anderen Arzneimitteln
Es sind keine Wechselwirkungen von Canesten gyno 3 mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder kürzlich eingenommen haben. Dies gilt auch für Arzneimittel, die Sie ohne Rezept erhalten können.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Schwangerschaft

Canesten gyno 3 kann, soweit bekannt, ohne Gefahr für den Fötus in der empfohlenen Dosierung während der Schwangerschaft verwendet werden, falls erforderlich. In der Schwangerschaft sollte die Verwendung des Applikators vermieden werden, und die Verabreichung der (auch im Handel erhältlichen) Vaginaltabletten von Hand wird bevorzugt. Die Vaginaltablette kann von Hand eingeführt.

Stillzeit

Canesten gyno 3 kann gemäß der Verschreibung während der Stillzeit verwendet werden.

Fruchtbarkeit

Es wurden keine Studien am Menschen zu den Auswirkungen von Clotrimazol auf die Fruchtbarkeit durchgeführt, aber Tierstudien haben keine Wirkung des Arzneimittels auf die Fruchtbarkeit gezeigt.

Sind Sie schwanger, denken Sie schwanger zu sein, möchten Sie schwanger werden oder stillen Sie? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel verwenden.

Fahrtüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Arzneimittel einen Einfluss auf diese Funktionen hat.

3. WIE VERWENDEN SIE DIESES MITTEL?

Befolgen Sie bei der Anwendung von Canesten gyno 3 genau den Rat Ihres Arztes. Bei Zweifeln konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Im Allgemeinen wird die Verschreibung Ihres Arztes sein: an drei aufeinanderfolgenden Tagen einmal täglich – abends vor dem Schlafengehen – eine Applikatorfüllung (ca. 5 Gramm) Vaginalcreme so tief wie möglich in die Vagina einführen. Für jede Anwendung sollte ein neuer Applikator verwendet werden, der danach entsorgt werden kann.

Wenn sich die Infektion auch außerhalb der Vagina, um die Schamlippen herum, ausgebreitet hat, kann zur Vorbeugung von Reinfektion, auf ärztliche Verschreibung hin außerdem Clotrimazol Creme zur vaginalen Anwendung 10 mg/g angewendet werden. Tragen Sie diese Creme zweimal täglich dünn auf die betroffenen Stellen für etwa eine Woche auf.

Gebrauchsanweisung

Das Einführen der Vaginalcreme erfolgt am besten in Rückenlage, mit leicht angezogenen und gespreizten Beinen.

Canesten gyno 3 Vaginalcreme wird wie folgt verabreicht:

1. Tube öffnen, indem der Verschlussdeckel der Tube umgekehrt durch die Aluminiumversiegelung gedrückt wird.
2. Stäbchen des Applikators bis zum Anschlag herausziehen.
3. Applikator auf die Tube setzen, fest andrücken und vollständig füllen, indem vorsichtig in die Tube gedrückt wird.
4. Applikator von der Tube nehmen, so tief wie möglich in die Vagina einführen (am besten in Rückenlage) und durch Eindrücken des Stäbchens entleeren.
5. Den Applikator entfernen und wegwerfen.

Allgemein

Der Partner sollte bei Infektion des Penis mit einer Antipilzcreme behandelt werden, um gegenseitige Ansteckung zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Infektionen sollte an eine mögliche Ansteckung über den Enddarm gedacht werden, die dann behandelt werden muss.

Wenn Sie bemerken, dass Canesten gyno 3 zu stark oder zu schwach wirkt, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Konsultieren Sie einen Arzt wenn die Beschwerden länger als 7 Tage anhalten.

Haben Sie zu viel von diesem Mittel angewendet?

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt bei der Anwendung von Canesten gyno 3 gemäß den Anwendungsvorschriften.

Bei Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Haben Sie vergessen, dieses Mittel anzuwenden?

In diesem Fall können Sie die normale Dosierung zum nächsten Zeitpunkt anwenden. Verwenden Sie keine doppelte Dosis, um eine vergessene Dosis

nachzuholen .

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Wie jedes Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, auch wenn nicht jeder davon betroffen ist. Mit unbekannter Häufigkeit wurden die folgenden Nebenwirkungen während der Anwendung von Clotrimazol.

Erkrankungen des Immunsystems: Überempfindlichkeit, in schweren Fällen führend zu Schwellungen der Lippen, der Zunge und des Rachens oder einer anaphylaktischen Reaktion (kann eventuell mit Übelkeit, Durchfall, niedrigem Blutdruck, Atembeschwerden, Bewusstlosigkeit einhergehen).

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: rote Haut, juckender Ausschlag, Hautausschlag, stechendes/brennendes Gefühl der Haut.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Reizung oder Reaktion an der Verabreichungsstelle, Flüssigkeitsansammlung. Bei Verwendung der Creme kann beim Partner eine Reizung des Penis auftreten.

Erkrankungen des Fortpflanzungssystems und der Brust: vaginaler Blutverlust.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für mögliche Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über www.lareb.nl melden. Durch das Melden von Nebenwirkungen können Sie uns helfen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zu erhalten.

5. WIE IST DAS MITTEL AUFZUBEWAHREN?

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Für Canesten gyno 3 Creme gibt es keine besonderen Lagerungsbedingungen.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach dem Verfallsdatum, das auf dem Etikett der Verpackung nach „EXP:“ angegeben ist. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Arzneimittel dürfen nicht über das Abwasser oder mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, was mit nicht mehr benötigten Arzneimitteln zu tun ist. Diese Maßnahmen werden helfen, die Umwelt zu schützen.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Welche Stoffe sind in diesem Mittel enthalten?

Canesten gyno 3 ist eine Creme zur vaginalen Anwendung. Der Wirkstoff in diesem Mittel ist Clotrimazol.

Andere Hilfsstoffe in diesem Arzneimittel sind: Sorbitanstearat (E491), Polysorbat 60 (E435), Cetylstearylalkohol, Cetylpalmitat, 2-Octyldodecanol, Benzylalkohol, gereinigtes Wasser.

Wie sieht Canesten Gyno 3 aus und wie viel ist in einer Packung enthalten?

Canesten Gyno 3 Vaginalcreme ist erhältlich in einer Packung mit einer Tube mit 20 Gramm Creme und 3 Applikatoren.

Inhaber der Zulassung für das Inverkehrbringen und Hersteller

Zulassungsinhaber:

Euro Registratie Collectief b.v.

Kempkens 2200

5465 PR Veghel

Ompakker (siehe Etikett auf der Außenverpackung):

Brocef B.V., Maroastraat 43, 1060 LG Amsterdam

oder

Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Hersteller:

Kern Pharma S.A.

Terrassa

Spanien

Bayer Healthcare AG

Leverkusen

Deutschland

Famar AB

Avlonas Attikis

Griechenland

GP Grenzach Produktions GmbH

Grenzach-Wyhlen

Deutschland

Eingetragen im Register unter:

RVG 121639//08935 Canesten gyno 3, Creme zur vaginalen Anwendung 20 mg/g (Griechenland)

Dieses Arzneimittel wird im Herkunftsland unter dem Namen vermarktet:

Griechenland: Canesten 2% κολλική κρέμα

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im März 2025 genehmigt ((130225)).