

## PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Canesten gyno 3, crema para uso vaginal 20 mg/g  
clotrimazol

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.

¿Tiene alguna pregunta? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

No comparta este medicamento con otras personas, ya que ha sido recetado solo para usted. Puede ser perjudicial para otros, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.

¿Experimenta alguno de los efectos secundarios mencionados en la sección 4? ¿O experimenta un efecto secundario que no se menciona en este prospecto? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

### Contenido de este prospecto

1. ¿Qué es Canesten gyno 3 ¿y para qué se utiliza este medicamento?
2. Lo que debe saber antes de usar este medicamento
3. ¿Cómo usar este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo almacenar este medicamento?
6. Contenido del envase y otra información

### 1. ¿QUÉ ES CANESTEN GYNO 3 Y PARA QUÉ SE UTILIZA ESTE MEDICAMENTO?

Canesten gyno 3 contiene como principio activo clotrimazol. Clotrimazol es una sustancia que mata ciertos tipos de hongos o levaduras o inhibe el crecimiento de los mismos.

Su médico ha diagnosticado una infección por hongos en la vagina (vagina). El causante más común es *Candida albicans*. Este hongo está normalmente presente en la piel y puede causar molestias bajo ciertas circunstancias, como la aparición de flujo vaginal, conocido como leucorrea. Canesten gyno 3 se utiliza para infecciones de la vagina causadas por ciertos tipos de hongos o levaduras.

### 2. QUÉ DEBE SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

¿Cuándo no debe usar este medicamento?

Es alérgico a alguno de los componentes de este medicamento, como alcohol cetilestearílico. Puede encontrar estos componentes en la sección 6. ¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento? Canesten gyno 3 crema vaginal no debe aplicarse durante la menstruación, ya que no se puede confiar completamente en su eficacia. Por lo tanto, asegúrese de que el tratamiento se complete antes de ese momento. Este medicamento contiene 2 gramos de alcohol bencílico en cada 100 gramos de crema, lo que equivale a 20 mg/g de crema. El alcohol bencílico puede causar irritación local leve.

La crema vaginal no debe aplicarse en caso de hipersensibilidad al

alcohol cetilestearílico alcohol cetilestearílico, porque esta sustancia se ha incorporado como excipiente en la crema (100 mg por gramo). En ese caso, se puede utilizar el comprimido vaginal (también disponible en el mercado). Alcohol cetilestearílico puede causar reacciones cutáneas locales (por ejemplo, dermatitis de contacto).

Canesten gyno 3 crema puede reducir la eficacia y seguridad de productos de goma como condones y diafragmas. El efecto es temporal y solo ocurre durante el tratamiento.

Uso de Canesten gyno 3 en combinación con otros medicamentos

No se conocen interacciones de Canesten gyno 3 con otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando otros medicamentos o recientemente ha utilizado. Esto también se aplica a los medicamentos que puede usar sin receta.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Embarazo

Canesten gyno 3 puede, según se sabe, usarse sin peligro para el feto en la dosis recomendada durante el embarazo, si es necesario. Durante el embarazo se debe evitar el uso del aplicador y se prefiere la administración de las tabletas vaginales (también disponibles en el mercado) con la mano. La tableta vaginal se puede introducir con la mano insertar.

Lactancia

Canesten gyno 3 puede usarse según la prescripción durante la lactancia.

Fertilidad

No se han realizado estudios en humanos sobre los efectos de clotrimazol en la fertilidad, pero los estudios en animales no han mostrado efectos del medicamento sobre la fertilidad.

¿Está embarazada, cree que podría estarlo, desea quedar embarazada o está amamantando? Entonces, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se espera que este medicamento tenga influencia en estas funciones.

### 3. ¿CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Siga al usar Canesten gyno 3 estrictamente el consejo de su médico. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de duda.

En general, la prescripción de su médico será: durante tres días consecutivos, una vez al día, por la noche antes de acostarse, introducir una carga de aplicador (aprox. 5 gramos) de crema vaginal lo más profundamente posible en la vagina. Para cada administración se debe usar un nuevo aplicador, que luego se puede desechar.

Cuando la infección también se ha extendido fuera de la vagina, alrededor de los labios, se puede, además, para prevenir reinfectie, bajo prescripción médica, aplicar clotrimazol crema para uso vaginal 10 mg/g. Aplique esta crema dos veces al día en una capa fina sobre las áreas afectadas durante aproximadamente una semana.

#### Instrucciones de uso

La aplicación de la crema vaginal se realiza mejor en posición supina, con las piernas ligeramente flexionadas y separadas.

Canesten gyno 3 crema vaginal se administra de la siguiente manera:

1. Abrir el tubo presionando la tapa del tubo invertida a través del cierre de aluminio.
2. Extraer el émbolo del aplicador hasta el tope.
3. Colocar el aplicador en el tubo, mantenerlo presionado y llenarlo completamente apretando suavemente el tubo.
4. Retirar el aplicador del tubo, introducirlo lo más profundo posible en la vagina (preferiblemente en posición supina) y vaciarlo presionando el émbolo.
5. Retirar y desechar el aplicador.

#### General

La pareja debe ser tratada con una crema antimicótica en caso de infección del pene para evitar la contaminación mutua.

En infecciones persistentes, se debe considerar una posible contaminación a través del recto, que debe ser tratada.

Si nota que Canesten gyno 3 demasiado fuerte o demasiado débil, consulte a su médico o farmacéutico.

Consulte a un médico si los síntomas persisten más de 7 días.

¿Ha usado demasiado de este medicamento?

No se conocen casos de sobredosis con el uso de Canesten gyno 3 según las instrucciones de uso.

En caso de duda, contacte a su médico o farmacéutico.

¿Olvidó usar este medicamento?

En ese caso, puede aplicar la dosis normal en el siguiente horario. No use una dosis doble para compensar una dosis olvidada de recuperar.

#### 4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Como todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos secundarios, aunque no todos los sufren. Con frecuencia desconocida, se han observado los siguientes efectos secundarios durante el uso de clotrimazol.

Trastornos del sistema inmunológico: hipersensibilidad en casos graves que conducen a hinchazón de los labios, la lengua y la garganta o una reacción anafiláctica (puede ir acompañada de náuseas, diarrea, presión arterial baja, dificultad para respirar, pérdida del conocimiento).

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: piel enrojecida, erupción cutánea con picazón, erupción cutánea, sensación de escozor/ardor en la piel.

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: irritación o reacción en el lugar de administración, acumulación de líquido. Al usar la crema, puede ocurrir irritación del pene en la pareja.

Trastornos del sistema reproductor y de las mamas: sangrado vaginal.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, comuníquese con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través de [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Al informar los efectos secundarios, puede ayudarnos a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. ¿CÓMO DEBE ALMACENAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Para Canesten gyno 3 crema no hay condiciones especiales de almacenamiento.

No use este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en la etiqueta del envase después de "EXP:". La fecha de vencimiento se refiere al último día de ese mes.

Los medicamentos no deben desecharse a través de las aguas residuales o con los desechos domésticos. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

## 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Qué sustancias contiene este medicamento?

Canesten gyno 3 es una crema para uso vaginal. El principio activo de este medicamento es clotrimazol.

Otros excipientes en este medicamento son: estearato de sorbitán (E491), polisorbato 60 (E435), alcohol cetilestearílico, palmitato de cetilo, 2-octildodecanol, alcohol bencílico, agua purificada.

¿Cómo se presenta Canesten gyno 3 y cuántos hay en un paquete?

Canesten gyno 3 crema vaginal está disponible en un paquete con un tubo de 20 gramos de crema y 3 aplicadores.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular del registro:

Euro Registratie Collectief b.v.  
Kempkens 2200  
5465 PR Veghel

Ompakker (ver etiqueta en el embalaje exterior):  
Brocacef B.V., Maroastraat 43, 1060 LG Amsterdam  
o  
Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Fabricante:  
Kern Pharma S.A.  
Terassa  
España

Bayer Healthcare AG  
Leverkusen  
Alemania

Famar AB  
Avlonas Attikis  
Grecia

GP Grenzach Produktions GmbH  
Grenzach-Wyhlen  
Alemania

Inscrito en el registro bajo:  
RVG 121639//08935 Canesten gyno 3, crema para uso vaginal 20 mg/g (Grecia)

Este medicamento se comercializa en el país de origen bajo el nombre:  
Grecia: Canesten 2% κολπική κρέμα

Este prospecto fue aprobado por última vez en marzo de 2025 ((130225)).