

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Canesten gyno 3, krem til vaginal bruk 20 mg/g
klotrimazol

Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke dette legemidlet, for det inneholder viktig informasjon for deg.

Oppbevar dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Har du flere spørsmål? Ta kontakt med legen din eller apoteket.

Ikke gi dette legemidlet til andre, da det kun er foreskrevet til deg. Det kan være skadelig for andre, selv om de har de samme symptomene som deg.

Får du bivirkninger som er nevnt i avsnitt 4? Eller får du bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget? Ta da kontakt med legen din eller apoteket.

Innhold av dette pakningsvedlegget

1. Hva er Canesten gyno 3 og hva brukes dette legemidlet til?
2. Hva du må vite før du bruker dette legemidlet
3. Hvordan bruke dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevare dette legemidlet?
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. HVA ER CANESTEN GYNO 3 OG HVA BRUKES DETTE LEGEMIDLET TIL?

Canesten gyno 3 inneholder som virkestoff klotrimazol. Klotrimazol er et stoff som dreper visse typer sopp eller gjær, eller hemmer veksten av dem.

Legen din har diagnostisert en soppinfeksjon i skjeden. Den vanligste årsaken er Candida albicans. Denne soppen er normalt til stede på huden og kan under visse omstendigheter forårsake plager, som det oppstå av vaginal utflod, kjent som hvit utflod. Canesten gyno 3 brukes ved infeksjoner i skjeden, som er forårsaket av visse sopp- eller gjærtyper.

2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER DETTE MIDDELET

Når skal du ikke bruke dette middelet?

Du er allergisk mot en av stoffene i dette legemidlet, som cetylstearylalcohol. Disse stoffene finner du i avsnitt 6. Når må du være ekstra forsiktig med dette middelet? Canesten gyno 3 vaginal krem skal ikke brukes under menstruasjon, fordi man da ikke kan stole fullt ut på virkningen. Sørg derfor for at kuren er avsluttet før den tid. Dette middelet inneholder 2 gram benzylalkohol i hver 100 gram krem, tilsvarende 20 mg/g krem. Benzylalkohol kan forårsake lett lokal irritasjon.

Den vaginale kremen skal ikke brukes ved overfølsomhet for

cetylstearylalcohol cetylstearylalcohol, fordi dette stoffet er brukt som hjelpestoff i kremen (100 mg per gram). I så fall kan den (også kommersielt tilgjengelige) vaginale tablettene brukes. Cetylstearylalcohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Canesten gyno 3 krem kan redusere effekten og sikkerheten til gummiprodukter som kondomer og pessarer. Effekten er midlertidig og oppstår kun under behandlingen.

Bruk av Canesten gyno 3 i kombinasjon med andre legemidler
Det er ingen kjente interaksjoner mellom Canesten gyno 3 og andre legemidler.

Informér legen eller apoteket ditt hvis du bruker andre legemidler eller nylig har brukt. Dette gjelder også legemidler du kan bruke uten resept.

Graviditet, amming og fruktbarhet

Graviditet

Canesten gyno 3 kan, så vidt kjent, brukes uten fare for fosteret i den anbefalte doseringen under graviditet, om nødvendig. Under graviditet bør bruk av applikatoren unngås, og administrering av de (også kommersielt tilgjengelige) vaginale tablettene for hånd foretrekkes. Den vaginale tablettene kan settes inn for hånd settes inn.

Amming

Canesten gyno 3 kan brukes i henhold til resepten under amming.

Fertilitet

Det er ingen studier på mennesker om effektene av klotrimazol på fertilitet, men dyrestudier har ikke vist noen effekt av legemidlet på fertilitet.

Er du gravid, tror du at du er gravid, ønsker du å bli gravid eller ammer du? Kontakt legen din eller apoteket før du bruker dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke forventet at dette legemidlet påvirker disse funksjonene.

3. HVORDAN BRUKER DU DETTE MIDDELET?

Følg nøye legens råd når du bruker Canesten gyno 3. Kontakt legen din eller apoteket ved tvil.

Generelt vil legens resept være: i tre påfølgende dager én gang daglig – om kvelden før sengetid – innfør én applikatorfylling (ca. 5 gram) vaginal krem så dypt som mulig i skjeden. For hver administrasjon skal en ny applikator brukes, som deretter kan kastes.

Når infeksjonen også har spredt seg utenfor skjeden, rundt kjønnsleppene, kan, også for å forhindre reinfeksjon, på resept fra legen i tillegg clotrimazol krem for vaginal bruk 10 mg/g brukes. Påfør denne kremen tynt på de berørte områdene to ganger daglig i omtrent én uke.

Bruksanvisning

Innføring av den vaginale kremen gjøres best i ryggeleie, med litt opptrukne og spredte ben.

Canesten gyno 3 vaginal krem administreres som følger:

1. Åpne tuben ved å trykke hetten omvendt gjennom aluminiumsforseglingen.
2. Trekk staven på applikatoren ut til anslaget.
3. Sett applikatoren på tuben, hold den godt fast og fyll den helt ved forsiktig å klemme på tuben.
4. Ta applikatoren av tuben, før den så dypt som mulig inn i skjeden (best i ryggeleie) og tøm ved å trykke inn staven.
5. Fjern applikatoren og kast den.

Generelt

Partneren bør behandles med en soppdrepende krem ved infeksjon av penis for å forhindre gjensidig smitte.

Ved vedvarende infeksjoner bør man vurdere en mulig smitte via endetarmen, som da må behandles.

Hvis du merker at Canesten gyno 3 for sterk eller for lite virker, kontakt legen din eller apoteket.

Rådfør deg med en lege hvis symptomene varer lenger enn 7 dager.

Har du brukt for mye av dette middelet?

Det er ingen kjente tilfeller av overdosering ved bruk av Canesten gyno 3 i henhold til bruksanvisningen.

Kontakt legen din eller apoteket ved tvil.

Har du glemt å bruke dette middelet?

I så fall kan du bruke den vanlige dosen på neste tidspunkt. Ikke bruk dobbel dose for å ta igjen en glemt dose inn .

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan også dette legemidlet ha bivirkninger , men ikke alle får dem. Med ukjent frekvens er følgende bivirkninger observert under bruk av klotrimazol.

Immunsystemlidelser: overfølsomhet i alvorlige tilfeller som fører til hevelse av leppene, tungen og halsen eller en anafylaktisk reaksjon (kan eventuelt ledsages av kvalme, diaré, lavt blodtrykk, pustevansker, bevisstløshet).

Hud- og underhudslidelser: rød hud, kløende utslett, hudutslett, stikkende/brennende følelse i huden.

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: irritasjon eller reaksjon på administrasjonsstedet, væskeansamling. Ved bruk av kremen kan partneren oppleve irritasjon av penis.

Forplantningssystem- og brystlidelser: vaginal blødning.

Rapportering av bivirkninger

Får du bivirkninger, kontakt legen din eller apoteket. Dette gjelder også for mulige bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via www.lareb.nl. Ved å rapportere bivirkninger kan du hjelpe oss med å få mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

5. HVORDAN OPPBEVARER DU DETTE LEGEMIDLET?

Oppbevares utilgjengelig for barn.

For Canesten gyno 3 krem er det ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på pakningen etter "EXP:". Utløpsdatoen refererer til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller med husholdningsavfall. Spør apoteket hva du skal gjøre med medisiner som ikke lenger er nødvendig. Disse tiltakene vil bidra til å beskytte miljøet.

6. INNHOLD AV PAKNINGEN OG ØVRIG INFORMASJON

Hvilke stoffer inneholder dette legemidlet?

Canesten gyno 3 er en krem for vaginal bruk. Det aktive stoffet i dette legemidlet er klotrimazol. Andre hjelpestoffer i dette legemidlet er: sorbitanstearat (E491), polysorbat 60 (E435), cetylstearylalkohol, cetylpalmitat, 2-oktyldodekanol, benzylalkohol, rensset vann.

Hvordan ser Canesten gyno 3 ut og hvor mye er det i en pakke?

Canesten gyno 3 vaginal krem er tilgjengelig i en pakke med en tube med 20 gram krem og 3 applikatorer.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og produsent

Registreringsinnehaver:

Euro Registratie Collectief b.v.

Kempkens 2200

5465 PR Veghel

Ompakker (se etikett på ytteremballasjen):

Brocacef B.V., Maroastraat 43, 1060 LG Amsterdam

eller

Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Produsent:

Kern Pharma S.A.

Terrassa

Spania

Bayer Healthcare AG
Leverkusen
Tyskland

Famar AB
Avlonas Attikis
Hellas

GP Grenzach Produktions GmbH
Grenzach-Wyhlen
Tyskland

Registrert i registeret under:
RVG 121639/08935 Canesten gyno 3, krem for vaginal bruk 20 mg/g (Hellas)

Dette legemidlet markedsføres i opprinnelseslandet under navnet:
Hellas: Canesten 2% κολπική κρέμα

Denne pakningsvedlegget ble sist godkjent i mars 2025 ((130225)).