

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Canesten gyno 3, creme para uso vaginal 20 mg/g
clotrimazol

Leia atentamente todo o folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Guarde este folheto. Pode ter necessidade de o reler.

Tem mais perguntas? Entre em contato com o seu médico ou farmacêutico.

Não dê este medicamento a outras pessoas, pois foi receitado apenas para si. Pode ser prejudicial para outras pessoas, mesmo que apresentem os mesmos sintomas que você. Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Conteúdo deste folheto O que é

1. Qual é Canesten gyno 3 e para que este medicamento é utilizado?
2. O que você precisa saber antes de usar este medicamento
3. Como usar este medicamento?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar este medicamento?
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O QUE É CANESTEN GYNO 3 E PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É UTILIZADO?

Canesten gyno 3 contém como substância ativa clotrimazol. Clotrimazol é uma substância que mata ou inibe o crescimento de certos tipos de fungos ou leveduras.

Seu médico diagnosticou uma infecção fúngica na vagina (vagina). O causador mais comum é a Candida albicans. Este fungo está normalmente presente na pele e pode causar sintomas sob certas condições, como o surgimento de corrimento vaginal, conhecido como leucorreia. Canesten gyno 3 é utilizado em infecções vaginais causadas por certos tipos de fungos ou leveduras.

2. O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

Quando você não deve usar este medicamento?

Você é alérgico a algum dos componentes deste medicamento, como cetilestearilálcool. Você pode encontrar essas substâncias na seção 6. Quando deve ter cuidado extra com este medicamento? Canesten gyno 3 creme vaginal não deve ser utilizado durante a menstruação, pois não se pode confiar completamente na eficácia. Portanto, certifique-se de que o tratamento seja concluído antes desse período.

Este medicamento contém 2 gramas de álcool benzílico em cada 100 gramas de creme, correspondendo a 20 mg/g de creme. O álcool benzílico pode causar leve irritação local.

O creme vaginal não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade ao cetilestearilálcool, pois esta substância é utilizada como excipiente no creme (100 mg por grama). Nesse caso, pode-se usar o comprimido vaginal (também disponível no mercado). Álcool cetilestearílico pode causar reações cutâneas locais (por exemplo, dermatite de contato).

Canesten gyno 3 creme pode reduzir a eficácia e segurança de produtos de borracha como preservativos e diafragmas. O efeito é temporário e ocorre apenas durante o tratamento.

Uso de Canesten gyno 3 em combinação com outros medicamentos

Não são conhecidas interações de Canesten gyno 3 com outros medicamentos.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tomou recentemente outros medicamentos. Isto também se aplica a medicamentos que pode obter sem receita médica.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Gravidez

Canesten gyno 3 pode, tanto quanto se sabe, ser usado sem perigo para o feto na dosagem recomendada durante a gravidez, se necessário. Durante a gravidez, deve-se evitar o uso do aplicador e a administração dos comprimidos vaginais (também disponíveis comercialmente) com a mão é preferível. O comprimido vaginal pode ser inserido com a mão inserido.

Amamentação

Canesten gyno 3 pode ser usado durante a amamentação conforme prescrito.

Fertilidade

Não foram realizados estudos em humanos sobre os efeitos de clotrimazol na fertilidade, mas estudos em animais não demonstraram efeito do medicamento na fertilidade.

Está grávida, pensa estar grávida, quer engravidar ou está a amamentar? Então, entre em contato com o seu médico ou farmacêutico antes de usar este medicamento.

Habilidade para dirigir e usar máquinas

Não se espera que este medicamento tenha influência nessas funções.

3. COMO UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Siga rigorosamente o conselho do seu médico ao usar Canesten gyno 3. Consulte o seu médico ou farmacêutico em caso de dúvida.

Em geral, a prescrição do seu médico será: durante três dias consecutivos, uma vez por dia - à noite antes de dormir - inserir uma carga de aplicador (aproximadamente 5 gramas) de creme vaginal o mais profundamente possível na vagina. Para cada administração, deve ser usado um novo aplicador, que pode ser descartado após o uso.

Quando a infecção também se estende além da vagina, ao redor dos lábios vaginais, pode, também para prevenir reinfecção, por prescrição médica, além disso, clotrimazol creme para uso

vaginal 10 mg/g ser aplicada. Aplique esta creme duas vezes ao dia em camada fina nas áreas afetadas por aproximadamente uma semana.

Instruções de uso

A aplicação da creme vaginal é melhor realizada em posição deitada, com as pernas ligeiramente dobradas e afastadas.

Canesten gyno 3 creme vaginal é administrada da seguinte forma:

1. Abra o tubo pressionando a tampa invertida contra o lacre de alumínio.
2. Puxe o êmbolo do aplicador até o limite.
3. Coloque o aplicador no tubo, mantenha pressionado e encha completamente apertando suavemente o tubo.
4. Retire o aplicador do tubo, insira-o o mais profundamente possível na vagina (preferencialmente em posição deitada) e esvazie pressionando o êmbolo.
5. Remova o aplicador e descarte-o.

Geral

O parceiro deve ser tratado com um creme antifúngico em caso de infecção do pênis para evitar contaminação mútua.

Em infecções persistentes, deve-se considerar uma possível contaminação via reto, que então deve ser tratada.

Se você notar que Canesten gyno 3 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Consulte um médico se os sintomas persistirem por mais de 7 dias.

Usou uma quantidade excessiva deste medicamento?

Não há casos conhecidos de sobredosagem com o uso de Canesten gyno 3 de acordo com as instruções de uso.

Em caso de dúvida, entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Esqueceu-se de usar este medicamento?

Nesse caso, pode aplicar a dose normal no próximo horário. Não use uma dose dupla para compensar uma dose esquecida

em 4. POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS

Como qualquer medicamento, este

medicamento pode ter efeitos colaterais efeitos colaterais do medicamento tamsulosina: reações alérgicas, incluindo erupção cutânea, prurido, urticária, angioedema e dificuldades respiratórias. clotrimazol.

Doenças do sistema imunológico: hipersensibilidade em casos graves levando ao inchaço dos lábios, língua e garganta ou uma reação anafilática (pode ser acompanhada de náusea, diarreia, pressão arterial baixa, dificuldade para respirar, perda de consciência).

Doenças da pele e do tecido subcutâneo: pele vermelha, erupção cutânea com coceira, erupção cutânea, sensação de formigamento/ardor na pele.

Distúrbios gerais e condições no local de administração: irritação ou reação no local de aplicação, retenção de líquidos. O uso do creme pode causar irritação no pênis do parceiro.

Doenças do sistema reprodutor e da mama: sangramento vaginal.

Relatar efeitos colaterais

Se você tiver efeitos colaterais, entre em contato com seu médico ou farmacêutico. Isso também se aplica a possíveis efeitos colaterais que não estão listados nesta bula. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do site www.lareb.nl. Ao relatar efeitos colaterais, você nos ajuda a obter mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. COMO CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha fora da vista e do alcance das crianças.

Para Canesten gyno 3 creme não há condições especiais de armazenamento.

Não use este medicamento após a data de validade indicada no rótulo da embalagem após "EXP:". A data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Os medicamentos não devem ser descartados no esgoto ou com o lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico o que fazer com medicamentos que não são mais necessários. Estas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES

Quais substâncias estão neste medicamento?

Canesten gyno 3 é um creme para uso vaginal. A substância ativa neste medicamento é clotrimazol.

Outros excipientes neste medicamento são: estearato de sorbitano (E491), polissorbato 60 (E435), álcool cetilestearílico, palmitato de cetila, 2-octildodecanol, álcool benzílico, água purificada.

Como é Canesten gyno 3 e quanto contém uma embalagem?

Canesten gyno 3 creme vaginal está disponível em uma embalagem com um tubo de 20 gramas de creme e 3 aplicadores.

Titular da autorização de introdução no mercado e fabricante

Titular do registro:

Euro Registratie Collectief b.v.

Kempkens 2200

5465 PR Veghel

Ompakker (veja rótulo na embalagem externa):
Brocacef B.V., Maroastraat 43, 1060 LG Amsterdam
ou
Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Fabricante:
Kern Pharma S.A.
Terassa
Espanha

Bayer Healthcare AG
Leverkusen
Alemanha

Famar AB
Avlonas Attikis
Grécia

GP Grenzach Produção GmbH
Grenzach-Wyhlen
Alemanha

Registrado sob:
RVG 121639//08935 Canesten gyno 3, creme para uso vaginal 20 mg/g (Grécia)

Este medicamento é comercializado no país de origem sob o nome:
Grécia: Canesten 2% κολπική κρέμα

Este folheto foi aprovado pela última vez em março de 2025 ((130225)).