

## BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Canesten gyno 3, kräm för vaginal användning 20 mg/g  
klotrimazol

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

Har du fler frågor? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det är ordinerat endast till dig. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma symtom som du.

Får du biverkningar som nämns i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte nämns i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Canesten gyno 3 och vad används detta läkemedel för?
2. Vad du behöver veta innan du använder detta läkemedel
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

### 1. VAD ÄR CANESTEN GYNO 3 OCH VAD ANVÄNDS DETTA LÄKEMEDEL FÖR?

Canesten gyno 3 innehåller den aktiva substansen klotrimazol. Klotrimazol är ett ämne som dödar vissa svamp- eller jästtyper eller hämmar tillväxten av dem.

Din läkare har fastställt att du har en svampinfektion i slidan. Den vanligaste orsaken är *Candida albicans*. Denna svamp finns normalt på huden och kan under vissa omständigheter orsaka besvär, såsom uppkomsten av vaginal flytning, känd som vit flytning. Canesten gyno 3 används vid infektioner i slidan, som orsakas av vissa svamp- eller jästtyper.

### 2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DETTA LÄKEMEDEL

När ska du inte använda detta läkemedel?

Du är allergisk mot någon av ingredienserna i detta läkemedel, såsom cetylstearylalcohol. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6. När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel? Canesten gyno 3 vaginalkräm bör inte användas under menstruation, eftersom man då inte helt kan lita på effekten. Se därför till att behandlingen är avslutad innan dess. Detta läkemedel innehåller 2 gram bensylalkohol i varje 100 gram kräm, motsvarande 20 mg/g kräm. Bensylalkohol kan orsaka lätt lokal irritation.

Vaginalkrämen bör inte användas vid överkänslighet mot

cetylstearylalcohol cetylstearylalcohol, eftersom detta ämne har bearbetats som hjälpämne i krämen (100 mg per gram). I det fallet kan den (även kommersiellt tillgängliga) vaginaltablett användas. Cetylstearylalcohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Canesten gyno 3 kräm kan minska effekten och säkerheten av gummiprodukter som kondomer och pessar. Effekten är tillfällig och uppstår endast under behandlingen.

Användning av Canesten gyno 3 i kombination med andra läkemedel

Det finns inga kända interaktioner mellan Canesten gyno 3 och andra läkemedel.

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel eller nyligen har använt. Detta gäller även läkemedel som du kan använda utan recept.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Canesten gyno 3 kan, såvitt känt, utan fara för fostret i den rekommenderade doseringen användas under graviditet, om det behövs. Under graviditeten bör användning av applikatorn undvikas och administrering av de (även kommersiellt tillgängliga) vaginaltabletter för hand föredras. Vaginaltablett kan föras in för hand införas.

Amning

Canesten gyno 3 kan användas enligt föreskrift under amning.

Fertilitet

Det finns inga studier på människor om effekterna av clotrimazol på fertiliteten, men djurstudier har inte visat någon effekt av läkemedlet på fertiliteten.

Är du gravid, tror du att du är gravid, vill du bli gravid eller ammar du? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det förväntas inte att detta läkemedel påverkar dessa funktioner.

### 3. HUR ANVÄNDER DU DETTA LÄKEMEDEL?

Följ vid användning av Canesten gyno 3 noggrant din läkares råd. Rådfråga vid tveksamhet din läkare eller apotekare.

I allmänhet kommer din läkares föreskrift att vara: under tre på varandra följande dagar en gång per dag – på kvällen före sänggåendet – en applikatorfyllning (ca 5 gram) vaginalkräm så djupt som möjligt i slidan. För varje administrering ska en ny applikator användas, som sedan kan kastas.

När infektionen också har spridit sig utanför slidan, runt blygdläpparna, kan, även för att förhindra återinfektion, på läkares ordination dessutom clotrimazol kräm för vaginalt bruk 10 mg/g användas. Applicera denna kräm tunt på de drabbade områdena två gånger om dagen under ungefär en vecka.

## Bruksanvisning

Införandet av den vaginala krämen görs bäst i ryggläge, med något uppdragna och isärspridda ben.

Canesten gyno 3 vaginal kräm administreras enligt följande:

1. Öppna tuben genom att trycka tubens lock omvänt genom aluminiumförseglingen.
2. Dra ut applikatorns stav till stoppet.
3. Sätt applikatorn på tuben, håll den fast och fyll den helt genom att försiktigt klämma på tuben.
4. Ta bort applikatorn från tuben, för in den så djupt som möjligt i slidan (bäst i ryggläge) och töm den genom att trycka in staven.
5. Ta bort applikatorn och kasta den.

## Allmänt

Partnern bör vid infektion av penis behandlas med en svampdödande kräm för att förhindra ömsesidig smitta.

Vid envisa infektioner bör man tänka på en möjlig smitta via ändtarmen, som då måste behandlas.

Om du märker att Canesten gyno 3 för starkt eller för svagt verkar, kontakta din läkare eller apotekare.

Rådfråga en läkare om besvären varar längre än 7 dagar.

Har du använt för mycket av detta läkemedel?

Det finns inga kända fall av överdosering vid användning av Canesten gyno 3 enligt bruksanvisningen.

Kontakta din läkare eller apotekare vid tveksamhet.

Har du glömt att använda detta läkemedel?

Du kan i så fall använda den normala dosen vid nästa tillfälle. Använd inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos att ta igen.

## 4. MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel ha biverkningar, även om inte alla drabbas. Med okänd frekvens har följande biverkningar fastställts under användning av klotrimazol.

Immunsystemsjukdomar: överkänslighet i allvarliga fall som leder till svullnad av läppar, tunga och hals eller en anafylaktisk reaktion (kan eventuellt åtföljas av illamående, diarré, sänkt blodtryck, andningssvårigheter, medvetslöshet).

Hud- och subkutana sjukdomar: röd hud, kliande utslag, hudutslag, stickande/brännande känsla i huden.

Allmänna sjukdomar och administreringsstörningar: irritation eller reaktion på administreringsstället, vätskeansamling. Vid användning av krämen kan irritation av penis uppstå hos partnern.

Fortplantningssystem- och bröstsjukdomar: vaginal blödning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta din läkare eller apotekare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

## 5. HUR FÖRVARAR DU DETTA LÄKEMEDEL?

Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

För Canesten gyno 3 kräm finns inga speciella förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på etiketten på förpackningen efter "EXP:". Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller med hushållsavfall. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

## 6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIG INFORMATION

Vilka ämnen finns i detta läkemedel?

Canesten gyno 3 är en kräm för vaginal användning. Den aktiva substansen i detta läkemedel är clotrimazol.

Andra hjälpämnen i detta läkemedel är: sorbitanstearat (E491), polysorbat 60 (E435), cetylstearylalkohol, cetylpalmitat, 2-octyldodekanol, bensenalkohol, renat vatten.

Hur ser Canesten gyno 3 ut och hur mycket finns det i en förpackning?

Canesten gyno 3 vaginalkräm finns tillgänglig i en förpackning med en tub med 20 gram kräm och 3 applikatorer.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare

Registreringsinnehavare:

Euro Registratie Collectief b.v.

Kempkens 2200

5465 PR Veghel

Ompakker (se etikett på ytterförpackningen):

Brocacef B.V., Maroastraat 43, 1060 LG Amsterdam

eller

Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Tillverkare:  
Kern Pharma S.A.  
Terrassa  
Spanien

Bayer Healthcare AG  
Leverkusen  
Tyskland

Famar AB  
Avlonas Attikis  
Grekland

GP Grenzach Produktions GmbH  
Grenzach-Wyhlen  
Tyskland

Registrerad under:  
RVG 121639/08935 Canesten gyno 3, kräm för vaginal användning 20 mg/g (Grekland)

Detta läkemedel marknadsförs i ursprungslandet under namnet:  
Grekland: Canesten 2% κολπική κρέμα

Denna bipacksedel godkändes senast i mars 2025 ((130225)).