

PAKENDI INFOLEHT

NIMETUS

CAVERJECT®

(Alprostadiil)

KOOSTIS

CAVERJECT® 5 µg pulber lahuse valmistamiseks süstimiseks Süstimislahus Lahusti ühekordses süstlas I. Alprostadiil. 5 µg -

Laktoos . -Naatrium Naatrium. tsitraat - Acid. hydrochloric. lahjendatud. - Naatrium. hüdroksiid.

II. Bensüülalkohol. - Aqua ad süstimiseks. q.s. ad 1 ml.

CAVERJECT® 10 µg Pulber süstelahuse valmistamiseks ühe Süstimislahus + Lahusti in Ühekordne süstal

I. Alprostadiil. 10 µg - Laktoos. - Naatrium. tsitraat - Vesinikkloriidhape. lahjendatud. - Naatrium. hüdroksiid.

II. Bensüülalkohol. - Aqua ad injektsioon. q.s. ad 1 ml.

CAVERJECT® 20 µg pulber süstelahuse valmistamiseks ühe süstelahuse + lahusti ühekordseks kasutamiseks

I. Alprostadiil. 20 µg - Laktoos. - Naatrium. tsitraat - Vesinikkloriidhape. lahjendatud. - Naatrium. hüdroksiid.

II. Bensüülalkohol. - Aqua ad injekt. q.s. ad 1 ml.

FARMAATILINE VORM JA MUUD PAKENDISUURUSED

Lahus süstimiseks :: tekib segamisel kuivaine ga segamisel kuivaine koos lahustiga lahusti. Pakendi suurused:

CAVERJECT® 5 µg pulber valmistamiseks lahuse süstimiseks lahus + lahusti ühekordses süstlas:

1 pakendi suurus on: 1 Süstal alates 5 ml koos kuivaine + 1 eelnevalt täidetud süstal koos 1 ml lahustiga + 2 nõela (27 G 1/2 tolli ja 22 G 1 1/2 tolli) + 2 alkoholitamponi

CAVERJECT® 10 µg pulber valmistamiseks valmistamine ühest Süstelahus + Lahusti in Ühekordne süstal:

1 ja 5 Pakendi suurused alates: 1 Süstal 5 ml koos Kuivaine + 1 eelnevalt täidetud Süstal Süstal koos 1 ml lahusti + 2 nõela (27 G 1/2 tolli ja 22 G 1 1/2 tolli) + 2 alkoholitamponi

CAVERJECT® 20 µg pulber lahuse valmistamiseks süstimiseks lahus + lahusti ühekordse süstlaga:

1 ja 5 Pakendi suurused alates: 1 süstal alates 5 ml koos kuivaine + 1 eelnevalt täidetud süstal koos 1 ml lahustiga + 2 nõela (27 G 1/2 tolli ja 22 G 1 1/2 tolli) + 2 alkoholipuhastid Väljastamiseeskiri: retseptiravim.

RAVIMIGRUPP

Toimeaine Alprostadiil (Prostaglandiin E1) Alprostadiil (Prostaglandiin E1) keemiliselt vaadatuna rasvhape , mis organismislooduslikult esineb . Alprostadiil esineb. Alprostadiil põhjustab mh. ühe laienemist der veresoonte ja pidurdab surm aktiivsust der vereliistakute. Süstimise süstimine sisse peenise korgaskehasse peenise tekitab ühe Ereksioon esile kutsutud.

LUBANUMBRI OMANIK, TOOTJA

Pfizer S.A., Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel

Tootja : Pfizer Manufacturing Belgium, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgia

KASUTAMINE

Ravi erektilise düsfunktsiooni, mille põhjus on närvisüsteem või den vereringe tõttu on, või mille päritolu psühholoogiline laadi on. Põhjus põhjus võib ka olla erinevat laadi. Diagnoos erektilise düsfunktsiooni düsfunktsioonist.

TINGIMUSED, MILLE KORRAL TULEB SELLE RAVIMIGA RAVI

VÄLTIDA CAVERJECT® ei tohi järgmistel patsientidel kasutada: patsientidel ülitundlikkusega Alprostadiili

või mõne teise koostisosa vastu või mõne teise koostisosa vastu ravimi CAVERJECT®.

Patsiendid koos kalduvusega pikaajalisele erektsioonile kui tagajärg sirprakuline aneemia , latentnesirprakuline haigus või verevähk Sirprakuline aneemia leukeemia , võiverevähk, müeloom Müeloom).

Patsiendid koos teatud kõrvalekalded peenisest (köverus, fimooos ja Peyronie haigus).

Patsiendid koos peenisproteesiga.

Patsiendid, mille puhul millele seksuaalne aktiivsus ei ole näidustatud ..

ei tohi naistele ,lastele ja vastsündinutele ei manustada manustatud ERITI

ETTEVAATUSABINÕUD ETTEVAATUSABINÕUD

Enne ravi alustamist CAVERJECT®-iga teeb teie arst kindlaks erektsioonihäirete põhjuse ja , vajadusel kindlaks tegema ravibsed . nõutav, ravima.

Pärast süstimist ravimiga CAVERJECT® võib tekkida püsiv erektsioon .. , mis kestabkauem kui 4 tundi peab kestma, tuleb alati Teie arstile teatatud peab olema. Enne alustamist ravi CAVERJECT®-iga arst määrab , millised meetmed sellesjuhtumis milline Meetmed sisse selle Juhtum tuleb teha peavad.

Üks regulaarne kontroll ja üks hoolikas uuring peenise peab toimuma, nii et üks suurenemine kohta sidekoe sisse peenis õigeaegselt avastatakse võib olla. Ravi ravi koos CAVERJECT®-iga tuleb katkestada , kui ilmnevad kõrvalekalded peenise kuju või kõvastumised Kõvastumised im Peenis esineda.

Alprostadiil pakub pärast süstimist peenise korgaskehasse ei kaitset seksuaalsel teel levivate haiguste vastu. Kasutage Te vajalikud kaitsevahendid leviku vastu sugulisel teel levivate haiguste nagu näiteks AIDS (HIV-viirus).Süst CAVERJECT® võib lisaks põhjustada ka ühe reaktsiooni väike veritsus juures süstekoha peal (vt "kõrvaltoimed ")põhjustada esile kutsumanii et Te ennast nende haigustega tunneksite haigused kergem nakatada saavad.

CAVERJECT® ei tohi koos koos ühegi teise ravimiga ravi impotentsuse raviks süstida

Erektsioonihäired See ravim

ei tohi kasutada määrati teile osana teatud meditsiinilise ravi osana välja. See ei tohi ei teistele isikutele ega kasutamiseks muude kaebuste raviks kasutada. saada.

KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITE JA TOIDUGA

Kui Teie Ravimid vere hüübimise takistamiseks (nagu varfariin või hepariin) kasutamine, võib suurendada kalduvust veritsusele. Kalduvus kuni Verejooksud tugevdama.

KASUTAMINE: KUIDAS JA KUI PALJU

Iga sõltuvalt, millest põhjusest Põhjus erektsioonihäire eksisteerib, määrab Teie arst kindlaks, milline kogus süstida süstib kasutatakse peaks.

Järgige Teie seetõttu täpselt die juhiseid Teie arsti.

Algannus on tavaliselt 1,25 - 5 mikrogrammi (μg) alprostadiili. Sellele Siinpeale saab annus annustamine järk-järgult suurendatud, kuni õige annus saavutatud on. Enamasti põhjustab see annus ühe erektsiooni, mis kestab 1 tund püsib. Kui erektsioon kauem kestab, konsulteerige oma arstiga.. algab erektsioon 10 - 30 minuti jooksul pärast süstimist 10 - 30 minutit pärast der Süst üks.

Üldiselt üldiselt on tavaline annus vahemikus 1,25 ja 20 mikrogrammi ühe süsti. Kasutamine kasutamine rohkem kui 60 mikrogrammi pro Süstimine ei ole mitte soovitatav.

CAVERJECT® ei tohiks mitte sagedamini kui ühe korra päevas ja kolm korda nädalas kasutada. Konsultatsioon arstiga Teie arsti soovitakse kõik kolm kuni neli kuud soovitatav. Kui vajalik või soovitud, kuid ainult kooskõlastatult kokkuleppel teie arstiga Arst, võib annust järk-järgult kohandada. Järgige täpselt oma arsti juhiseid. Konsulteerige.

arstiga või apteekriga, Arst või Apteeker, kui Teil küsimusi seoses selle kasutamise selle ravimi on.

LAHUSE VALMISTAMINE

Lahuse valmistamine peab toimuma steriilselt. Protseduur. Protseduur Teie järgi den soovitusi Teie arsti

ja järgige Teie siin järgnevalt antud tööviisi.

1. Peske Teie ennast die käed ja kuivatage Teie neid koos ühe värske rätikuga ära.

2. Eemaldage Teie den plastikkate des pulbripudelilt (kate ise jääb alati pudelil pudel).

Desinfitseerige Te pealispind kaas kaane kaas koos ühe kahest desinfitseerimislapist, mille Te järel ära viskate.

3. Olenevalt pakendi tüübist, midakasutate, toimige järgmiselt:CAVERJECT®- pakend: pudel pulbriga + ühekordne süstal

CAVERJECT®-Pakend: Pudel koos Pulber + Ühekordne süstal koos lahusti

- Eemaldage Te pikk nõel (22 G 1 ½ tolli) pakendist pakend järgides tähelepanu, et plastikkaitse peal nõelal püsib. Pöörake.
- Pöörama Te valge tihend süstla peal katki, nii et see puruneb ..
- nõel plastikust kaitsega Nõel koos dem Plastikkaitse peal süstla nõel, keerates Te seda sinna ..
- Te nõela plastikkate nõela . 4..

4. nõel Teie nüüd nõela nõel läbi desinfitseeritud desinfitseeritud kummikork pulberviaali pulberviaali ja süstige Te kogu kogu vedelik välja süstlast süstlast pulbrisse.

5. See Pudel kergelt raputada (ilma süstalt süstal tagasi tõmbamata), kuni pulber on täielikult lahustunud ..

lahus on nüüd kasutusvalmis ja võib võib süstitakse peavad olema. Teie sisaldab 5, 10 või 20 µg Alprostadili ml kohta. Pärast seda ei tohi muid teisi tooteid lahuse lahusele lisada tohib. Lahus Lahus peab olema hele ja värvitu olema. Vastasel juhul ei tohi Te seda süstida injitseerida. Kui säilitamine originaalviaalis on valmistatud lahus toatemperatuuril lahus toatemperatuuril (15 - 25 °C) 24 (15 - 25 °C) 24 Tundi pikk säilivusaeg. Lahus ei tohi külmutada külmutatud saada.

LAHUSE SÜSTIMINE PEENISESSE

Esimene süst peaks teostama teie arst . manustatakse Selle käigus peaks teile Teile die Protseduur süstimiseks süstimine õpetatud olema. Järgige Te täpselt seda protseduuri, kui Te ise endale CAVERJECT® manustate. Te saama siinjuures Samm-sammult järgmised juhised järgima.

1. Imemine Teie see jaoks Teie soovitud lahusekogus süstlasse ..
2. Teie see die Ühendus vahel nõela ja süstla (see nõel jääb viaali).Tooge
3. Te süstlanõel (see on lühike nõel kasutatakse selleks et lühike Nõel, 27 G 1/2 tolli) peal der süstla külge ja eemaldage Te kaitsekate Kaitsekest.
4. Te süstalt koos nõelaga allapoole der Nõel pärast üleval ja vajutage Teie ettevaatlikult peale kolvi , kunitilk väljub nõela otsast . Seejärel asetage Nõel väljavool. Pärast seda asetama Teie süstla süstal peal ühe kõva, tasane peal pind ja veenduge et, et nõel nõel ei koos esemetega sisse Puudutus tuleb.

5. Süstimine ise toimub

kergelt ..

te olete paremakäeline , hoidketeie peenist vasaku käega, lamedalt koos vasaku käe lamedam taha peenisepea taga. Kui Teie ei ole ümberlõigatud olete, veenduge Teie selles, et eesnakk nii kaugemale kui võimalik võimalik üle die tipu der peenisepea tagasi tõmmatud on. Tõmmake nüüd peenis vastu oma vasakut reit. Peenise ülaosas Ülemine osa näete nägema te üks väljaulatuvus, mis vasakule kaldub taganeb, kui te tugevamalt vajutate. See on üks kahest korgaskehast, ja siia sisse peab süst süstimine antud olema (varjutatud alad peal joonisel).Koos

teise desinfitseerimislappiga desinfitseerige nüüd parema käega nüüd koos parema käega parema käe Nahk üle korgaskeha , kuhute süstite hakkate ja laske sellel mõned sekundid kuivada . Hoidke.

peenist koos peenist koos vasaku käe samal ajal der süst hästi sirutatud. Koos parema käega torkama Te die nõel 90-kraadise nurga all parem nurk läbi die naha kuni kuni Korgaskeha. Vältige Te siinjuures pindmisi veresooni või muid märgatavaid struktuure. Süstige Te nüüd sisu süstla täielikult süstlasse täielikult sisse. Kui see ei kohe õnnestu, tõmmake te nõel nõel veidi tagasi ja proovige seda uuesti.

Tõmmake te siis nõel Nõel täielikult tagasi ja vajutage Te see desinfitseerimislapp peale süstekoha Süstekoht. Te oma peenist massaažite ,kandke Te Teie selleks juures, et see ravim hästi jaotatud saaks.

See saab soovitatud, et süstekohta vahetada ,nii nagu Teie Teie Arst es teile õpetanud on.

6. See lahus on ainult ühekordseks kasutamiseks sobiv .. jäägid tuleks hävitada . Sisse Ma olen Juhtumid, et Teie CAVERJECT®-pakend kasutate, mis koosneb pudelist koos pulbriga ja ühekordsest süstlast koosneb ,sisestage Teie Teie kõik sisse Pakend, tehke see pakend kinni ja sulgege see lõplikult koos punase kinnitusega . KÕRVALTOIMED.

teised kui siin

Ka teised kui siin allpool loetletud kõrvaltoimed võivad ilmned. Rääkige oma arstiga või apteekriga, kui probleemid tekivad, misteie arvates on olulised üks võimalik kõrvaltoime selle ravimi olla võivad. -

Genitaal- kõrvaltoimed

Ühe süstimise kolmest võib süstimisest olla kerge kuni mõõdukas kõrvaltoime Valu peenises erektsiooni ajal esineb. See kirjeldatakse vahel kui põletustunne või pingetunne. Tunne või kui üks Pingetunne kirjeldatud. Enamasti takistab see seksuaalsuhteid mitte. Harvadel juhtudel (3%) on verevalumid ümber süstekoha tekkinud Süstekoht sidekoekasv on täheldatud sidekoe peenises Peenis võib esineda. Pärast süstimist koos CAVERJECT® võib püsiv erektsioon kestusega 4 kuni 6 tundi esineda alates 4 kuni 6 Tundi esineda. Üks erektsioon alates 6 tundi või kauem esineb ainult harva .. erektsioon, miskauem kui 4 tundi kestab kestab, peate te alati oma arstile teatama.

Kohalikud kõrvaltoimed

Järgmised kohalikud kõrvaltoimed võivad harvadel juhtudel (1 - 1,5%) esineda: Väikesed sinised sinine Laigud kohas süstimiskohal, nahalööve, vedeliku kogunemine ja suurenemine sidekoe peenises. Kõrvaltoimed südame piirkonnas ja südame piirkonnas ja südame ja Veresooned Üks Annustamine alates rohkem kui 20 µg võib viia ühe languseni vererõhu vererõhk viia. Kui rohkem kui 30 µg võib üks kõrgeenenud pulsagedus ilmned.

Muud kõrvaltoimed

Teie arst on samuti teavitatud muudest soovimatutest toimetest, mis väga harva (< 1%) ilmned võivad, teavitab.

SÄILITAMINE

Kell toatemperatuuril (15 °C - 25 °C) säilitada.

Aegumiskuupäev aegumiskuupäev (kuu2Faasta) on pakendil der märgitud trükitud pärast "EXP." (EXP. = aegumiskuupäev). Pärast aegumist ei tohiks aegumiskuupäeva seda ravimit enam kasutada. Kui hoitakse originaalpakendis, säilib jääb valmistatud lahus toatemperatuuril (15°C - 25°C) 24 tundi (15°C - 25°C) 24 kasutatav. Valmistatud lahusei tohi külmutada. Ravim lastele kättesaamatu koht ei tohi olla kättesaadav lastele säilitada.

KASUTUSINFO SEIS

märts 2004

Siin antud teave on nii põhjalik ja spetsiifiline kui selles piiratud raamistikus oleva kasutusinfo võimalik. Meditsiinilised väljendid on võimaluse korral seletatud. Kui teil selle kohta veel küsimusi on, siis teie arst aitab või apteeker meeeldi aitama.