

PAKKAUSSELOSTE

NIMI

CAVERJECT®
(Alprostadiili)

KOOSTUMUS

CAVERJECT® 5 µg jauhe liuoksen valmistukseen injektionesteeksi Injektioneste liuotin kertakäyttöruiskussa I. Alprostadiili. 5 µg - Laktoosi . - Natrium. - Natrium. sitraatti - Suolahappo. laimennettu. - Natrium. hydroksidi. II. Bentsyylialkoholi. - Aqua ad injektio. q.s. ad 1 ml.

CAVERJECT® 10 µg Jauhe valmistukseen injektionesteen valmistamiseksi Injektioneste + Liuotin in Kertakäyttöruisku

I. Alprostadiili. 10 µg - Laktoos. - Natr. sitraatti - Acid. hydrochloric. dilut. - Natr. hydroksidi. II. Bentsyylialkoholi. - Aqua ad injekt. q.s. ad 1 ml.

CAVERJECT® 20 µg Jauhe valmistukseen liuoksen injektiota varten + Liuotin

kertakäyttöruiskussa I. Alprostadiili. 20 µg - Laktoosi . -Natrium .. - Suolahappo. laimennettu . -Natrium Natrium. hydroksidi. II. Bentsyylialkoholi. - Aqua ad injektio. q.s. ad 1 ml.

FARMASEUTTINEN MUOTO JA MUUT PAKKAUSKOOT

Liuos injektiota varten: se syntyy sekoittamalla kuiva-aineen kanssa Tarkoitettu aine liuottimen kanssa liuotin. Pakkauskoot:

CAVERJECT® 5 µg jauhe valmistukseen valmistus yksi injektioneste + liuotin kertakäyttöruiskussa Kertakäyttöruisku:

1 on : 1: 1 Injektio-pullo of 5 ml sisältää kuiva-ainetta + 1 esitäytetty ruisku sisältää 1 ml liuotinta + 2 neulaa (27 G 1/2 tuumaa ja 22 G 1 1/2 tuumaa) + 2 alkoholipyyhettä

CAVERJECT® 10 µg jauhe valmistukseen valmistus yksi Injektioneste + Liuotin in Kertakäyttöruisku:

1 ja 5 Pakkauskoot von: 1 Injektio-pullo von 5 ml mit Kuiva-aine + 1 esitäytetty Ruisku kanssa 1 ml liuotin + 2 neulaa (27 G 1/2 tuumaa ja 22 G 1 1/2 tuumaa) + 2 alkoholipyyhettä

CAVERJECT® 20 µg jauhe valmistukseen valmistus yksi injektioneste + liuotin kertakäyttöruiskussa Kertakäyttöruisku:

1 5 5 Pakkauskoot :1 injektio-pullo : 5 ml kuiva-aineen kanssa + 1 esitäytetty ruisku liuottimen kanssa 1 ml + 2 neulaa (27 G 1/2 tuumaa ja 22 G 1 1/2 tuumaa) + 2 alkoholipyyhettä

Luovutusehdot: reseptilääke.

LÄÄKERYHMÄ

Aine Vaikuttava aine Alprostadil (Prostaglandiini E1) on kemiallisesti katsottuna rasvahappo , joka elimistössä luonnollisesti esiintyy luonnollisesti Alprostadil. Alprostadiili aiheuttaa mm. yhden laajenemisen der verisuonten ja estäen kuolema aktiivisuutta der verihiutaleiden. Injektion injektio sisään paisuva kudokseen peniksen aiheuttaa yhden Erektio aiheutettu.

LUVANUMERON HALTIJA, VALMISTAJA

Pfizer S.A., Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bryssel

Valmistaja : Pfizer Manufacturing Belgium, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgia

KÄYTETTÄVÄ

Hoito erektiohäiriöiden hoitoon, joiden syy on hermostossa tai den verenkierto johtuva on, tai joiden alkuperä psykologinen laatu on. Syynä syy voi myös olla erilainen laatu. Diagnoosi erektiohäiriöiden erektiohäiriöistä.

OLOSUHTEET, JOISSA TÄMÄN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ TULEE

VÄLTTÄÄ CAVERJECT® ei saa käyttää seuraavilla potilailla ei soveltaa :

Potilaat joilla on yliherkkyys Alprostadilille tai jollekin muulle aineosalle tästä lääkkeestä CAVERJECT®.

Potilaat joilla taipumus pitkittyneeseen erektioon seurausta sirppisoluanemiasta tai piilevästä sirppisolutaudistatai verisyövästä (leukemia , Verisyöpä (Leukemia, multippele myelooma).

Potilaat joilla on tietyt poikkeamat peniksessä (kaarevuus, fimoosi ja Peyronien tauti).

Potilaat joilla on penisproteesi.

Potilaat, joissa joissa seksuaalinen aktiivisuus ei ole suositeltavaa on.

CAVERJECT® ei saa naisille, lapsille eikä vastasyntyneille ei annostella .

ERITYISET VAROTOIMENPITEET

Ennen hoidon aloittamista CAVERJECT®:llä lääkäri toteaa erektiohäiriöiden syyn ja tarvittaessa hoitaa der Erektiohäiriöt määrittää ja, jos vaadittu, hoitaa.

Jälkeen injektion alkaen CAVERJECT® voi esiintyä pitkäkestoinen erektio .. , joka kestäyly 4 tuntia , on, oltava aina lääkärillesi lääkäri ilmoitettu tulee. Ennen aloittamista hoidon kanssa CAVERJECT® tulee sinun lääkäri määrittää ,mitkä toimenpiteet tässä tässä tapauksessa Tapaus on tehtävä täytyy.

Yksi säännöllinen tarkastus ja yksi huolellinen tutkimus peniksen täytyy tapahtua, niin että yksi lisääntyminen des Sidekudoksen peniksessä penis ajoissa havaitaan voidaan olla. Hoito hoito CAVERJECT®:llä CAVERJECT® täytyy keskeyttää jos jos muutoksia peniksen muodossa tai kovettumia kovettumia im Penis esiintyä.

Alprostadiili tarjoaa injektion jälkeen paisuvauskudokseen peniksen ei suojaa sukupuoliteitse tarttuvia sairauksia vastaan Sairaudet. sinä Sinä die tarvittavat suojaimet vastaan die leviämistä sukupuoliteitse tarttuvien sairauksien , kuten esim. AIDS (HIV-virus).Injektio injektio CAVERJECT® voi myös aiheuttaa yhden kerran pieni verenvuoto kohdassa der injektio kohdassa (katso "Haittavaikutukset ")aiheuttaa aiheuttaaniin että sinä itse näiden sairauksien kanssa sairauksien kevyempi tartuttaa voida.

CAVERJECT® ei saa yhdessä yhdessä jonkin toisen lääkkeen lääke hoitoon hoito erektiohäiriöiden erektiohäiriöitä injektoida olla.

Tämä lääke oli sinulle osana tiettyä lääketieteellistä hoitoa määrätty . Seei saa käyttää muiden henkilöiden eikä toisiin vaivoihin soveltaa . Oireet Jos käytät

muita lääkkeitä

tai Sinä Lääkeaineet verenvuodon estäminen der veren hyytyminen (kuten Varfariini tai Heparini) käyttää, voi olla taipumus verenvuotoon lisääntyä Verenvuodot vahvistaa.

KÄYTTÖ: MITEN JA KUINKA PALJON

Jokaisen mukaan, mistä syystä syystä erektiohäiriö olemassa ,päättää lääkärisi lääkäri päättää ,mikä määrä ruiskutetaan ruiskutettu tullaan tulisi.

Noudata Sinä siksi tarkasti ohjeet ohjeet lääkärisi ..

on yleensä 1,25 - 5 mikrogrammaa (μg) alprostadiilia. Tämän jälkeen (μg) Alprostadiili. Tämän jälkeen tulee annos annostus asteittain lisätään, kunnes oikea annos saavutetaan on. Useimmiten aiheuttaa tämä annos erektio , joka kestää 1tunti ajan jatkuu. Jos erektio kestää pidempään, ota yhteyttä lääkäriisi . Yleensä. alkaa 10 - 30 minuutin kuluessa injektio jälkeen . 10 - 30 minuuttia jälkeen der Injektio yksi.

Yleensä yleisesti on tavallinen annos välillä 1,25 ja 20 mikrogrammaa per injektio. Käyttö käyttö yli enemmän kuin 60 mikrogrammaa pro Injektio ei ei suositella.

CAVERJECT® ei pitäisi ei useammin kuin kerran päivässä ja kolme kertaa viikossa käytettävä olla. Konsultaatio Konsultaatio Teidän lääkärinne tulee kaikki kolme neljä kuukautta suositellaan. Jos tarpeen tai toivottu, kuitenkin vain sopimuksessa kanssa teidän lääkärinne Lääkäri, voi annosta vähitellen sovittaa olla. Noudata tarkasti ohjeita lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa.. lääkäritäsi tai apteekista lisätietoja tai apteekkihenkilökunnalta, jos sinulla kysymyksiä koskien tätä käyttöä tämän lääkkeen on.

LIUOKSEN VALMISTUS

Liuoksen valmistus on suoritettava steriilisti tapahtua steriili. Menetelmä Sinä jälkeen den suositukset lääkärisi ja noudata sinä Sinä tässä alla mainittu menettely.

1. Pese sinä itse kuolema kädet ja kuivaa te ne yhdessä yhden puhtaan pyyhkeen kanssa.
2. Poista te sen muovikansi des jauhepullosta (kansi itse jää aina pullon päällä). Desinfioi Sinä kansi pinta puhdistu kansi yhdellä desinfiointipyyhkeistä , jotka Sinäsen jälkeen hävitä sen jälkeen hävitä.

3. Jokaisen pakkauksen mukaan pakkaustyypin, jota käytät ,jatka seuraavasti : CAVERJECT®-pakkaus : Pullo

jossajauhe +kertakäyttöruisku kanssa Jauhe + Kertakäyttöruisku kanssa liuotin

- Ota Sinä pitkä neula (22 G 1 ½ tuumaa) pakkauksesta pakkauksesta ottaen huomioon ,että muovisuojaus muovisuojaus päällä neulassa pysyy . Käännä.
- Kääntäminen Sinä valkoinen tiiviste ruiskun sinetti ,niin että se murtuu . Kiinnitä.
- muovisuojuksella Sinä kuolema Neula kanssa dem Muovisuojaus päällä der ruisku, kiertämällä Sinä tämän siihen ..
- Sinä Sinä muovisuojaus Muovisuojaus neulan ..

4. Sinä Sinä nyt kuolema neula läpi kuolema desinfioidun kumikorkin des jauhepullon ja ruiskuta Sinä kaikki neste ulos ulos ruiskusta jauheeseen. 5.
Se Pullo kevyesti ravista (ilman että ruisku vedetään takaisin), kunnes jauhe on täysin liuennut ..

liuos on nyt käyttövalmis ja voidaan voi injektoidaan olla. Sinä sisältää 5, 10 tai 20 µg Alprostadiliia per ml. Sen jälkeen ei saa mitään muita tuotteita liuokseen lisätä olla. Liuoksen täytyy olla kirkas ja vaalea ja väritön olla. Muussa tapauksessa et saa sinä sitä ei injektoida. Kun säilytys alkuperäispullossa on valmistettu liuos huoneenlämmössä (15 - 25 °C) 24 kohdalla Huoneenlämpötila (15 - 25 °C) 24 Tuntia pitkäkestoinen. Liuos ei saa jäädyttää jäädytetty INJEKTIO LIUOKSEN PENIKSEEN

Ensimmäinen

injektio tulisi antaa lääkärisi toimesta . Tässä sinulle tulisi antaa ohjeet . kuolema Menettelytapa injektiota varten opetetaan . Noudata tarkasti tätä menettelytapaa Menettelytapakun annat itsellesi CAVERJECT® . Sinä antaa. Sinä voida tässä yhteydessä askel askeleelta seuraavat ohjeet huomioida.

1. Imeytä Sinä kuolema sinulle Sinä suositeltu liuosmäärä ruiskuun ..
2. Sinä Sinä kuolema Yhteys välillä neula ja ruisku (neula neula jää pulloon).Aseta
3. injektioneula (se on lyhyt neula (kysymyksessä on lyhyt neula lyhyt Neula, 27 G 1/2 tuumaa) kiinni der ruiskuun ja poista suojus Pidä ruiskua neula.
4. . Pidä ruiskua neula alaspäin der neula alaspäin ylös ja painakaa te varovasti päällä mäntä kunnes pisara tulee ulos kärjestä neulan ulos . Sen jälkeen asettakaa. Sen jälkeen aseta Sinä ruisku ruisku päällä yksi kova, tasainen Ylä pinta ja varmistaa että, että neula neula ei kanssa esineiden sisään Kosketus tulee.
5. Die Injektio itse tapahtuu helposti.

Jos olette oikeakätinen , pitäkääte teidän penis vasemmalla kädellä, tasaisesti der linken Hand, tasaisesti taakse kuolema kärjen. Jos olette ei ympärileikattu ole, varmistakaa että esinahkaon niin pitkälle kuin mahdollista niin pitkälle kuin mahdollinen yli kuolema kärki der kärki taakse vedetty on. Vedä nyt nyt penis kohti vasenta reittäsi. Peniksen yläpuolella peniksen näet sinä yksi kohouma, joka vasemmalle siirtyy väistyy, kun painat kovemmin . Tämä on yksi kahdesta paisuvaiskudoksesta Paisuvaiskudosja tähän sisään sisään täytyy kuolema injektio annetaan (varjostetut alueet kuvassa der).Toisella desinfiointipyyhkeellä desinfioidu nyt oikealla kädellä desinfioida Sinä nyt kanssa oikean käden Iho yli korporaalikehon , johon sinä injektioit tulee ja anna sen kuivua muutaman sekunnin ajan ..

penis kiinni kanssa kanssa vasenta kättä aikana der injektio hyvin ojennettuna. Oikealla kädellä pistä sinä kuolema neula 90 asteen kulmassa läpi kautta ihon asti asti asti Paisuvaiskudos. Vältä Sinä tässä pintapuolisia verisuonia tai muita huomattavia rakenteita. Pistä nyt nyt sisältö Sisältö ruiskun täysin täydellinen sisään. Jos tämä ei heti onnistu, vedä sinä neulaa neula hieman takaisin ja yritä se uudelleen.

Vedä sinä sitten neula Neula täysin takaisin ja paina Te se desinfiointipyyhe paikalle kuolema injektiokohtaan. Kun Te teidän penistä hierotte, levittäkää Te siihen kohdalla, että se lääke hyvin jakautuu tulee.

Se tulee suositellaan, että injektiokohtaa vaihdetaan ,niin kuin teidän Sinun Lääkäri se teille opettanut on.

6. Liuos on vain kertakäyttöön soveltuva . Mahdolliset jäämät. hävittää . Jos jää jäljelle, niin Tapauksia, että Sinä CAVERJECT®-Pakkaus käytät, joka koostuu pulverista pullossa ja kertakäyttöruiskusta koostuu , laita Sinä, tarttua Sinä kaikki sisään Pakkaus, tehdä se Pakkaus kiinni ja sulje se lopullisesti punaisella läpällä . HAITTAVAIKUTUKSET Myös.

mainitut

saattaa esiintyä alla mainitut sivuvaikutukset voivat esiintyä. Keskustele sinä kanssa lääkärisi tai apteekkarisi , jos ongelmia ilmenee, jotka mielestäsi ovat mielestäsi yksi mahdollinen sivuvaikutus tämän lääkkeen olla voisivat. -

Sukupuolielinten sivuvaikutukset

Yhdessä yhdessä kolmesta kolmesta injektioista voi se lieviä ja kohtalaisia Kivut peniksessä erektio aikana esiintyvät tämä kuvataan välillä polttavana tuntemuksena tai jännityksenä tunteena . tai kuin yksi Jännityksen tunne kuvattu. Useimmiten estää tämä seksuaalisia suhteita ei. Harvinaisissa tapauksissa (3 %) on mustelmia ympäri injektiokohta esiintynyt Injektiokohta sidekudoksen lisääntyminen on havaittu sidekudoksen im Penis voi esiintyä. Injektion jälkeen CAVERJECT® voi esiintyä pitkäkestoinen erektio kestoaltaan 4–6 tuntia . alkaen 4–6 Tunnit esiintyä. Yksi Erektio kestää 6 tuntia tai pidempään esiintyy vain harvoin .. , joka kestäväyli 4 tuntia kestää pitkään kestää, täytyy Sinun aina lääkärillesi lääkäri kertoa.

Paikalliset sivuvaikutukset

Seuraavat paikalliset sivuvaikutukset voivat harvinaisissa tapauksissa (1 - 1,5 %) esiintyä :

Pienetsiniset sininen Laikut injektio kohdassa injektio kohdassa, ihottuma, nesteen kertyminen ja lisääntyminen sidekudoksen sidekudoksen peniksessä. peniksessä.

Haittavaikutukset sydämen alueella alueella sydämen ja ja Verisuonet

Yksi Annostus yli enemmän kuin 20 µg voi johtaa yhden alentamiseen verenpaineen alentumiseen johtaa. Kun enemmän kuin 30 µg voi yksi kohonnut pulssi esiintyä.

Muut sivuvaikutukset

Lääkärisi on myös tietoinen muita ei-toivottuja vaikutuksia , jotka hyvin harvoin (< 1 %) esiintyä voisivat voisivat, ilmoittaa.

SÄILYTYS

Säilytä huoneenlämmössä (15 °C - 25 °C) säilytä.

Viimeinen käyttöpäivä (kuukausivuosi) on pakkauksessa der merkitty painettu jälkeen "EXP." (EXP. = viimeinen käyttöpäivä). Viimeisen käyttöpäivän jälkeen tätä viimeistä käyttöpäivää ei pitäisi tätä lääkettä enää käyttää . Säilytys alkuperäispakkauksessa säilyy alkuperäispakkauksessa säilyy valmiste valmistettu liuos huoneenlämmössä (15°C - 25°C) 24 tuntia ,käytettävissä . Valmistettu valmistettu liuos ei saa jäädyttää . Lääke pidettävä lasten ulottumattomissa Lapset pääsemätön säilyttää.

KÄYTTÖTIEDOT

maaliskuu 2004

Tässä annetut tiedot ovat niin yksityiskohtaiset ja tarkat kuin tämän rajoitetun kehyksen puitteissa käyttötiedot mahdollista. Lääketieteelliset ilmaisut ovat mahdollisuuksien mukaan selitetty. Jos teillä tästä vielä lisää kysymyksiä on, antaa teille teidän lääkäri tai apteekkari mielellään auttaa.

Transtoyou