

ULOTKA

NAZWA

CAVERJECT®
(Alprostadilum)

SKŁAD

CAVERJECT® 5 µg proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań + rozpuszczalnik w strzykawce jednorazowej

- I. Alprostadil. 5 µg - Laktoza. - Sód. cytrynian - kwas solny rozcieńczony. - sól. wodorotlenek.
- II. alkohol benzylowy - Aqua ad iniekcje. q.s. ad 1 ml.

CAVERJECT® 10 µg proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań + Rozpuszczalnik w Strzykawka jednorazowa

- I. Alprostadil. 10 µg - Laktoza. - Natr. cytrynian - Kwas solny rozcieńczony. - Natr. wodorotlenek.
- II. Alkohol benzylowy. - Aqua ad iniekcje. q.s. ad 1 ml.

CAVERJECT® 20 µg proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań + rozpuszczalnik w strzykawce jednorazowej

- I. Alprostadil. 20 µg - laktoza. - sól. cytrynian - kwas solny rozcieńczony. - sól. wodorotlenek.
- II. Alkohol benzylowy. - Aqua ad iniekcje. q.s. ad 1 ml.

FORMA FARMACEUTYCZNA I INNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

Roztwór do wstrzykiwań: powstaje przez mieszanie z substancją suchą Sucha masa z rozpuszczalnikiem Rozpuszczalnik. Wielkości opakowań:

CAVERJECT® 5 µg proszek przygotowania roztworu do wstrzykiwań + rozpuszczalnik w strzykawce jednorazowej : Strzykawka jednorazowa:

1 Wielkość opakowania opakowanie: 1 Fiolka iniekcyjna z 5 ml z substancją suchą + 1 wypełniona strzykawka z 1 ml rozpuszczalnika + 2 igły (27 G 1/2 cala i 22 G 1 1/2 cala) + 2 waciki alkoholowe

CAVERJECT® 10 µg proszek do przygotowania roztworu Roztwór do wstrzykiwań + Rozpuszczalnik w Strzykawka jednorazowa:

1 i 5 Wielkości opakowań od: 1 Fiolka od 5 ml z Substancja sucha + 1 wypełniona Strzykawka z 1 ml rozpuszczalnik + 2 igły (27 G 1/2 cala i 22 G 1 1/2 cala) + 2 waciki alkoholowe

CAVERJECT® 20 µg proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań + rozpuszczalnik w strzykawce jednorazowej:

1 i 5 Wielkości opakowań z: 1 Fiolka z 5 ml z substancją suchą + 1 wypełniona strzykawka z 1 ml rozpuszczalnika + 2 igły (27 G 1/2 cala i 22 G 1 1/2 cala) + 2 waciki alkoholowe Przepis dotyczący wydawania: na receptę.

GRUPA LEKÓW

Substancja czynna Alprostadil (Prostaglandyna E1) jest chemicznie uważana za kwas tłuszczowy , który w organizmie naturalnie występuje naturalnie Alprostadil. Alprostadil powoduje

m.in. rozszerzenie naczyń krwionośnych i hamuje aktywność płytek krwi . Poprzez. do ciała jamistego prącia uzyskuje się erekcję penisa . Erekcja wywołana.

POSIADACZ NUMERU ZEZWOLENIA, PRODUCENT

Pfizer S.A., Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruksela

Producent : Pfizer Manufacturing Belgium, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgia

STOSOWANE W

Leczenie zaburzeń erekcji, których przyczyna leży w układzie nerwowym lub den krążenie przypisać jest, lub których pochodzenie psychologicznego rodzaju jest. Przyczyna przyczyna może również być różnego rodzaju. Diagnoza z zaburzeń erekcji.

OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ LECZENIA TYM LEKIEM

CAVERJECT® nie może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na:

pacjentów z nadwrażliwością na alprostadil lub którykolwiek z innych składników leku CAVERJECT®.

Pacjenci z tendencją do przedłużonej erekcji jako skutek anemii sierpowatokrwinkowej, utajonej choroby sierpowatokrwinkowej lub białaczki (leukemii, mnogi szpiczak).

pacjenci z określonymi odchyleniami prącia (skrzywienie, stulejka i choroba Peyroniego).pacjenci

z protezą prącia Proteza prącia.

Pacjenci, przy których aktywność seksualna nie jest wskazana ..

nie może być podawany kobietom, dzieciom i noworodkom nie podawany .

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed rozpoczęciem leczenia z CAVERJECT® twój lekarz ustali przyczynę zaburzeń erekcji i Zaburzenia erekcji jeśli konieczne, leczyć wymagany, leczyć.

Po wstrzyknięciu z CAVERJECT® może wystąpić przedłużona erekcja wystąpić. Erekcja , któratrwa dłużej niż 4 godziny trwa, musi zawsze Twojemu lekarzowi przekazane być. Przed rozpoczęciem leczenia za pomocą CAVERJECT® będzie Twój lekarz określi ,jake działania w tym przypadku Przypadek podjęte muszą.

Jedna regularna kontrola i dokładne badanie prącia musi nastąpić ,tak aby wzrost jedna Zwiększenie des tkanki łącznej w prąciu w porę wykryte może być. Leczenie leczenie z CAVERJECT® musi zostać przerwane , jeśli wystąpią odchylenia kształtu prącia lub stwardnienia w penis wystąpić.

Alprostadil oferuje po wstrzyknięciu do ciała jamistego prącia żadnej ochrony przed seksualnie przenoszone choroby. Używaj Pan die niezbędne środki ochronne przeciw die rozprzestrzenianiu chorób przenoszonych drogą płciową , takich jak np. AIDS (wirus HIV).Zastrzyk CAVERJECT® może również powodować dodatkowo efekt terapeutyczny małe krwawienie na miejscu wstrzyknięcia (patrz "Działania niepożądane") powodować, tak że możesz się z tymi chorobami lżejszy zainfekować móc.

CAVERJECT® nie wolno nie razem z innym innym lekiem do leczenia zaburzeń

erekcji wstrzykiwać zostać.

Ten lek został Państwu jako część określonego leczenia medycznego przepisany . Nie może być przez inne osoby ani innymi osobami jeszcze innych dolegliwości stosowany . zostać.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI I ŻYWNOŚCIĄ

Jeśli Ty Leki do hamowania der krzepnięcia krwi (takie jak Warfarin lub Heparyna) stosować, może się skłonność do krwawień zwiększyć wzmocnić.

ZASTOSOWANIE: JAK I ILE

Każdy w zależności, z jakiego powodu erekcyjna dysfunkcja istnieje, będzie Twój lekarz określi, jaką ilość wstrzyknąć będą powinien.

Przestrzegaj Pan/Pani dlatego dokładnie instrukcji lekarza swojego ..

wynosi zwykle 1,25 - 5 mikrogramów (μg) alprostadilu. Następnie (μg) Alprostadil. Następnie jest dawka dawkowanie stopniowo zwiększana, aż właściwa dawka osiągnięta zostanie. Zazwyczaj powoduje ta dawka erekcję , która trwa 1godzinę utrzymuje się utrzymuje się. Jeśli erekcja dłużej trwa, skonsultuj się ze swoim lekarzem. Zazwyczaj pojawia się erekcja w ciągu 10 - 30 minut po wstrzyknięciu po der Zastryk jeden.

W ogólności wynosi zwykła dawka między 1,25 a 20 mikrogramów na iniekcję. Stosowanie stosowanie więcej niż 60 mikrogramów Mikrogram pro Iniekcja jest nie zalecana.

CAVERJECT® nie powinien być częściej niż raz dziennie i trzy razy w tygodniu stosowany być. Konsultacja Twojego lekarza będzie co trzy do czterech miesięcy zalecane. Jeśli konieczne lub pożądane, jednak tylko w porozumieniu z Twoim lekarzem, może dawka stopniowo dostosowana być. Przestrzegaj Pan/Pani dokładnie die instrukcji swojego lekarza.

Skonsultuj Pan/Pani swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli masz pytania dotyczące stosowania tego leku

Leku PRZYGOTOWANIE ROZTWORU.

roztworu

musi być sterylne . Procedura steryl nastąpić. Procedura Ty po zaleceniach lekarza Twojego lekarza

i przestrzegaj Ty tutaj poniżej podana metoda pracy.

1. Umyj Ty się ręce ręce i wysusz Pan/Pani je za pomocą czystego ręcznika . 2..
2. plastikową pokrywkę fiolki z proszkiem (pokrywka sama w sobie jest niezależna pozostaje zawsze na butelce). Zdezynfekuj Pan/Pani górną część pokrywki za pomocą jednej z dwóch chusteczek dezynfekujących , którąPan/Pani następnie wyrzuci ..

3. W zależności od rodzaju opakowania, które stosujesz ,postępuj w następujący sposób :

CAVERJECT®- Opakowanie

: Butelkazproszkiem + jednorazowa strzykawka Proszek + Strzykawka jednorazowa z rozpuszczalnikiem

- Wyjmij Pan/Pani długą igłę (22 G 1 ½ cala) z opakowania przestrzegając tego, że plastikowa osłona na igle pozostaje . Obróć.
- Obróć Oni biały biały uszczelnienie strzykawki strzykawki, tak że to złamany jest.
- Przymocuj Oni biały igła z plastikową osłoną na strzykawce strzykawki, obracając ją na niej ..
- osłonę z plastiku igły . 4..

4. w skórę teraz die igłę przez die zdezynfekowaną gumową nasadkę des fiolki z proszkiem i wstrzyknij Ty cały płyn Płyn z strzykawki do proszku. 5.

To Fiolka lekko wstrząsnać (bez wyciągania strzykawki z powrotem), aż proszek całkowicie rozpuści się ..

roztwór jest teraz gotowy do użycia gotowy do użycia może może wstrzykiwany być. Ona zawiera 5, 10 lub 20 µg

Alprostadilu na ml. Następnie nie wolno żadnych innych produktów do roztworu dodawać być. Roztwór Roztwór musi być jasny i bezbarwny być. W przeciwnym razie nie wolno Państwu jej wstrzykiwać .Podczas przechowywania w oryginalnej fiolce jest przygotowany roztwór w temperaturze pokojowej (15 - 25 °C) 24 (15 - 25 °C) 24 godziny trwały. Roztwór nie może być zamrożony .

WSTRZYKIWANIE ROZTWORU DO PENISA

Pierwsze wstrzyknięcie powinno być przeprowadzone przez Twojego lekarza . Podczas tego powinieneś die Procedura do wstrzyknięcia nauczona zostanie. Przestrzegaj Pani/Pan dokładnie tej procedury, jeśli Pani/Pan sobie samodzielnie CAVERJECT® podaje. Pani/Pan mogą przy tym Krok po kroku następujące wytyczne przestrzegać.

1. Zasysanie Pan/Pani die dla Pana/Pani zalecaną ilość roztworu do strzykawki.
2. Przerwać Pan/Pani die Połączenie między igłą a strzykawką (igła igła pozostaje w fiolce).
3. Przyłóż igłę do iniekcji (chodzi o krótką igłę krótką Igła, 27 G 1/2 cala) na strzykawce strzykawce do i usuń Proszę osłonkę ochronną.
4. Trzymaj Proszę strzykawkę strzykawkę z igłą igłą w dół na górze i naciśnij proszę ostrożnie na tłok strzykawki, aż kropla wypłynie z końcówki igły . Następnie połóż. Następnie kłaść Oni ta strzykawka na jedną twardą, równą górną powierzchnię i upewnij się że, że igła nie dotyka przedmiotów Przedmiotom w Dotyk przychodzi.
5. Iniekcja sama jest

łatwa ..

jesteś praworęczny , trzymaj swój penis lewą ręką, płasko Penis z lewej ręki, płaski za żołądź prącia. Jeśli nie jesteś obrzezany ,upewnij się, że napletek jest odciągnięty tak daleko, jak to możliwe . nad żołądź szczyt żołądź z powrotem ściągnięta jest. Pociągnij Pan teraz penisa w kierunku swojego lewego uda. Na górnej części penisa zobaczysz Pan jedna wypukłość, która w lewo odchyła się gdy, tylko Pan mocniej naciśnię. To jest jednym z dwóch ciał jamistych, i tutaj do środka musi die iniekcja podana być (zacięniowane strefy na rysunku).Za pomocą drugiej chusteczki dezynfekującej zdezynfekuj teraz prawą ręką z prawej ręki Skóra nad ciałem jamistym , do którego wstrzykujesz będziesz i pozwól jej wyschnąć przez kilka sekund . Trzymaj.

za pomocą penis z lewej ręki podczas der iniekcji dobrze wyprostowana. Za pomocą prawej ręki wkluć Pan/Pani igłę w kącie prostym przez skórę aż do do do Ciała jamiste. Unikaj Ty przy tym powierzchownych naczyń krwionośnych lub inne zauważalne struktury. Wstrzyknij Oni teraz ten zawartość der strzykawki całkowicie do środka. Jeśli to się nie natychmiast udaje, wyciągnij Pan/Pani igłę igła trochę do tyłu i spróbuj to ponownie. Wyciągnij Pan/Pani następnie igłę Igła całkowicie z powrotem i naciśnij Pan/Pani to chusteczkę dezynfekującą na miejsce wstrzyknięcia. Masując Pan/Pani swojego penisa masować, nałożyć Pan/Pani do tego przy, że to lek dobrze rozprowadzony zostanie.

To zostanie zalecane, aby miejsce wstrzyknięcia zmieniać ,tak jak Twój Twój Lekarz es Państwu nauczył hać.

6. Die roztwór jest tylko do jednorazowego użytku przeznaczony. Ewentualne resztki należy usunąć werden. W Przypadki, że Pan opakowanie CAVERJECT®-opakowanie stosować, które z fiolki z proszkiem i jednorazowej strzykawki składa się ,włożyć Pan Oni wszystko do opakowanie, zrób to opakowanie zamknij i zamknij je ostatecznie za pomocą czerwonej klapki . DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE.

inne niż te tutaj

Również inne niż te tutaj poniżej wymienione działania niepożądane mogą wystąpić.

Porozmawiaj z Twoim lekarzem lub farmaceutą, jeśli problemy wystąpią , które według Twojej opinii są jednym możliwym działaniem niepożądanym tego leku być mogą. -

Genitalne działania niepożądane

Przy jednej z trzech iniekcji mogą wystąpić łagodne do umiarkowane Ból w penisie podczas erekcji występuje .To jest czasami jako uczucie palenia lub jako uczucie napięcia opisywane opisane. Najczęściej utrudnia to relacje seksualne nie. W rzadkich przypadkach (3 %) występują krwiaki wokół miejsca wstrzyknięcia wystąpiły, wzrost tkanki łącznej tkanki łącznej w penis może wystąpić. Po wstrzyknięciu leku CAVERJECT® może wystąpić przedłużona erekcja trwająca od 4 do 6 godzin . Godziny wystąpić. Jedna erekcja trwająca 6 godzin lub dłużej występuje tylko rzadko .. , która trwadłużej niż 4 godziny trwa trwa, muszą Państwo zawsze swojemu lekarzowi zgłosić.

Lokalne działania niepożądane

Następujące lokalne działania niepożądane mogą w wyjątkowych przypadkach (1 - 1,5 %) wystąpić: Małe niebieskie Plamy na miejscu wstrzyknięcia, wysypka, nagromadzenie płynu i przyrost tkanki łącznej w penisie.

Działania niepożądane w obszarze serca i układu krążenia Naczynia krwionośne

Jedna Dawkowanie od więcej niż 20 µg może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi prowadzić do. ciśnienia krwi przy więcej niż 30 µg może podwyższony puls wystąpić.

Inne działania niepożądane

Twój lekarz jest również o innych niepożądanych działaniach, które bardzo rzadko (< 1 %) wystąpić mogą, informuje.

PRZECHOWYWANIE

W temperaturze pokojowej (15 °C - 25 °C) przechowywać.

Data ważności (miesiączek) jest na opakowaniu Opakowanie nadrukowany po "EXP." (EXP. = data ważności). Po upływie daty ważności nie powinno ten lek być dłużej stosowany . Przy przechowywaniu w oryginalnym opakowaniu pozostaje przygotowany roztwór w temperaturze pokojowej (15°C - 25°C) 24 godziny ,użyteczny . Przygotowany roztwór nie może być zamrożony . Lek trzymać z dala od dzieci niedostępny niedostępny przechowywać.

STAN INFORMACJI O STOSOWANIU

marzec 2004

Podane tutaj informacje są tak szczegółowe szczegółowo specyficzne jak w ograniczonym zakresie tej informacji o stosowaniu możliwe. Medyczne wyrażenia są w miarę możliwości

wyjaśnione .. mają Państwo w związku z tym jeszcze dalsze pytania ,udzieli Państwu Państwa lekarz Lekarz lub farmaceuta chętnie pomóc.

Transtoyou