

Cefixim Sandoz®

400 mg tabletki powlekane

Ulotka dołączona do opakowania: Informacje dla pacjenta

Cefixim Sandoz® 400 mg tabletki powlekane

Substancja czynna: cefiksym

Przeczytaj uważnie całą ulotkę, zanim zaczniesz stosować ten lek.

x Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna do ponownego przeczytania.

x Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

x Ten lek został przepisany wyłącznie Tobie. Nie przekazuj go innym lub farmaceuta.

x Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, które Cię znacząco niepokoją lub zauważysz działania niepożądane, które nie są wymienione w tej ulotce, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ulotka zawiera:

Jeśli informacje zawarte w ulotce są niewystarczające, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ulotka zawiera:

1. Czym jest Cefixim Sandoz 400 mg i w jakim celu się go stosuje?
2. Co należy wiedzieć przed zażyciem Cefixim Sandoz 400 mg zwrócić uwagę?
3. Jak stosować Cefixim Sandoz 400 mg?
4. Jakie działania niepożądane są możliwe?
5. Jak przechowywać Cefixim Sandoz 400 mg?
6. Dalsze informacje

1. Czym jest Cefixim Sandoz 400 mg i w jakim celu się go stosuje?

Cefixim Sandoz 400 mg to antybiotyk cefalosporynowy do stosowania doustnego w leczeniu ostrych i przewlekłych zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefiksym. Cefixim Sandoz 400 mg stosuje się w leczeniu ostrych

i przewlekłych zakażeń o różnym stopniu nasilenia, wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefiksym, które można leczyć doustnie, takich jak:

x Zakażenia w obrębie uszu, nosa i gardła:

x– Zapalenie ucha środkowego (Otitis media)

x– Zapalenie zatok (Sinusitis)

x– Zapalenie ucha środkowego (Otitis media)

x– Zapalenie zatok przynosowych (Sinusitis)

x– Zapalenie migdałków (Tonsillitis)

x– Zapalenie gardła (Pharyngitis)

x– Zapalenie krtani (Laryngitis)

- x Infekcje dolnych dróg oddechowych
- x Infekcje dróg żółciowych
- x nieskomplikowane ostre i nawracające infekcje dróg moczowych, w tym zapalenie cewki moczowej w wyniku infekcji gonokokami kokken

400 mg?

Cefixim Sandoz 400 mg nie należy przyjmować,

– jeśli jesteś nadwrażliwy (alergiczny) na cefiksym, inne cefalosporyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Należy zwrócić uwagę na możliwą alergię krzyżową z innymi antybiotykami beta-laktamowymi. tels są.

Cefixim Sandoz 400 mg jest wymagana”.

Szczególne ostrożność przy przyjmowaniu Cefixim Sandoz 400 mg jest wymagana

- x Udowodnione infekcje gronkowcowe powinny być leczone cefiksymem 400 mg jest wymagane

- x Udowodnione infekcje wywołane przez gronkowce powinny być leczone cefiksymem nie należy leczyć, ponieważ cefiksym nie działa na gronkowce skutecznie.

- x jeśli cierpisz na ciężkie alergie lub astmę, lub wcześniej wystąpiły u Ciebie alergie lub astma.

- x jeśli kiedykolwiek wystąpiła u Ciebie alergia na penicylinę, ponieważ istnieje możliwość, że jesteś również uczulony na cefiksym, substancję czynną Cefixim Sandoz 400 mg (alergia krzyżowa).

- x Do czasu uzyskania dalszych doświadczeń klinicznych Cefixim Sandoz 400 mg nie powinien być podawany wcześniakom, noworodkom i karmiącym matkom.

- x jeśli masz ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min/1,73 m²).

- x jeśli wystąpią ciężkie, uporczywe, także krwawo-śluzowe biegunki i skurczowe bóle brzucha podczas lub po terapii

Cefixim Sandoz 400 mg. Może to być spowodowane ciężkim, potencjalnie zagrażającym życiu zapaleniem błony śluzowej jelit (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) wywołanym przez leczenie antybiotykami, które musi być natychmiast leczone.

Natychmiastowe przerwanie leczenia Cefixim Sandoz

400 mg w zależności od choroby podstawowej jest zazwyczaj wskazane.

wymagane jest wykrycie patogenu i odpowiednie leczenie

powinno być zainicjowane przez lekarza (np. przyjmowanie specjalnych antybiotyków/chemioterapeutyków, których skuteczność jest klinicznie udowodniona). Leki przeciwbiegunkowe, które hamują ruchy jelit, nie powinny być przyjmowane (patrz punkt 4. „Jakie działania niepożądane są możliwe?”). gen są możliwe?”).

- x jeśli u Ciebie stosowana jest długoterminowa terapia cefiksymem w wysokiej dawce. W takim przypadku wskazane są kontrole funkcji nerek i wątroby oraz morfologii krwi.

x jeśli przyjmujesz Cefixim Sandoz 400 mg w połączeniu z niektórymi innymi antybiotykami (antybiotyki aminoglikozydowe, Polimyksyna B, Kolistyna, Wiomycyna) lub z niektórymi wysoko dawkowanymi środkami moczopędnymi (diuretyki pętlowe, takie jak np. Furosemid).

W takich przypadkach funkcja nerek powinna być szczególnie starannie monitorowana. Dotyczy to szczególnie przypadku już ograniczonej funkcji nerek (patrz punkt 4. „Jakie działania niepożądane są możliwe?“).

x jeśli jednocześnie przyjmujesz bloker kanału wapniowego Nifedypin na nadciśnienie. (patrz punkt 4. „Jakie działania niepożądane są możliwe?“).

Cefixim Sandoz 400 mg o 70%. Jednak ten efekt przyjmować nadciśnienie. Może to prowadzić do wzrostu poziomu we krwi Cefixim Sandoz 400 mg zwiększa się o 70%. Jednak ten efekt ma brak wpływu na dawkowanie obu leków (patrz w sekcji „Przyjmowanie Cefixim Sandoz 400 mg z innymi lekami“).

x jeśli jednocześnie przyjmują leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) typu kumarynowego. W pojedynczych przypadkach u pacjentów zgłaszano wydłużenie czasu krzepnięcia (czas protrombinowy) z i bez krwawienia. Należy to uwzględnić przy kontroli wartości krzepnięcia.

x jeśli cierpią na ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe z wymiotami i biegunkami, należy unikać leczenia Cefixim Sandoz 400 mg, ponieważ nie jest zapewnione wystarczające wchłanianie leku do organizmu (absorpcja). W takim przypadku lekarz musi podjąć decyzję o dożylnym podaniu (podanie przez żyłę bezpośrednio do krwi) odpowiedniego antybiotyku.

Każde stosowanie antybiotyków może prowadzić do namnażania się patogenów

odpornych na stosowany lek. Zwracaj uwagę na objawy możliwej infekcji wtórnej innymi patogenami (np. zakażenie grzybicze błon śluzowych z zaczerwienieniem i białawymi nalotami na

błonach śluzowych). Infekcje wtórne powinny być odpowiednio leczone przez lekarza. (np. zakażenie grzybicze błon śluzowych z zaczerwienieniem i białawymi nalotami na śluzówce). Infekcje wtórne powinny być odpowiednio leczone przez lekarza działając.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

W przypadku niektórych metod oznaczania cukru w moczu (metody redukcyjne) mogą wystąpić fałszywie dodatnie reakcje, ale nie przy użyciu metod enzymatycznych.

Dzieci poniżej 12 lat

Dla dzieci poniżej 12 lat i pacjentów z trudnościami w połykaniu tabletek zaleca się płynne, doustne preparaty zawierające substancję czynną cefiksym.

Pacjenci w podeszłym wieku

Starsze osoby

Podczas przyjmowania Cefixim Sandoz 400 mg z innymi

lekami

Leki

lub niedawno przyjmowali, nawet jeśli są to leki dostępne bez recepty.

Jakie inne leki wpływają na działanie Cefixim Sandoz 400 mg?

Podczas jednoczesnego podawania substancji, w przypadku których nie można tego dotyczy.

Jakie inne leki wpływają na działanie Cefixim Sandoz 400 mg?

W przypadku jednoczesnego podawania substancji, w przypadku których istnieje ryzyko uszkodzenia nerek

ów nie można wykluczyć, np. aminoglikozyd-

Antybiotyki, kolistyna, polimyksyna, wiomycyna lub silnie działające środki do odwadniania organizmu (diuretyki), np. z substancją czynną furosemid, istnieje zwiększone ryzyko upośledzenia funkcji nerek.

Przy jednoczesnym podawaniu nifedypiny (substancji czynnej stosowanej w leczeniu zaburzeń rytmu serca i nadciśnienia) dostępność

substancji czynnej Cefixim Sandoz 400 mg w organizmie (biodostępność) jest zwiększona o ok. 70% (patrz punkt „Szczególna ostrożność przy przyjmowaniu Cefixim Sandoz 400 mg jest wymagana”).

Jak Cefixim Sandoz 400 mg wpływa na działanie innych leków?

Przy jednoczesnym podawaniu Cefixim Sandoz 400 mg i leków przeciwzakrzepowych (antykoagulantów) typu kumarynowego może dojść

do wydłużenia czasu krzepnięcia krwi (czas protrombinowy) z

i bez krwawienia (patrz punkt „Szczególna ostrożność przy przyjmowaniu Cefixim Sandoz 400 mg jest wymagana”).

Proszę pamiętać, że te informacje mogą dotyczyć również niedawno stosowanych leków.

Ciąża i okres karmienia piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cefiksymu

Sandoz 400 mg u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały

żadnych wskazań na działanie teratogenne cefiksymu. Cefiksym dociera

do płodu/embrionu przez łożysko. Ze względu na brak klinicznego

doświadczenia, cefiksym Sandoz 400 mg, szczególnie w pierwszych 3

miesiącach ciąży, powinien być stosowany tylko po starannej ocenie

stosunku korzyści do ryzyka.

Okres karmienia piersią

Istnieją jedynie niewystarczające informacje na temat wydzielania

cefiksymu do mleka matki. Nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia.

Dlatego do czasu uzyskania dalszych doświadczeń klinicznych, cefiksym Sandoz 400 mg nie powinien być podawany matkom karmiącym. Jeśli leczenie jest konieczne, zaleca się odciążanie i wyrzucanie mleka podczas trwania terapii.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że substancja czynna cefiksym zazwyczaj nie wpływa na zdolność koncentracji i reakcji. Jednak wystąpienie działań niepożądanych może zmienić zdolność reakcji i wpłynąć na zdolność aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obsługi maszyn.

To samo dotyczy prac bez pewnego oparcia.

3. Jak stosować Cefixim Sandoz 400 mg?

Zawsze przyjmuj Cefixim Sandoz 400 mg dokładnie według zaleceń lekarza. Proszę zapytać lekarza lub farmaceutę, jeśli nie jesteś całkowicie pewny.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zwykle stosowana dawka to

Dawkowanie i sposób podawania zależą od ciężkości infekcji, wrażliwości patogenu oraz stanu zdrowia i wieku pacjenta.

Dorośli, młodzież powyżej 12 lat i dzieci ≥ 50 kg

otrzymują 1 tabletkę powlekaną Cefixim Sandoz 400 mg dziennie (odpowiada 400 mg Cefiximu/dzień).

Zalecana dawka dzienna może być podana jednorazowo lub podzielona na 2 dawki (rano i wieczorem po 1/2 tabletki powlekanej).

Dzieci poniżej 12 lat lub < 50 kg

Dla dzieci poniżej 12 lat lub lżejszych niż 50 kg dostępne są płynne, doustne preparaty z substancją czynną Cefixim w odpowiednich dawkach.

Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania

Dostępność.

Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat z jedną-
upośledzona funkcja nerek

U pacjentów z wyraźnie upośledzoną funkcją nerek dawkę należy

zmniejszyć do jednorazowego dziennego przyjmowania 200 mg, co odpowiada 1/2 tabletki powlekanej

Cefixim Sandoz 400 mg.

Sposób podawania

Proszę przyjmować tabletki powlekane z szklanką wody. Przyjmowanie powinno odbywać się przed posiłkiem lub razem z posiłkiem.

Czas trwania stosowania

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu infekcji. Zazwyczaj czas trwania leczenia Cefixim Sandoz 400 mg wynosi 7–10 dni.
400 mg 7–10 dni.

uniknąć powikłań.

x W przypadku niepowikłanych infekcji dolnych dróg moczowych u kobiet wystarcza czas trwania leczenia 1–3 dni.

x W przypadku zapalenia cewki moczowej spowodowanego infekcją przez gonokoki zazwyczaj wystarcza jednorazowe przyjęcie 1 tabletki powlekanej Cefixim Sandoz 400 mg (co odpowiada 400 mg cefiksymu).

Skuteczność leczenia infekcji przez gonokoki

(rzeżączka) powinna być potwierdzona przez wykonanie posiewu bakteryjnego przez (Gonorrhoe) powinno być zdiagnozowane poprzez założenie hodowli bakteryjnej przez Lekarz powinien skontrolować 3–4 dni po zakończeniu leczenia.

O długości leczenia decyduje Twój lekarz.

Proszę porozmawiać z lekarzem, jeśli masz wrażenie, że działanie Cefixim Sandoz 400 mg jest zbyt silne lub zbyt słabe.

Jeśli zażyłeś większą ilość Cefixim Sandoz 400 mg niż powinieneś

Cefixim Sandoz 400 mg to lek o szerokim zakresie terapeutycznym, co oznacza, że nawet przy podawaniu wysokich dawek tolerancja jest zazwyczaj dobra.

Dotychczas nie są znane przypadki ostrego zatrucia po podaniu doustnym.

Jednakże w przypadku przedawkowania należy skonsultować się z lekarzem.

Różne formy dializy (hemo- lub dializa otrzewnowa)

nie są skutecznymi metodami usuwania leku z organizmu.

Jeśli zapomniałeś zażyć Cefixim Sandoz 400 mg

lub zażyłeś zbyt mało tabletek:

Jeśli przy dwukrotnym dziennym zaleceniu Cefixim Sandoz 400 mg w odstępie 12 godzin zapomniano o 1 dawce (½ tabletki powlekanej), można ją przyjąć w ciągu 6 godzin, a następnie kontynuować rozpoczęty rytm przyjmowania bez zmian.

nene rytm przyjmowania niezmienny kontynuować.

Jeśli przy przyjmowaniu raz dziennie pominięto pełną dawkę dobową 1 tabletki powlekanej Cefixim Sandoz 400 mg (odpowiadającej 400 mg/dzień), można ją przyjąć w ciągu 12 godzin i zachować zwykły rytm przyjmowania.

W przypadku wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem.

Jeśli przerwiesz przyjmowanie:

Nawet jeśli objawy wyraźnie się poprawią, leczenie należy zakończyć, aby zapewnić całkowite usunięcie patogenów.

W przypadku przzerwania leczenia, np. z powodu zbyt silnych działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania leku, zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę.

4. Jakie działania niepożądane są możliwe?

Jak wszystkie leki, Cefixim Sandoz 400 mg może powodować

działania niepożądane, które nie muszą wystąpić u każdego. Przy ocenie działań niepożądanych stosuje się następujące częstości występowania:

Bardzo często: więcej niż 1 na 10 leczonych

Często: od 1 do 10 na 100 leczonych

Bardzo często: więcej niż 1 na 10 leczonych

Często: 1 do 10 leczonych na 100

Sporadycznie: 1 do 10 leczonych na 1000

Rzadko: 1 do 10 leczonych na 10 000

Bardzo rzadko: mniej niż 1 leczony na 10 000

Nieznana: Częstość na podstawie dostępnych danych nie do oszacowania

Działania niepożądane

Po zastosowaniu Cefixim Sandoz 400 mg obserwowano następujące działania niepożądane:

Infekcje

Rzadko: Przy długotrwałym i powtarzanym stosowaniu możliwe są superinfekcje z opornymi bakteriami lub drożdżakami.

Choroby układu krwiotwórczego i limfatycznego

Rzadko: Zwiększenie liczby eozynofiliów (określona forma białych krwinek) we krwi (eozynofilia).

Bardzo rzadko: Zmiany w obrazie krwi, takie jak np. zmniejszenie całkowitej liczby białych krwinek (leukopenia); ciężkie, mogące rozwijać się w ciągu godzin zmniejszenie określonych form białych krwinek (granulocytów) we krwi (agranulocytoza); znaczne zmniejszenie wszystkich komórek krwi (pancytopenia) lub zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia). Te zmiany w obrazie krwi ustępują samoistnie po zakończeniu terapii.

Zaburzenia krzepnięcia krwi.

Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (erytrocytów) przez czynniki uszkodzające komórki (niedokrwistość hemolityczna).

Choroby układu odpornościowego

Rzadko: gorączka polekowa

Reakcje nadwrażliwości o różnym stopniu nasilenia – aż do wstrząsu anafilaktycznego – były obserwowane również po doustnym przyjęciu cefalosporyn, choć znacznie rzadziej niż po podaniu dożylnym (dożylnie) lub domięśniowym.

Ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości mogą objawiać się jako: obrzęk twarzy (opuchlizna), obrzęk języka, wewnętrzny obrzęk krtani z zwężeniem dróg oddechowych, kołatanie serca, duszność, spadek

ciśnienia krwi aż do zagrażającego życiu wstrząsu.

W przypadku wystąpienia ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości terapia Cefixim Sandoz 400 mg musi być natychmiast przerwana, a niezbędne działania ratunkowe muszą być podjęte przez lekarza (patrz punkt 4.2).

Bardzo rzadko: reakcje podobne do choroby posurowiczej.

Choroby układu nerwowego

Czasami: Bóle głowy

Rzadko: Zawroty głowy

Bardzo rzadko: Przejściowy wzrost aktywności.

Podobnie jak w przypadku innych cefalosporyn, nie można wykluczyć zwiększonej skłonności do drgawek.

Choroby układu pokarmowego

Często: Luźne stolce, biegunka

Czasami: Zaburzenia w postaci bólów brzucha, niestrawności, nudności, wymioty

Rzadko: Brak apetytu, wzdęcia

Bardzo rzadko: Zapalenie jelita grubego, które może być wywołane przez terapię antybiotykową i charakteryzuje się ciężkimi i utrzymującymi się biegunkami

i wymaga leczenia medycznego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, patrz sekcje

„Szczególna ostrożność przy przyjmowaniu

Cefixim Sandoz 400 mg jest wymagana” i „Środki zaradcze”).

Choroby wątroby i dróg żółciowych

Choroby wątroby i dróg żółciowych

Cefixim Sandoz 400 mg.

Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby (hepatitis) i pewna forma żółtaczki

Cefixim Sandoz 400 mg jest wycofywany.

Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby (hepatitis) i określona forma żółtaczki żółtaczka (żółtaczka cholestatyczna).

Choroby skóry i tkanki podskórnej

Sporadycznie: wysypki skórne (rumień, wykwity)

Rzadko: świąd, zapalenie błon śluzowych

Bardzo rzadko: zmiany skórne wielkości monety, tarczowate, okrągło-wyniosłe,

czasami pęcherzowe, czerwone zmiany skórne z niebieskawym

centrum (rumień wielopostaciowy wysiękowy), pęcherzowe oddzielanie się naskórka

(zespół Lyella).

Choroby nerek i dróg moczowych

Rzadko: przejściowy wzrost stężenia mocznika we krwi (substancja azotowa)

Bardzo rzadko: wzrost stężenia kreatyniny we krwi (substancja azotowa, która wskazuje na funkcję wydalniczą nerek),

zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek)

Leczenie wysokimi dawkami cefalosporyn (grupa antybiotyków, do której należy również cefiksym, substancja czynna Cefixim Sandoz 400 mg) może u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują środki moczopędne (diuretyki, np. furosemid) lub dodatkowo antybiotyki, które mają działanie nefrotoksyczne, np. antybiotyki aminoglikozydowe, prowadzić do upośledzenia funkcji nerek lub do pogorszenia już ograniczonej funkcji nerek (patrz rozdział „Szczególna ostrożność przy przyjmowaniu Cefixim Sandoz 400 mg jest wymagana”).

Środki zaradcze

Następujące rzadkie działania niepożądane (szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tych działań niepożądanych patrz w „Jakie działania niepożądane są możliwe?”) mogą być potencjalnie zagrażające życiu. Dlatego należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli takie zdarzenie nagle wystąpi lub nieoczekiwanie się nasili.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

W tym przypadku lekarz musi rozważyć przerwanie leczenia Cefixim Sandoz 400 mg i w razie potrzeby natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie (np. przyjmowanie specjalnych antybiotyków/chemioterapeutyków). Leki, które hamują ruchy jelit (perystaltykę), nie mogą być przyjmowane. Ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja)

W tym przypadku leczenie Cefixim Sandoz 400 mg musi być natychmiast przerwane i należy niezwłocznie wezwać lekarza pogotowia, który rozpocznie uznane działania ratunkowe.

Proszę poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli którykolwiek z wymienionych

Proszę poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli którykolwiek z wymienionych ten działania niepożądane znacznie wpływają na Ciebie lub zauważysz działania niepożądane, które nie są wymienione w tej ulotce.

5. Jak przechowywać Cefixim Sandoz 400 mg?

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6. Dalsze informacje

Co zawiera Cefixim Sandoz 400 mg

Substancją czynną jest: cefiksym trójwodny.

1 tabletkę powlekaną zawiera 447,63 mg cefiksymu trójwodnego, co odpowiada 400 mg cefiksymu.

Pozostałe składniki to:

Celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza,

Makrogol 400, stearynian magnezu (Ph.Eur.), fosforan wapnia wodorowy,

Sodu dodecylosiarczan, talk, dwutlenek tytanu (E171)

Jak wygląda Cefixim Sandoz 400 mg i co zawiera opakowanie

Cefixim Sandoz 400 mg to białe, podłużne tabletki powlekane z rowkiem.

Tabletki powlekane można podzielić na równe połowy.

Cefixim Sandoz 400 mg jest dostępny w oryginalnych opakowaniach po 5 (N1), 7 (N1)

Cefixim Sandoz 400 mg jest dostępny w oryginalnych opakowaniach po 5 (N1), 7 (N1)

i 10 (N1) tabletek powlekanych dostępnych.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Raiffeisenstraße 11, 83607 Holzkirchen, E-Mail: info@sandoz.de

Producent

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Ulotka została ostatnio zaktualizowana w

kwietniu 2009.