

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cerazette, 75 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid
desogestreel

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne, kui hakkate seda ravimit võtma, sest see sisaldab olulist teavet teie jaoks.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
- Äрге andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mis ei ole selles infolehes loetletud? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Cerazette ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit võtta või peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit võtta?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Cerazette ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Cerazette't kasutatakse raseduse vältimiseks. Cerazette sisaldab väikest kogust ühte tüüpi naissuguhormooni, progestageeni desogestreeli. Seetõttu nimetatakse Cerazette't ka ainult progestageeni sisaldavaks pilliks. Ainult progestageeni sisaldavad pillid ei sisalda – erinevalt kombineeritud pillidest – östrogeenhormooni lisaks progestageenile.

Enamiku ainult progestageeni sisaldavate pillide toime põhineb peamiselt sellel, et need takistavad spermatooside tungimist emakasse. Munaraku küpsemist ei takistata alati. Viimane on kombineeritud pilli peamine toime. Cerazette erineb enamikust ainult progestageeni sisaldavatest pillidest, kuna annus on piisavalt kõrge, et enamikul juhtudel takistada munaraku küpsemist. Seetõttu on Cerazette väga usaldusväärne.

Erinevalt kombineeritud pillidest võivad Cerazette't kasutada naised, kes ei talu östrogeene ja naised, kes imetavad. Cerazette puuduseks on see, et kuupuhastus võib esineda ebaregulaarsete vahedega. Samuti on võimalus, et see verejooks jääb täielikult ära. 2. Millal ei tohi te seda ravimit võtta või peate olema eriti ettevaatlik?

Nagu teised hormonaalsed rasestumisvastased vahendid, ei kaitse Cerazette HIV-nakkuse (AIDS) ega

muude sugulisel teel levivate haiguste (STL) eest. Millal ei tohi te seda ravimit võtta?

Olete allergiline selle ravimi mõne koostisosa suhtes. Neid aineid leiate

- jaotisest 6. rubriik 6.

- Teil on tromboos. Tromboos on verehüübe moodustumine veresoones (näiteks jalas (süvaveenitromboos) või kopsudes (kopsuemboolia)). Teil on kollatõbi (naha kollane värvumine) või raske maksahaigus, või teil on see olnud, ja teie maksafunktsioon ei ole veel normaalne.
- Teil on suguhormoonidele tundlik vähivorm, nagu mõned rinnavähi tüübid, või kahtlustatakse, et teil on see. Teil on seletamatud verejooksud tupest.
- Rääkige oma arstile enne Cerazette kasutamist, kui mõni neist olukordadest kehtib teie kohta. Teie arst võib soovitada mittehormonaalset rasestumisvastast meetodit. Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui mõni neist olukordadest tekib Cerazette kasutamise ajal.
- Millal peate selle ravimiga olema eriti ettevaatlik?

Rääkige oma arstile enne Cerazette raviga alustamist, kui: Teil on kunagi olnud rinnavähk. Teil on maksavähk, sest Cerazette võimalikku mõju ei saa välistada. Teil on kunagi olnud tromboos.

Teil on diabeet.

Teil on epilepsia (vt jaotis 'Kas te kasutate veel teisi ravimeid?').

- Teil on tuberkuloos (vt jaotis 'Kas te kasutate veel teisi ravimeid?').
- Teil on kõrge vererõhk.
- Kui teil on kunagi olnud tromboos.
- Teil on suhkruhaigus (diabeet).
- Teil on epilepsia (vt jaotist „Kas te kasutate veel muid ravimeid?“).
- Teil on tuberkuloos (vt jaotist „Kas te kasutate veel teisi ravimeid?“).
- Teil on kõrge vererõhk.
- Kui teil on kloasm või olete seda kunagi põdenud (kollakaspruunid pigmendilaigud nahal, nn 'raseduslaigud', eriti näol); sellisel juhul vältige otsesest kokkupuudet päikesevalguse või ultravioletvalgusega.

Kui kasutate Cerazette'i, kui teil on mõni neist seisunditest, võib olla vajalik, et te jääksite täiendava jälgimise alla. Teie arst võib teile selgitada, mida teha.

Rinnavähk

Oluline on regulaarselt oma rindu kontrollida ja viivitamatult oma arstiga ühendust võtta, kui tunnete oma rinnas tükki.

Naistel, kes kasutavad pille, diagnoositakse veidi sagedamini rinnavähki kui samaealistel naistel, kes pille ei kasuta. Kui naised lõpetavad pillide võtmise, väheneb risk aeglaselt, nii et 10 aastat pärast lõpetamist on see sama, mis naistel, kes pole kunagi pille kasutanud. Rinnavähk esineb harva alla 40-aastastel, kuid risk suureneb vanuse kasvades. Seetõttu on täiendavate rinnavähi juhtumite arv suurem naiste seas, kes kasutavad pille vanemas eas. Kui kaua pille kasutatakse, on vähem oluline.

Iga 10 000 naise kohta, kes kasutavad pille 5 aastat, kuid lõpetavad nende võtmise 20-aastaselt, leitakse kuni 10 aastat pärast lõpetamist vähem kui 1 täiendav rinnavähi juhtum, lisaks 4 juhtumile, mis selles vanuserühmas tavaliselt diagnoositakse. Samamoodi leitakse iga 10 000 naise kohta, kes kasutavad pille 5 aastat, kuid lõpetavad nende võtmise 30-aastaselt, 5 täiendavat juhtumit rinnavähki, lisaks 44 juhtumile, mis tavaliselt diagnoositakse.

Juures 10 000 naise seas, kes kasutavad pille 5 aastat, kuid lõpetavad nende võtmise 40-aastaselt, leitakse 20 lisajuhtumit rinnavähki, lisaks 160 juhtumile, mis tavaliselt avastatakse kindlaks tehtud. Arvatakse, et ainult progestageeni sisaldavate pillide, nagu Cerazette, kasutajate rinnavähi risk on sarnane kombineeritud pillide kasutajate riskiga, kuid tõendid, selle kohta on vähem veenvad.

Rinnavähi juhtumid, mis leitakse pillide kasutajatel, on sagedamini vähem arenenud kui need, mis leitakse mitte-pillide kasutajatel. Ei ole teada, kas erinevus rinnavähi riskis on põhjustatud pillidest. Võib ka olla, et pillide kasutajaid uuritakse sagedamini, mistõttu avastatakse rinnavähk varem.

Tromboos

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad sümptomid, mis võivad viidata tromboosile (vt ka 'Regulaarne kontroll').

Tromboos on verehüübe moodustumine, mis võib sulgeda veresooni.

Tromboos esineb mõnikord ühes sügavalt paiknevas jala veenis (süvaveenitromboos). Kui hüüve eraldub, võib see jõuda kopsuarteritesse ja seal veresooni sulgeda (kopsuemboolia). See võib mõnikord lõppeda surmaga. Süvaveenitromboos on haruldane. See võib esineda pillide kasutajatel ja mitte-kasutajatel. See võib esineda ka raseduse ajal. rasedus.

Tromboosirisk on kombineeritud pillide kasutajatel suurem kui neil, kes pille ei kasuta. See risk progestageeni sisaldavate pillidega, nagu Cerazette, peetakse madalamaks kui kombineeritud pillide kasutajatel, mis sisaldavad ka östrogeene.

Psüühikahäired

Mõned naised, kes kasutavad hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, sealhulgas Cerazette, on teatanud depressioonist või masendusest. Depressioon võib olla tõsine ja mõnikord viia enesetapumõtteni. Kui teil esineb meeleolukõikumisi ja depressiooni sümptomeid, depressiooni kogeb, Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

Puudub uurimisinfo tõhususe ja ohutuse kohta alla 18-aastastel noorukitel.

Kasutate teisi ravimeid?

Kas kasutate lisaks Cerazette'ile veel teisi ravimeid või taimseid preparaate, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate lähitulevikus teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Rääkige ka igale teisele arstile või hambaarstile, kes teile teise ravimi määrab (või teie apteekrile), et te kasutate Cerazette'i. Nad saavad teile öelda, kas peate võtma lisaks rasestumisvastaseid meetmeid (näiteks kondome) ja kui kaua, või kas teie teise ravimi kasutamist tuleb muuta. rasestumisvastaseid meetmeid (näiteks kondoomid) peab kasutama ja kui kaua, või kas kasutamine teie teise ravimi annust tuleb muuta.

Mõned ravimid

võivad mõjutada Cerazette'i vere taset

võivad muuta Cerazette'i vähem tõhusaks raseduse vältimisel

võivad põhjustada ootamatuid veritsusi.

Nende hulka kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

epilepsia (näiteks primidoon, fenütoiin, karbamasepiin, okskarbasepiin, felbamaat, topiramaat ja fenobarbitaal)

tuberkuloos (näiteks rifampitsiin, rifabutiin)

HIV-infektsioonid (näiteks ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens)

C-hepatiidi viirusinfektsioon (näiteks botsepreviir, telapreviir)

muud nakkushaigused (näiteks griseofulviin)

kõrge vererõhk kopsude veresoontes (bosentaan)

depressiivsed meeleolud (naistepuna ürt)

teatud bakteriaalsed infektsioonid (näiteks klaritromütsiin, erütromütsiin)

seeninfektsioonid (näiteks ketokonasool, itrakonasool, flukonasool)

kõrge vererõhk (hüpertensioon), stenokardia või teatud südame rütmihäired (näiteks diitiaseem).

Kui te kasutate ravimeid või taimseid preparaate, mis võivad Cerazette'i vähem tõhusaks muuta, peate kasutama ka barjäärimeetodit rasestumisvastaseks kaitseks. Kuna teise ravimi mõju Cerazette'ile võib kesta kuni 28 päeva pärast selle ravimi kasutamise lõpetamist, peate selle lisabarjäärimeetodi kasutamist jätkama selle aja jooksul. Teie arst võib teile rääkida, kas ja kui kaua peate täiendavaid rasestumisvastaseid meetmeid kasutama.

Cerazette võib mõjutada ka teiste ravimite toimet ja seda tugevdada (näiteks tsüklosporiini sisaldavad ravimid) või vähendada (näiteks lamotrigiin).

Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt enne ravimi võtmist.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Ärge kasutage Cerazette'i, kui olete rase või arvate, et võite olla rase.

Imetamine

Cerazette'i võib kasutada imetamise ajal. Cerazette ei näi mõjutavat rinnapiima tootmist ega kvaliteeti. Siiski on teatatud vähestest juhtudest, kus rinnapiima tootmine on Cerazette'i kasutamise ajal vähenenud. Väike kogus Cerazette'i toimeainet satub rinnapiima.

7 kuud imetatud laste tervist, kelle emad kasutasid Cerazette'i, on uuritud 2,5 aasta jooksul. Ei leitud mingit mõju laste kasvule ega arengule. lapsi nähtud.

Autojuhtimine ja masinate käsitlemine

Puuduvad tõendid selle kohta, et Cerazette kasutamine mõjutaks keskendumisvõimet ja reaktsioonikiirust.

Cerazette sisaldab laktoosi mõjutatud.

Cerazette sisaldab laktoosi

Võtke ühendust oma arstiga enne Cerazette'i võtmist, kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid.

Regulaarne kontroll

Teie arst võib soovitada teil regulaarselt kokku leppida meditsiinilise kontrolli aeg, kui te kasutate Cerazette'i. See, kui sageli peate kontrolli minema, sõltub teie isiklikust olukorrast ja milline uuring siis toimub.

Võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga järgmistel juhtudel:

- kui teil on tugev valu või turse ühes jalas, seletamatu valu rinnus, hingeldus, äkiline ebatavaline kõha, eriti kui sellega kaasneb vere kõhimine (see võib viidata tromboosile)
- kui teil on äkiline, tugev kõhuvalu või kollatõbi (see võib viidata maksaprobleemidele)
- kui teil on tükk rinnas (see võib viidata rinnavähile)
- kui teil on äkiline, tugev valu alakõhus või kõhupiirkonnas (see võib viidata emakavälisele rasedusele)
- vähemalt neli nädalat enne operatsiooni või kui olete mõnda aega voodihaige või ei tohi kõndida
- kui teil on seletamatu, tugev ja püsiv verejooks tupest
- kui kahtlustate, et võite olla rase.

3. Kuidas seda ravimit võtta?

Millal ja kuidas tablette võtta?

Cerazette riba sisaldab 28 tabletti. Riba esiküljel, tablettide vahel, näete noolekesi. Tagaküljel olevas fooliumis on nädala päevad. Iga päevaga kaasneb tablett. Alustage iga uut riba ülemise rea tabletiga. Veenduge, et alustate õige tabletiga. Näiteks, kui alustate kolmapäeval, võtke ülemise rea tablett, millel (tagaküljel) on KO. Järgige noolte suunda ja võtke iga päev üks tablett, kuni riba on tühi. Riba tagaküljel näete hõlpsasti, kas olete oma igapäevase tableti juba võtnud.

Võtke tablette iga päev umbes samal ajal, koos veega, ilma närimata. Cerazette kasutamise ajal võib teil esineda menstruatsioonilaadseid veritsusi, kuid peate oma tablette jätkama. Kui riba on tühi, alustage kohe järgmisel päeval uue Cerazette ribaga - seega ilma katkestuseta ja ilma veritsust ootamata.

Millal alustada Cerazette esimese ribaga?

Te ei ole eelmisel kuul kasutanud rasestumisvastaseid tablette:

Oodake oma menstruatsiooni. Võtke esimene Cerazette tablett oma menstruatsiooni esimesel päeval. Te ei pea siis täiendavat rasestumisvastast vahendit kasutama. Võite alustada ka menstruatsiooni 2.-5. päeval, kuid sel juhul peate kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit (kondoomi) esimese 7 tableti võtmise päeva jooksul.

Te vahetate kombineeritud pillidelt, vaginaalselt rõngalt või transdermaalselt plaastrilt:

Alustage Cerazette'iga päeval pärast viimase tableti võtmist oma praegusest pilliribast või päeval, mil eemaldate oma vaginaalse rõnga või plaastri (seega ilma tableti-, rõnga- või plaastrivaba perioodita). Kui teie praegune pilliriba sisaldab ka platseebotablette (seega ilma hormoonideta), peate alustama Cerazette'iga päeval pärast viimase toimeainega tableti võtmist (kui te pole kindel, milline see on, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt). Te ei pea kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit, kui järgite neid juhiseid.

Võite alustada ka hiljemalt päeval pärast oma tableti-, rõnga- või plaastrivaba perioodi või perioodi platseebotablettidega oma praegusest rasestumisvastasest vahendist. Kui järgite neid juhiseid, peate siiski kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit (kondoomi) esimese 7 päeva jooksul tablettide kasutamisel.

Te vahetate teise ainult progestageeni sisaldava pilli vastu:

Võite ühelt päevalt teisele üle minna Cerazette'ile ja te ei pea kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit.

Te vahetate süstitava preparaadi, implantaadi või hormoonspiraali vastu:

Võite alustada Cerazette'iga päeval, mil järgmine süst peaks toimuma või päeval, mil teie implantaat või hormoonspiraal eemaldatakse. Te ei pea kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit.

Pärast sünnitust:

Alustage Cerazette'iga 21 kuni 28 päeva pärast sünnitust. Kui alustate hiljem, peate esimese tsükli jooksul kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit (kondoomi), kuni olete 7 päeva järjest tabletti võtnud. Kui teil on juba olnud vahekord, peate rasedus tuleb välistada enne Cerazette'i kasutamise alustamist. Lisateave imetavatele naistele on leitav jaotises 'Rasedus ja imetamine' jaotises 2. Teie arst võib teid ka nõustada.

Pärast raseduse katkemist või aborti:

Järgige oma arsti nõuandeid.

Kas unustasite seda ravimit võtta?

Kui olete tableti võtmisega vähem kui 12 tundi hilinenud, ei ole Cerazette'i usaldusväärsus vähenenud. Võtke unustatud tablett niipea, kui sellele mõtlete, ja võtke järgmised tabletid tavapärasel ajal.

Kui olete tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi hilinenud, võib Cerazette'i usaldusväärsus väheneda. Mida rohkem tablette järjest olete unustanud, seda suurem on tõenäosus, et rasestumisvastane toime on vähenenud. Võtke viimane unustatud tablett niipea, kui sellele mõtlete, ja võtke järgmised tabletid tavapärasel ajal. Kasutage esimese 7 tableti võtmise päeva jooksul ka kondoomi. Kui olete unustanud ühe või mitu tabletti esimesel nädalal ja olete 7 päeva jooksul enne unustamist olnud vahekorras, peate arvestama võimalusega rasedus. Küsige nõu oma arstilt.

Mida teha, kui teil on seedetrakti häired (näiteks oksendamine, tugev kõhulahtisus) Järgige ülaltoodud juhiseid tablettide unustamise kohta. Kui te oksendate 3-4 tunni jooksul pärast tableti võtmist või teil on tugev kõhulahtisus, on võimalus, et toimeaine ei imendu täielikult kehasse.

Kas olete võtnud liiga palju seda ravimit?

Puuduvad teated tõsiste kahjulike tagajärgede kohta pärast liiga paljude Cerazette tablettide korruga võtmist. Teil võib esineda iiveldust ja oksendamist. Noortel tüdrukutel võib esineda vähest verejooksu tupest. Lisateabe saamiseks küsige vajadusel oma arstilt nõu.

Kui lõpetate selle ravimi võtmise

Võite Cerazette võtmise lõpetada, millal soovite. Alates päevast, mil lõpetate, ei ole te enam kaitstud raseduse eest.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei esine tegema.

Mõned tõsised kõrvaltoimed, mis on seotud Cerazette kasutamisega, on kirjeldatud jaotistes „Rinnavähk“ ja „Tromboos“ jaotises 2. Saate seda osa lugeda lisateabe saamiseks teabe ja võtke vajadusel ühendust oma arstiga.

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekib tugev keha reaktsioon tõsise allergia tõttu. Teil tekib äkki: paistes keel, paistes huuled, paistes nägu ja/või paistes kurk (angioödeem). Teil võib olla raskusi hingamise või neelamisega (angioödeem ja/või eluohtlik allergiline reaktsioon). See on eluohtlik

Cerazette kasutamise ajal võib esineda ebaregulaarset verejooksu vaginast. See võib piirduda mõne tilgaga, mille jaoks pole isegi sidet vaja, või võib esineda rohkem verejooksu, nagu kerge igakuine verejooks, mille jaoks on vaja sidet. Samuti on võimalus, et verejooksud jäävad täielikult ära. Ebaregulaarsed verejooksud ei ole märk Cerazette vähenenud kaitse kohta raseduse vastu. Üldiselt ei pea te midagi tegema ja võite jätkata Cerazette võtmist. Kui verejooks on aga tõsine või pikaajaline, peate võtma ühendust oma arstiga.

Cerazette kasutajad on teatanud järgmistest kõrvaltoimetest:

Sageli: esinevad vähem kui 1 naisel 10-st

- meeleolumuutused, masendunud meeleolu, vähenenud seksuaaliha (libiido)
- peavalu
- iiveldus
- vistrikud (akne)
- valulikud rinnad, menstruatsioonid puuduvad või on ebaregulaarsed
- kaalutõus

Mõnikord: esineb vähem kui 1-l 100-st naisest

- tupeinfektsioon
- silmaärritus kontaktläätsede kasutamisel
- oksendamine
- juuste väljalangemine
- valu menstruatsiooni ajal, munasarja tsüst
- väsimumus

Harva: esineb vähem kui 1-l 1000-st naisest nahalööve, nahalööve roosade punnidega ja tugev sügelus (nõgestõbi või urtikaaria), punane turse naha all. See on tingitud rasvkoe tursest. Sageli esineb see teie säärel. Nahk on valulik (erythema nodosum)

Pole teada: sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus)

Lisaks nendele kõrvaltoimetele võib esineda ka eritist rinnast.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Hollandi Kõrvaltoimete Keskuse Lareb kaudu, veebisait: www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud pakendile pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp. kõlblikkusaja lõpp.

Selle ravimi puhul ei ole eritingimusi temperatuuri osas. Hoida blisterpakendit originaalses kotikeses valguse ja niiskuse eest kaitstult. Kasutada 1 kuu jooksul pärast kotikese esmakordset avamist.

Toimeaine kujutab keskkonnas ohtu kaladele.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või tualetti ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse vastutustundlikult ja ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

- Selle ravimi toimeaine on desogestreel (75 mikrogrammi).
- Teised ained selles ravimis on veevaba kolloidne ränidioksiid, all-rac- α -tokoferool, maisitärklis, povidoon, steariinhape, hüpromelloos, makrogool 400, talk, titaandioksiid (E171), laktoosmonohüdraat (vt ka 'Cerazette sisaldab laktoosi' jaotis 2).

Kuidas Cerazette välja näeb ja kui palju on pakendis?

Cerazette blisterpakend sisaldab 28 valget, ümmargust kilekattega tabletti. Ühel pool tabletti on kiri 'KV' ja selle all '2', teisel pool on kiri 'ORGANON*'. Iga pappkarp sisaldab 1, 3, 6 või 13 blisterpakendit, mis on eraldi pakitud kotikestesse. Mitte kõiki nimetatud pakendisuurusi ei turustata.

Müügiloa hoidja ja tootja

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland.
Tel.: 00800-66550123 (või +32 2 241 81 00)
E-post: d poc.benelux@organon.com
Registrisse kantud RVG 22743 all

See ravim on registreeritud EEA liikmesriikides järgmiste nimede all:

Belgia, Taani, Saksamaa, Soome, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland,
Norra, Austria, Portugal, Ühendkuningriik, Rootsi: Cerazette Hispaania: Cerazet
Hispaania: Cerazet

Seda pakendi infolehte on viimati heaks kiidetud detsembris 2021.