

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle
Cerazette, 75 mikrogrammaa kalvopäällysteiset tabletit
desogestreeli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää tärkeitä tietoja sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, joka ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota silloin yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mitä Cerazette on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Cerazette on ja mihin sitä käytetään?

Cerazettea käytetään raskauden ehkäisyyn. Cerazette sisältää pienen määrän yhtä naissukupuolihormonia, progestiinia desogestreeliä. Siksi Cerazettea kutsutaan myös pelkästään progestiinia sisältäväksi pilleriksi. Pelkästään progestiinia sisältävät pillerit eivät – toisin kuin yhdistelmäpillerit – sisällä estrogeenihormonia progestiinin lisäksi.

Useimpien pelkästään progestiinia sisältävien pillereiden vaikutus perustuu pääasiassa siihen, että ne estävät siittiöiden pääsyn kohtuun. Munasolun kypsyminen ei aina esty. Tämä viimeinen on yhdistelmäpillerin tärkein vaikutus. Cerazette eroaa useimmista pelkästään progestiinia sisältävistä pillereistä, koska annos on tarpeeksi korkea estämään useimmissa tapauksissa munasolun kypsymisen. Cerazette on siten erittäin luotettava.

Toisin kuin yhdistelmäpillerit, Cerazettea voivat käyttää naiset, jotka eivät siedä estrogeeneja, ja naiset, jotka imettävät. Cerazetten haittapuoli on, että kuukautisvuoto voi esiintyä epäsäännöllisin väliajoin. On myös mahdollista, että tämä vuoto jää kokonaan pois. 2. Milloin tätä lääkettä ei saa ottaa tai milloin on oltava erityisen varovainen?

Kuten muut hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, Cerazette ei suojaa hiv-infektiolta (aids) tai muulta sukupuoliteitse tarttuvalta taudilta (sti). Milloin tätä lääkettä ei saa ottaa?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löydät

- kohdasta 6. kohta 6.

- Sinulla on tromboosi. Tromboosi on verihyytymän muodostuminen verisuonessa (esimerkiksi jalassa (syvä laskimotromboosi) tai keuhkoissa (keuhkoembolia)).
- Sinulla on keltatauti (ihon keltainen värjäytyminen) tai vakava maksasairaus, tai sinulla on ollut tämä, ja maksan toimintasi ei ole vielä normaali.
- Sinulla on syöpämuoto, joka on herkkä sukupuolihormoneille, kuten jotkut rintasyövät, tai epäillään, että sinulla on tämä.
- Sinulla on selittämättömiä verenvuotoja emättimestä.

Kerro lääkärillesi ennen kuin aloitat Cerazette-valmisteen käytön, jos jokin näistä tilanteista koskee sinua. Lääkärisi saattaa suositella sinulle ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos jokin näistä tilanteista ilmenee Cerazette-valmisteen käytön aikana. käytetty.

Kerro lääkärillesi ennen kuin aloitat Cerazette-hoidon, jos:
Sinulla on ollut rintasyöpä.

- Sinulla on maksasyöpä, koska Cerazette-valmisteen mahdollisia vaikutuksia ei voida sulkea pois.
- Sinulla on ollut tromboosi.
- Sinulla on diabetes (sokeritauti).
- Sinulla on epilepsia (katso kohta 'Käytätkö muita lääkkeitä?').
- Sinulla on tuberkuloosi (katso kohta 'Käytätkö muita lääkkeitä?').
- Sinulla on korkea verenpaine.
- Sinulla on korkea verenpaine.
- Jos sinulla on tai on ollut kloasma (keltaruskeita pigmenttiläiskiä iholla, niin sanottuja 'raskausläiskiä', erityisesti kasvoissa); jos näin on, vältä suoraa altistumista auringonvalolle tai ultraviolettivalolle.

Jos käytät Cerazettea, kun sinulla on jokin näistä sairauksista, voi olla tarpeen, että olet lisäseurannassa. Lääkärisi voi selittää, mitä sinun tulee tehdä.

Rintasyöpä

On tärkeää tarkistaa rintasi säännöllisesti ja ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos tunnet kyhmyyn rinnoissasi.

Naisilla, jotka käyttävät ehkäisytabletteja, todetaan hieman useammin rintasyöpää kuin saman ikäisillä naisilla, jotka eivät käytä pillereitä. Kun naiset lopettavat pillereiden käytön, riski vähenee hitaasti, joten 10 vuotta lopettamisen jälkeen se on sama kuin naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet pillereitä. Rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuotiailla, mutta riski kasvaa iän myötä. Siksi ylimääräisten rintasyöpätapausten määrä on suurempi naisilla, jotka käyttävät pillereitä vanhemmalla iällä. Kuinka kauan pillereitä käytetään, on vähemmän tärkeää. Jokaisella 10 000 naisella, jotka käyttävät pillereitä 5 vuoden ajan mutta lopettavat 20-vuotiaana,

löytyisi 10 vuoden kuluessa lopettamisesta alle 1 ylimääräinen rintasyöpätapaus, normaalin 4 tapauksen lisäksi, jotka todetaan tässä ikäryhmässä. Samalla tavalla jokaisella 10 000 naisella, jotka käyttävät pillereitä 5 vuoden ajan mutta lopettavat 30-vuotiaana, löytyisi 5 ylimääräistä rintasyöpätapausta, normaalin 44 tapauksen lisäksi, jotka todetaan normaalisti. rintasyöpätapauksia löydetään, normaalisti todettujen 44 tapauksen lisäksi.

Kun 10 000 naista, jotka käyttävät pilleriä 5 vuoden ajan mutta lopettavat sen käytön 40-vuotiaana, saattaisi löytyä 20 ylimääräistä rintasyöpätapausta, normaalien 160 tapauksen lisäksi, jotka yleensä todetaan. Uskotaan, että pelkkää progestiinia sisältävien pillereiden, kuten Cerazette, käyttäjien rintasyöpäriski on verrattavissa yhdistelmäpillerin käyttäjien riskiin, mutta todisteet, siitä ovat vähemmän vakuuttavia.

Pillereiden käyttäjillä löydettyt rintasyöpätapaukset ovat usein vähemmän edenneitä kuin ne, jotka löytyvät ei-käyttäjiltä. Ei tiedetä, johtuuko ero rintasyöpäriskissä pillereistä. On myös mahdollista, että pillereiden käyttäjät tutkitaan useammin, jolloin rintasyöpä havaitaan aikaisemmin.

Tromboosi

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla ilmenee oireita, jotka voivat viitata tromboosiin (katso myös 'Säännöllinen tarkastus').

Tromboosi on verihyytymän muodostuminen, joka voi tukkia verisuonen.

Tromboosi esiintyy joskus jossakin jalan syvällä sijaitsevista laskimoista (syvä laskimotromboosi). Jos hyytymä irtoaa, se voi kulkeutua keuhkojen valtimoihin ja tukkia siellä verisuonen (keuhkoembolia). Tämä voi joskus olla kohtalokasta. Syvä laskimotromboosi on harvinainen. Se voi esiintyä pillereiden käyttäjillä ja ei-käyttäjillä. Se voi myös esiintyä raskauden aikana. raskaus.

Yhdistelmäpillerin käyttäjillä on suurempi riski tromboosiin kuin ei-pillerin käyttäjillä. Se riski, joka liittyy pelkästään progestageenia sisältäviin pillereihin, kuten Cerazette, katsotaan olevan pienempi kuin yhdistelmäpillereitä, jotka sisältävät myös estrogeeneja, käyttävillä.

Psyykkiset häiriöt

Jotkut naiset, jotka käyttävät hormonaalisia ehkäisyvälineitä, mukaan lukien Cerazette, ovat raportoineet masennuksesta tai alakuloisuudesta. Masennus voi olla vakavaa ja voi joskus johtaa itsemurha-ajatuksiin. Jos koet mielialanvaihteluita ja masennuksen oireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisäohjeita. Lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat

Ei ole tutkimustietoa tehosta ja turvallisuudesta alle 18-vuotiailla nuorilla.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Cerazetten lisäksi muita lääkkeitä tai rohdosvalmisteita, oletko tehnyt niin äskettäin tai onko mahdollista, että aiot käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Kerro myös jokaiselle muulle lääkärille tai hammaslääkärille, joka määrää sinulle toisen lääkkeen (tai apteekkarillesi), että käytät Cerazettea. He voivat kertoa sinulle, tarvitsetko lisäehkäisytoimenpiteitä (esimerkiksi kondomeja) ja kuinka kauan, tai tuleeko muiden lääkkeidesi käyttöä muuttaa. ehkäisymenetelmiä (esimerkiksi kondomit) on käytettävä ja kuinka kauan, tai että käyttö toista lääkettäsi on muutettava.

Jotkut lääkkeet

voivat vaikuttaa Cerazetten verenpitoisuuteen

voivat tehdä Cerazettesta vähemmän tehokkaan raskauden ehkäisyssä

voivat aiheuttaa odottamattomia verenvuotoja.

Näihin kuuluvat muun muassa lääkkeet seuraavien hoitoon:

- epilepsia (esimerkiksi primidoni, fenytoiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, felbamaatti, topiramaatti ja fenobarbitaali)
- tuberkuloosi (esimerkiksi rifampisiini, rifabutiini)
- hiv-infektiot (esimerkiksi ritonaviiri, nelfinaviiri, nevirapiini, efavirentsi)
- hepatiitti C -virusinfektio (esimerkiksi bosepreviiri, telapreviiri)
- muut infektioaudit (esimerkiksi griseofulviini)
- korkea verenpaine keuhkojen verisuonissa (bosentaani)
- masentuneet mielialat (rohdosvalmiste mäkikuisma)
- tietyt bakteeri-infektiot (esimerkiksi klaritromysiini, erytromysiini)
- sieni-infektiot (esimerkiksi ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli)
- korkea verenpaine (hypertensio), angina tai tietyt sydämen rytmihäiriöt (esimerkiksi diiliatseemi).

Jos käytät lääkkeitä tai rohdosvalmisteita, jotka voivat tehdä Cerazettesta vähemmän tehokkaan, sinun on myös käytettävä estemenetelmää ehkäisyyn. Koska toisen lääkkeen vaikutus Cerazetteen voi jatkua jopa 28 päivää sen lääkkeen lopettamisen jälkeen, sinun on jatkettava lisäesteen käyttöä tänä aikana. Lääkärisi voi antaa sinulle kertoa, onko ja kuinka kauan sinun on käytettävä lisäehkäisyä.

Cerazette voi myös vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan ja tehostaa niiden vaikutusta (esimerkiksi syklosporiinia sisältävät lääkkeet) tai heikentää (esimerkiksi lamotrigiini). Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista ennen lääkkeen ottamista.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Älä käytä Cerazettea, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.

Imetys

Cerazettea voidaan käyttää imetyksen aikana. Cerazetten ei ole todettu vaikuttavan rintamaidon tuotantoon tai laatuun. On kuitenkin raportoitu muutamia tapauksia, joissa rintamaidon tuotanto on vähentynyt Cerazetten käytön aikana. Pieni määrä Cerazetten vaikuttavaa ainetta päätyy rintamaitoon.

Lasten terveyttä, jotka saivat 7 kuukautta rintamaitoa ja joiden äidit käyttivät Cerazettea, on tutkittu 2,5 vuoden ajan. Lasten kasvussa tai kehityksessä ei havaittu mitään vaikutusta. Jos imetät ja haluat käyttää Cerazettea, ota yhteyttä lääkäriisi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei ole viitteitä siitä, että Cerazetten käyttö vaikuttaisi keskittymiskykyyn tai reaktiokykyyn. Cerazette sisältää laktoosia vaikuttaa.

Cerazette sisältää laktoosia

Ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin otat Cerazettea, jos lääkäri on kertonut sinulle, että et siedä tiettyjä sokereita.

Säännöllinen tarkastus

Lääkärisi voi suositella, että varaat säännöllisesti ajan lääkärintarkastukseen, jos käytät Cerazettea. Henkilökohtaisesta tilanteestasi riippuu, kuinka usein sinun on mentävä tarkastukseen ja minkälaisia tutkimuksia silloin tehdään.

Ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi seuraavissa tapauksissa:

jos sinulla on voimakasta kipua tai turvotusta jommassakummassa jalassa, selittämätöntä rintakipua, hengitysvaikeuksia, äkillistä epätavallista yskää, erityisesti jos siihen liittyy veren yskimistä (tämä voi viitata tromboosiin)

jos sinulla on äkillinen, voimakas vatsakipu tai keltaisuus (tämä voi viitata maksavaivoihin)

jos sinulla on kyhmy rinnassa (tämä voi viitata rintasyöpään)

jos sinulla on äkillinen, voimakas kipu alavatsassa tai vatsan alueella (tämä voi viitata kohdunulkopuoliseen raskauteen)

vähintään neljä viikkoa ennen leikkausta tai jos olet pitkään vuodepotilaana tai et saa kävellä jos sinulla on selittämätöntä, voimakasta ja jatkuvaa verenvuotoa emättimestä

jos epäilet olevasi raskaana.

3. Miten otat tätä lääkettä?

Milloin ja miten otat tabletit?

Milloin ja miten otat tabletit?

Cerazette-liuska sisältää 28 tablettia. Liuskan etupuolella, tablettien välissä, näet nuolet.

Takapuolen foliosta löytyvät viikonpäivät. Jokaiselle päivälle kuuluu yksi tabletti. Aloita jokainen uusi liuska ottamalla tabletti ylimmästä rivistä. Varmista, että aloitat oikealla tabletilla. Esimerkiksi, jos aloitat keskiviikkona, ota tabletti ylimmästä rivistä, jossa (takapuolella) on KE. Seuraa nuolten suuntaa ja ota joka päivä yksi tabletti, kunnes liuska on tyhjä. Takapuolelta näet helposti, oletko jo ottanut päivittäisen tablettisi.

Ota tabletit joka päivä suunnilleen samaan aikaan, veden kanssa pureskelematta. Cerazetten käytön aikana voit kokea kuukautisia muistuttavia vuotoja, mutta sinun tulee jatkaa tablettien ottamista normaalisti. Kun liuska on tyhjä, aloita heti seuraavana päivänä uusi Cerazette-liuska - ilman taukoa ja odottamatta vuotoa. Milloin aloittaa ensimmäinen Cerazette-liuska? Et ole käyttänyt ehkäisytabletteja viime kuukauden aikana:

Odota kuukautistesi alkamista. Ota ensimmäinen Cerazette-tabletti kuukautistesi ensimmäisenä päivänä.

Sinun ei tarvitse käyttää lisäehkäisyä.

Voit myös aloittaa päivänä 2-5 kuukautistesi aikana, mutta tässä tapauksessa sinun tulee käyttää lisäehkäisyä (kondomi) ensimmäisten 7 päivän ajan tablettien käytön aikana. Vaihdossa yhdistelmätableteista, emätinrenkaasta tai transdermaalisesta laastarista: käytä ehkäisyvälinettä (kondomia) ensimmäisten 7 tabletin käyttöpäivän aikana.

Siirryt yhdistelmätableteista, emätinrenkaasta tai transdermaalisesta laastarista:

Aloita Cerazette seuraavana päivänä sen jälkeen, kun olet ottanut viimeisen tabletin nykyisestä pilleriliuskastasi tai päivänä, jolloin poistat emätinrenkaan tai laastarin (ilman tabletti-, rengas- tai laastarivapaata jaksoa). Jos nykyisessä pilleriliuskassasi on myös lumetabletteja (ilman hormoneja), aloita Cerazette seuraavana päivänä sen jälkeen, kun olet ottanut viimeisen vaikuttavan tabletin (jos et ole varma, mikä se on, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista). Sinun ei tarvitse käyttää lisäehkäisyä, jos noudatat näitä ohjeita.

Voit myös aloittaa viimeistään päivänä tabletti-, rengas- tai laastarivapaan jakson tai lumetablettijakson jälkeen nykyisestä ehkäisymenetelmästäsi. Jos noudatat näitä ohjeita, sinun on käytettävä lisäehkäisyä (kondomi) ensimmäisten 7 päivän ajan tablettien käytön aikana. tablettien käyttö.

Voit siirtyä suoraan Cerazetteen ilman lisäehkäisyä.

Siirtyminen injektiovalmisteesta, implantista tai hormonikierukasta:

Voit aloittaa Cerazetten käytön päivänä, jolloin seuraava injektio olisi annettava

tai päivänä, jolloin implantti tai hormonikierukka poistetaan. Sinun ei tarvitse käyttää lisäehkäisyä.

Synnytyksen jälkeen:

Aloita Cerazette 21-28 päivää synnytyksen jälkeen. Jos aloitat myöhemmin, sinun on

Synnytyksen jälkeen:

7 tablettia peräkkäin. Jos olet jo ollut yhdynnässä, sinun on ensimmäisen jakson aikana käyttää lisäehkäisyä (kondomia), kunnes olet ottanut 7 päivää peräkkäin jos olette jo olleet yhdynnässä, täytyy raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen kuin aloitat Cerazetten käytön.

Lisätietoja imettäville naisille löytyy kohdasta 'Raskaus ja imetys' kohdassa 2. Lääkärisi voi myös neuvoa sinua.

Keskenmenon tai abortin jälkeen:

Noudata lääkärin ohjeita.

Oletko unohtanut ottaa tätä lääkettä?

Jos olet alle 12 tuntia myöhässä tabletin ottamisessa, Cerazetten luotettavuus ei ole heikentynyt.

Ota unohtunut tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit taas tavalliseen aikaan. Jos olet yli 12 tuntia myöhässä tabletin ottamisessa, Cerazetten luotettavuus voi olla heikentynyt.

Mitä useampia tabletteja olet peräkkäin unohtanut, sitä suurempi on riski, että ehkäisyteho on heikentynyt. Ota viimeisin unohtunut tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit taas tavalliseen aikaan. Käytä myös seuraavien 7 päivän ajan tabletin ottamisesta kondomia. Jos olet unohtanut yhden tai useamman tabletin ensimmäisellä viikolla Jos sinulla on yksi tai sinun on otettava huomioon mahdollisuus ja sinä 7 päivää ennen on unohtanut yhdynnän, sinun on otettava huomioon riski raskaus. Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Mitä tehdä, jos sinulla on maha-suolikanavan häiriöitä (esimerkiksi oksentelu, vaikea ripuli)

Noudata yllä annettuja ohjeita tablettien unohtamisesta. Jos oksennat tai sinulla on vaikea ripuli 3-4 tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, on mahdollista, että vaikuttava aine ei imeydy täysin elimistöön.

Oletko ottanut liikaa tätä lääkettä?

Ei ole raportoitu vakavista haitallisista vaikutuksista, kun on otettu liikaa Cerazette-tabletteja kerralla. Saatat kokea pahoinvointia ja oksentelua. Nuorilla tytöillä voi esiintyä vähäistä verenvuotoa emättimestä. Lisätietoja varten kysy tarvittaessa lääkäriltäsi neuvoa.

Jos lopetat tämän lääkkeen ottamisen

Voit lopettaa Cerazetten käytön milloin haluat. Siitä päivästä lähtien, kun lopetat, et ole enää suojattu raskaudelta.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä koke.

Joitakin vakavia haittavaikutuksia, jotka liittyvät Cerazetten käyttöön, on kuvattu kohdassa 'Rintasyöpä' ja 'Tromboosi' kohdassa 2. Voit lukea tämän osan saadaksesi lisätietoja ja ota yhteyttä lääkäriisi, jos se on tarpeen. tietoa ja ota yhteyttä lääkäriisi tarvittaessa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos saat voimakkaan reaktion kehostasi vakavan allergian vuoksi. Saat yhtäkkiä: turvonneen kielen, turvonneet huulet, turvonneet kasvat ja/tai turvonneen kurkun (angioedeema). Sinulla voi olla hengitys- tai nielemisvaikeuksia (angioedeema ja/tai hengenvaarallinen allerginen reaktio). Tämä on hengenvaarallista

Cerazetten käytön aikana voi esiintyä epäsäännöllistä verenvuotoa emättimestä. Tämä voi rajoittua muutamaan tippaan, joihin ei edes tarvita pikkuhousunsuojaa tai voi esiintyä enemmän verenvuotoa, kuten kevyen kuukautisvuodon aikana, johon tarvitset siteen. On myös mahdollista, että verenvuodot jäävät kokonaan pois. Epäsäännölliset verenvuodot eivät ole merkki Cerazetten heikentyneestä suojasta raskaudelta. Yleensä sinun ei tarvitse tehdä mitään ja voit jatkaa Cerazetten ottamista. Jos verenvuoto on kuitenkin voimakasta tai pitkäkestoista, sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriisi.

Cerazetten käyttäjät ovat ilmoittaneet seuraavista haittavaikutuksista:

Yleinen: esiintyy alle 1 naisella 10:stä

- mielialan vaihtelut, masentunut mieliala, vähentynyt halu harrastaa seksiä (libido)
- päänsärky
- pahoinvointi
- finnit (akne)
- rintojen arkuus, et saa kuukautisia tai ne ovat epäsäännölliset
- painonnousu

Joskus: esiintyy alle 1 naisella 100:sta

emätintulehdus
silmien ärsytys piilolinssien käytön yhteydessä
oksentelu
hiustenlähtö
kipu kuukautisten aikana, munasarjakysta
väsymys

Harvoin: esiintyy alle 1 naisella 1000:sta

ihottuma, ihottuma vaaleanpunaisilla näppylöillä ja voimakas kutina (nokkosihottuma tai urtikaria), punainen turvotus ihon alla. Tämä johtuu rasvakudoksen turvotuksesta. Tämä on usein sääressä. Iho on kipeä (erythema nodosum)

Tuntematon: esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella allergiset reaktiot (yliherkkyys)

Näiden haittavaikutusten lisäksi voi esiintyä myös rintojen vuotoa.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Hollannin Haittavaikutuskeskus Larebille, verkkosivusto: www.lareb.nl. Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Se löytyy pakkauksesta EXP:n jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä.

Tälle lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysolosuhteita lämpötilan suhteen. Säilytä läpipainopakkaus alkuperäisessä pussissa valolta ja kosteudelta suojattuna. Käytä 1 kuukauden kuluessa pussin avaamisesta.

Vaikuttava aine aiheuttaa ympäristöriskin kaloille.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai wc:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekkariltasi, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti eikä niitä päästetä ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

- Tämän lääkkeen vaikuttava aine on desogestreeli (75 mikrogrammaa).
- Muut aineet tässä lääkkeessä ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, all-rac- α -tokoferoli, maissitärkkelys, povidoni, steariinihappo, hypromelloosi, makrogoli 400, talkki, titaanidioksidi (E171), laktoosimonohydraatti (katso myös 'Cerazette sisältää laktoosia' kohdassa 2).

Miltä Cerazette näyttää ja kuinka paljon pakkauksessa on?

Cerazette-läpipainopakkaus sisältää 28 valkoista, pyöreää kalvopäällysteistä tablettia. Toisella puolella tabletteja on merkintä 'KV' ja sen alla '2', ja toisella puolella on 'ORGANON*'. Jokainen pahvipakkaus sisältää 1, 3, 6 tai 13 läpipainopakkausta, jotka on pakattu erikseen pussiin.

Kaikkia mainittuja pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Alankomaat.

Puh.: 00800-66550123 (tai +32 2 241 81 00)

Sähköposti: dpoc.benelux@organon.com

Rekisteröity numerolla RVG 22743

Tämä lääke on rekisteröity EEA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Belgia, Tanska, Saksa, Suomi, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Itävalta,

Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi: Cerazette

Espanja: Cerazet

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty joulukuussa 2021.