

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui  
Cerazette, 75 mikrogramų plėvele dengtos tabletės  
desogestrelis

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame yra svarbios informacijos jums.

- Laikykite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Tai gali būti kenksminga kitiems.
- Ar pasireiškė kuri nors iš 4 skyriuje nurodytų šalutinių poveikių? Arba ar pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Cerazette ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Cerazette ir kam šis vaistas vartojamas?

Cerazette vartojamas nėštumui išvengti. Cerazette sudėtyje yra nedidelis kiekis vieno tipo moteriško lytinio hormono, progestageno desogestrelis. Todėl Cerazette taip pat vadinamas tik progestageno tablete. Tik progestageno tabletės – skirtingai nei kombinuotos tabletės – neturi estrogeno hormono šalia progestageno.

Daugumos tik progestageno tablečių veikimas pagrįstas tuo, kad jos neleidžia spermatozoidams patekti į gimdą. Kiaušialąstės brendimas ne visada yra sustabdomas. Pastarasis yra pagrindinis kombinuotos tabletės veikimas. Cerazette skiriasi nuo daugumos tik progestageno tablečių, nes dozė yra pakankamai didelė, kad daugeliu atvejų užkirstų kelią kiaušialąstės brendimui. Todėl Cerazette yra labai patikimas.

Skirtingai nei kombinuotos tabletės, Cerazette gali vartoti moterys, kurios netoleruoja estrogenų, ir moterys, maitinančios krūtimi. Cerazette trūkumas yra tas, kad mėnesinės iš makšties gali pasireikšti nereguliais intervalais. Taip pat yra tikimybė, kad šios mėnesinės visai nepasireikš.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kaip ir kitos hormoninės kontraceptinės priemonės, Cerazette neapsaugo nuo ŽIV infekcijos (AIDS) ar kitų lytiškai plintančių ligų (LPL).

Kada negalima vartoti šio vaisto?

- Esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.

- Jūs turite trombozę. Trombozė yra kraujo krešulio susidarymas kraujagyslėje (pavyzdžiui, kojoje (gilioji venų trombozė) arba plaučiuose (plaučių embolija)).
- Jūs turite gelta (odos pageltimas) arba sunkią kepenų ligą, arba turėjote tai ir jūsų kepenų funkcija dar nėra normali.
- Jūs turite vėžio formą, kuri yra jautri lytiniais hormonams, pavyzdžiui, kai kurios rūšys krūties vėžio, arba įtariama, kad tai turite.
- Jūs turite nepaaiškinamą kraujavimą iš makšties.

Pasakykite savo gydytojui prieš pradėdami vartoti Cerazette, jei kuri nors iš šių situacijų jums tinka. Jūsų gydytojas gali rekomenduoti nehormoninį gimstamumo kontrolės metodą. Nedelsdami susisieki su savo gydytoju, jei kuri nors iš šių situacijų atsiranda vartojant Cerazette. naudojamas.

Pasakykite savo gydytojui prieš pradėdami gydymą Cerazette, jei: Jūs kada nors turėjote krūties vėžį.

- Jūs turite kepenų vėžį, nes negalima atmesti galimo Cerazette poveikio.
- Jūs kada nors turėjote trombozę.
- Jūs turite cukrinį diabetą.
- Jūs turite epilepsiją (žr. skyrių 'Ar vartojate kitus vaistus?').
- Jūs turite tuberkuliozę (žr. skyrių 'Ar vartojate kitus vaistus?').
- Jūs turite aukštą kraujospūdį.
- Jūs turite aukštą kraujospūdį.
- Jei turite chloazmą arba kada nors jį turėjote (geltonai rudos pigmentinės dėmės ant odos, vadinamos 'nėštumo dėmėmis', ypač ant veido); jei taip yra, venkite tiesioginio saulės šviesos ar ultravioletinių spindulių poveikio.

Jei Cerazette vartojamas, kai turite vieną iš šių būklių, gali prireikti papildomos priežiūros. Jūsų gydytojas gali paaiškinti, ką turėtumėte daryti.

### Krūties vėžys

Svarbu reguliariai tikrinti savo krūtis ir nedelsiant susisiekti su savo gydytoju, jei jaučiate gumbelį krūtyse.

Moterims, kurios vartoja tabletes, krūties vėžys nustatomas šiek tiek dažniau nei toms, kurios nevarvoja tablečių to paties amžiaus. Kai moterys nustoja vartoti tabletes, rizika pamažu mažėja, todėl po 10 metų po nutraukimo ji yra tokia pati kaip moterims, kurios niekada naudojo. Krūties vėžys pasitaiko nustatytų krūties vėžio atvejų skaičius yra didesnis tarp moterų, kurios vartoja tabletes iki vyresnio amžiaus. Kiek laiko vartojamos tabletės yra mažiau svarbu. Iš kiekvienos 10 000 moterų, kurios 5 metus vartoja tabletes, bet nustoja, kai joms yra 20 metų, iki

10 metų po nutraukimo būtų nustatytas mažiau nei 1 papildomas krūties vėžio atvejis, be 4 atvejų, kurie paprastai nustatomi šioje amžiaus grupėje. Panašiai, iš kiekvienos 10 000 moterų, kurios 5 metus vartoja tabletes, bet nustoja, kai joms yra 30 metų, būtų nustatyti 5 papildomi krūties vėžio atvejai, be 44 atvejų, kurie paprastai nustatomi. krūties vėžio atvejų, be 44 atvejų, kurie paprastai nustatomi.

Prie 10 000 moterų, kurios 5 metus vartoja tabletes, bet nustoja, kai joms yra 40 metų, būtų 20 papildomų krūties vėžio atvejų, be 160 atvejų, kurie paprastai yra nustatomi. Manoma, kad krūties vėžio rizika vartojant tik progestageno tabletes, tokias kaip Cerazette, yra panaši į riziką vartojant kombinuotąsias tabletes, tačiau įrodymai, tam yra mažiau įtikinami.

Krūties vėžio atvejai, rasti tarp tablečių vartotojų, dažniau yra mažiau pažengę nei tie, kurie randami tarp ne tablečių vartotojų. Nežinoma, ar skirtumą krūties vėžio rizikoje sukelia tabletės. Taip pat gali būti, kad tablečių vartotojos dažniau tiriamos, todėl krūties vėžys anksčiau aptinkamas. Trombozė

#### Trombozė

Trombozė yra kraujo krešulio susidarymas, dėl kurio gali būti užblokuotas kraujagyslė.

Trombozė kartais atsiranda vienoje iš giliai esančių kojos venų (giliųjų venų trombozė). Jei

krešulys atsiskiria, jis gali patekti į plaučių arterijas ir ten užblokuoti kraujagyslę (plaučių embolija). Tai kartais gali būti mirtina. Giliųjų venų trombozė retai pasitaiko. Ji gali pasireikšti tiek tablečių vartotojoms, tiek ne tablečių vartotojoms. Ji taip pat gali pasireikšti nėštumo metu plaučių embolija). Tai kartais gali baigtis mirtimi. Giliųjų venų trombozė pasitaiko retai. Tai gali atsirasti pas gali pasireikšti tiek vartojančioms, tiek nevartojančioms tablečių. Tai taip pat gali pasireikšti per nėštumas.

Trombozės rizika vartojant kombinuotąsias kontraceptines tabletes yra didesnė nei nevartojant tablečių. Rizika vartojant tik progestageno tabletes, tokias kaip Cerazette, laikoma mažesne nei vartojant kombinuotąsias tabletes, kurios taip pat turi estrogenų.

#### Psichikos sutrikimai

Kai kurios moterys, vartojančios hormoninius kontraceptikus, įskaitant Cerazette, pranešė apie depresiją ar prislėgtumą. Depresija gali būti sunki ir kartais gali sukelti savižudybės mintis. Jei patiriate nuotaikos svyravimus ir depresijos simptomus, kreipkitės kuo greičiau į savo gydytoją dėl tolesnės medicininės konsultacijos. Vaikai ir paaugliai iki 18 metų

Nėra tyrimų informacijos apie veiksmingumą ir saugumą jaunesniems nei 18 metų paaugliams. Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus ar vaistažoles be Cerazette, ar neseniai tai darėte, ar yra galimybė, kad artimiausiu metu vartosite kitus vaistus? Praneškite apie tai savo gydytojui ar vaistininkui. Taip pat praneškite bet kuriam kitam gydytojui ar odontologui, kuris jums skiria kitą vaistą (arba jūsų vaistininkui), kad vartojate Cerazette. Jie gali jums pasakyti, ar jums reikia imtis papildomų kontraceptinių priemonių (pavyzdžiui, prezervatyvų) ir kiek laiko, arba ar reikia keisti kitų jūsų vartojamų vaistų vartojimą. kontraceptines priemones (pavyzdžiui, prezervatyvus) turi naudoti ir kiek laiko, arba ar naudojimas turi būti pakeistas jūsų kitas vaistas.

#### Kai kurie vaistai

gali turėti įtakos Cerazette kraujo lygiui

gali padaryti Cerazette mažiau veiksmingą nėštumo prevencijai

gali sukelti netikėtą kraujavimą.

Tai apima vaistus, skirtus gydyti:

epilepsiją (pavyzdžiui, primidonas, fenitoinas, karbamazepinas, okskarbazepinas, felbamatas, topiramatas ir fenobarbitalis)  
tuberkuliozę (pavyzdžiui, rifampicinas, rifabutinas)  
ŽIV infekcijas (pavyzdžiui, ritonaviras, nelfinaviras, nevirapinas, efavirencas)  
hepatito C viruso infekciją (pavyzdžiui, bocepreviras, telapreviras)  
kitas infekcines ligas (pavyzdžiui, grizeofulvinas)  
aukštą kraujospūdį plaučių kraujagyslėse (bosentanas)  
depresines nuotaikas (žolelių preparatas jonažolė)  
tam tikras bakterines infekcijas (pavyzdžiui, klaritromicinas, eritromicinas)  
grybelines infekcijas (pavyzdžiui, ketokonazolas, itrakonazolas, flukonazolas)  
aukštą kraujospūdį (hipertenziją), anginą ar tam tikrus širdies ritmo sutrikimus (pavyzdžiui, diltiazemą).

Jei vartojate vaistus ar žolelių preparatus, kurie gali padaryti Cerazette mažiau veiksmingą, turite naudoti ir barjerinį kontracepcijos metodą. Kadangi kito vaisto poveikis Cerazette gali tęstis iki 28 dienų po to vaisto vartojimo nutraukimo, turite tą papildomą barjerinį kontracepcijos metodą naudoti per tą laiką. Jūsų gydytojas gali jums pasakyti, ar ir kiek laiko turėtumėte naudoti papildomas kontracepcijos priemones.

Cerazette taip pat gali paveikti kitų vaistų veikimą ir sustiprinti jų poveikį (pavyzdžiui, vaistų su ciklosporinu) arba sumažinti (pavyzdžiui, lamotrigino).

Prieš vartodami vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas ir žindymas

Nėštumas

Nevartokite Cerazette, jei esate nėščia arba manote, kad galite būti nėščia.

Žindymas

Cerazette galima vartoti, kai maitinate krūtimi. Cerazette, atrodo, neturi įtakos motinos pieno gamybai ar kokybei. Tačiau yra keletas pranešimų apie pieno gamybos sumažėjimą vartojant Cerazette. Nedidelis kiekis Cerazette veikliosios medžiagos patenka į motinos pieną.

Vaikų, kurie 7 mėnesius buvo maitinami krūtimi, o jų motinos vartojo Cerazette, sveikata buvo tirama 2,5 metų. Nepastebėta jokie poveikio vaikų augimui ar vystymuisi. vaikai matyti.

Vairavimas ir mechanizmų naudojimas

Nėra įrodymų, kad Cerazette vartojimas paveiktų koncentraciją ir reakcijos greitį.

Cerazette sudėtyje yra laktozės paveiktas.

Cerazette sudėtyje yra laktozės

Prieš pradėdami vartoti Cerazette, pasitarkite su savo gydytoju, jei gydytojas jums pasakė, kad netoleruojate tam tikrų cukrų.

Reguliarus stebėjimas

Jūsų gydytojas gali rekomenduoti reguliariai susitarti dėl medicininės apžiūros, jei vartojate Cerazette. Kaip dažnai turite grįžti apžiūrai ir kokie tyrimai bus atliekami, priklauso nuo jūsų asmeninės situacijos. grįžti ir kokie tyrimai tada atliekami.

Kuo greičiau susisieki su savo gydytoju šiais atvejais:

- jei jaučiate stiprų skausmą ar patinimą vienoje iš kojų, nepaaiškinamą krūtinės skausmą, dusulį,
- staigų neįprastą kosulį, ypač jei tai susiję su kraujo atkosėjimu (tai gali rodyti trombozę)
- jei jaučiate staigų, stiprų pilvo skausmą ar gelta (tai gali rodyti kepenų problemas)
- jei pastebite gumbelį krūtyje (tai gali rodyti krūties vėžį)
- jei jaučiate staigų, stiprų skausmą apatinėje pilvo dalyje ar skrandžio srityje (tai gali rodyti neįprastą nėštumą)
- mažiausiai keturias savaites prieš operaciją arba kai esate priversti ilgai gulėti arba negalite vaikščioti
- jei pastebite nepaaiškinamą, stiprų ir nuolatinį kraujavimą iš makšties
- jei įtariate, kad galite būti nėščia.

### 3. Kaip vartoti šį vaistą?

Kada ir kaip vartoti tabletes?

Cerazette juostelėje yra 28 tabletės. Juostelės priekyje, tarp tablečių, matote rodykles. Folijoje ant nugarėlės yra savaitės dienos. Kiekvienai dienai priklauso viena tabletė. Pradėkite kiekvieną naują juostelę nuo tabletės iš viršutinės eilės. Įsitinkinkite, kad pradėsite nuo tinkamos tabletės. Pavyzdžiui, jei pradėsite trečiadienį, paimkite tabletę iš viršutinės eilės, kur (ant nugarėlės) parašyta TR. Sekite rodyklių kryptį ir kasdien vartokite po tabletę, kol juostelė bus tuščia. Ant juostelės nugarėlės galite lengvai pamatyti, ar jau išgėrėte savo kasdienę tabletę.

Vartokite tabletes kasdien maždaug tuo pačiu metu, užgerdami vandeniu, nekramtydami. Vartojant Cerazette galite patirti kraujavimą, primenantį menstruacijas, tačiau turite toliau vartoti tabletes. Kai juostelė bus tuščia, kitą dieną iš karto pradėkite naują Cerazette juostelę - be pertraukos ir nelaukdami kraujavimo. Kada pradėti pirmąją Cerazette juostelę? Praėjusį mėnesį nevartojote kontraceptinių tablečių:

Palaukite menstruacijų. Pirmąją Cerazette tabletę išgerkite pirmąją menstruacijų dieną.

Tuomet nereikės naudoti papildomų apsaugos priemonių.

Taip pat galite pradėti 2-5 menstruacijų dieną, tačiau tokiu atveju turite naudoti papildomą apsaugos priemonę (prezervatyvą) per pirmąsias 7 tablečių vartojimo dienas. Pereinate nuo kombinuotų tablečių, makšties žiedo ar transderminio pleistro: naudoti kontraceptiką (prezervatyvą) per pirmąsias 7 tablečių vartojimo dienas.

Jūs pereinate nuo kombinuotosios tabletės, makšties žiedo ar transderminio pleistro:

Pradėkite vartoti Cerazette kitą dieną po to, kai išgersite paskutinę dabartinės piliulės juostelės tabletę arba tą dieną, kai pašalinsite makšties žiedą ar pleistrą (taigi be tabletės, žiedo ar pleistro pertraukos). Jei jūsų dabartinėje piliulės juostelėje taip pat yra placebinių tablečių (be hormonų), turite pradėti vartoti Cerazette kitą dieną po to, kai išgersite paskutinę veikliąją tabletę (jei nesate

tikri, kuri tai yra, pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku). Jums nereikia naudoti papildomos kontracepcijos, jei laikotės šių nurodymų.

Taip pat galite pradėti ne vėliau kaip kitą dieną po jūsų dabartinės kontracepcijos tabletės, žiedo ar pleistro pertraukos arba placebinių tablečių laikotarpio. Jei laikotės šių nurodymų, turite naudoti papildomą kontracepciją (prezervatyvą) pirmąsias 7 dienas, kai vartojate tabletes.

Pereinate nuo kitos tik progestageno turinčios piliulės:  
Galite pereiti prie Cerazette kitą dieną ir nereikia naudoti papildomos kontracepcijos.

Pereinate nuo injekcinio preparato, implanto ar hormoninės spiralinės:  
Galite pradėti vartoti Cerazette tą dieną, kai turėtų būti atlikta kita injekcija arba tą dieną, kai pašalinamas jūsų implantas ar hormoninė spiralinė. Jums nereikia naudoti papildomos kontracepcijos.

Po gimdymo:

Pradėkite vartoti Cerazette tarp 21 ir 28 dienos po gimdymo. Jei pradėsite vėliau, pirmojo ciklo metu turite naudoti papildomą kontracepciją (prezervatyvą), kol 7 dienas iš eilės išgersite tabletes. Jei jau turėjote lytinių santykių, turite jūs jau išgėrėte tabletes. Jei jau turėjote lytinių santykių, turite nėštumas turi būti atmestas prieš pradėdant vartoti Cerazette. Papildoma informacija moterims, maitinančioms krūtimi, galima rasti skyriuje „Nėštumas ir žindymas“ 2 skyriuje. Jūsų gydytojas taip pat gali patarti.

Po persileidimo ar aborto:  
Laikykitės gydytojo patarimų.

Pamiršote išgerti šį vaistą?

Jei pavėlavote išgerti tabletes mažiau nei 12 valandų, Cerazette patikimumas nesumažėjo. Išgerkite pamirštą tabletes, kai tik prisiminsite, ir toliau vartokite kitas tabletes įprastu laiku.

Jei pavėlavote išgerti tabletes daugiau nei 12 valandų, Cerazette patikimumas gali būti sumažėjęs. Kuo daugiau tablečių iš eilės pamiršote, tuo didesnė tikimybė, kad kontraceptinis poveikis sumažėjo. Išgerkite paskutinę pamirštą tabletes, kai tik prisiminsite, ir toliau vartokite kitas tabletes įprastu laiku. Naudokite taip pat per pirmąsias 7 dienas nuo tablečių vartojimo pradžios prezervatyvą. Jei pamiršote vieną ar kelias tabletes pirmąją juostelės savaitę ir per 7 dienas prieš pamiršimą turėjote lytinių santykių, turite atsižvelgti į galimybę nėštumas. Pasitarkite su savo gydytoju.

Ką daryti, jei turite virškinimo trakto sutrikimų (pavyzdžiui, vėmimas, stiprus viduriavimas)

Laikykitės aukščiau pateiktų nurodymų dėl pamirštų tablečių. Jei per 3-4 valandas po tabletės išgėrimo turite vemti arba stipriai viduriuojate, yra tikimybė, kad veiklioji medžiaga nebus visiškai absorbuota organizme.

Ar išgėrėte per daug šio vaisto?

Nėra pranešimų apie rimtus žalingus padarinius po per didelio Cerazette tablečių kiekio išgėrimo vienu metu. Galite jausti pykinimą ir vėmimą. Jaunoms mergaitėms gali pasireikšti nedidelis kraujavimas iš makšties. Dėl daugiau informacijos, pasitarkite su savo gydytoju. patarti.

Jei nustosite vartoti šį vaistą

Galite nustoti vartoti Cerazette, kada tik norite. Nuo tos dienos, kai nustosite, nebebūsate apsaugoti nuo nėštumo.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Tada susisiekiite su savo gydytoju ar vaistininku.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinį poveikį, nors ne visi jį patiria. padaryti.

aprašyti skyriuose „Krūtis vėžys“ ir „Trombozė“ 2 skyriuje. Galite perskaityti šią dalį dėl daugiau informacijos ir susisiekti su savo gydytoju, jei tai būtina. informacija ir, jei reikia, kreipkitės į savo gydytoją.

Nedelsiant susisiekiite su savo gydytoju, jei jūsų kūnas smarkiai reaguoja dėl stiprios alergijos. Jums staiga atsiranda: patinęs liežuvis, patinusios lūpos, patinęs veidas ir/ar patinusi gerklė (angioedema). Jums gali būti sunku kvėpuoti ar ryti (angioedema ir/ar gyvybei pavojinga alerginė reakcija). Tai yra gyvybei pavojinga

Vartojant Cerazette, gali pasireikšti nereguliarus kraujavimas iš makšties. Tai gali apsiriboti keliais lašais, kuriems net nereikia įkloto, arba gali būti daugiau kraujavimo, kaip lengvos mėnesinės, kurioms reikia higieninio įkloto. Taip pat yra tikimybė, kad kraujavimas visai nepasireikš.

Nereguliarus kraujavimas nėra Cerazette apsaugos nuo nėštumo sumažėjimo požymis. Paprastai jums nereikia nieko daryti ir galite toliau vartoti Cerazette. Tačiau, jei kraujavimas yra stiprus ar ilgalaikis, turite susisiekti su savo gydytoju. su savo gydytoju.

Dažnai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 moterų  
nuotaikos svyravimai, prislėgta nuotaika, sumažėjęs lytinis potraukis (libido)

galvos skausmas

pykinimas

spuogai (aknė)

spuogai (acne)

skausmingos krūtys, jūs nesate arba nereguliariai menstruuojate

svorio padidėjimas

Kartais: pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 moterų

makšties infekcija

akių dirginimas naudojant kontaktinius lęšius

vėmimas

plaukų slinkimas

skausmas menstruacijų metu, kiaušidžių cista

nuovargis

Retai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 moterų

odos bėrimas, bėrimas su rausvais gumbeliais ir stipriu niežuliu (dilgėlinė ar urtikarija), raudona patinimas po oda. Tai sukelia riebalinio audinio patinimas. Dažnai būna ant jūsų apatinės kojos. Oda skauda (mazginė eritema)

Nežinoma: dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis  
alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas)

Be šių šalutinių poveikių, gali pasireikšti ir išskyros iš krūties.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį per Nyderlandų Šalutinių Poveikių Centrą Lareb, svetainė: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės po EXP. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra tinkamumo laiko pabaiga.

Šiam vaistui nėra specialių laikymo sąlygų dėl temperatūros. Laikyti lizdinę plokštelę originalioje pakuotėje, kad būtų apsaugota nuo šviesos ir drėgmės. Naudoti per 1 mėnesį po pirmojo pakuotės atidarymo.

Veiklioji medžiaga kelia pavojų žuvims aplinkoje.

Neleiskite vaistų į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebenaudojate. Jie bus sunaikinti atsakingu būdu ir nepateks į aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra desogestrelis (75 mikrogramai).
- Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra bevandenis koloidinis silicio dioksidas, all-rac- $\alpha$ -tokoferolis, kukurūzų krakmolos, povidonas, stearino rūgštis, hipromeliozė, makrogolis 400, talkas, titano dioksidas (E171), laktozės monohidratas (taip pat žr. 'Cerazette sudėtyje yra laktozės' 2 skyriuje).

Kaip atrodo Cerazette ir kiek jų yra pakuotėje?

Cerazette lizdinėje plokštelėje yra 28 baltos, apvalios plėvele dengtos tabletės. Vienoje pusėje tablečių yra įspausta „KV“ su skaičiumi „2“ po juo, o kitoje pusėje yra „ORGANON\*“. Kiekvienoje kartoninėje dėžutėje yra 1, 3, 6 arba 13 lizdinių plokštelių, kurios kiekviena atskirai supakuota į maišelį.

Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra pateikiami į rinką.

Leidimo prekiauti turėtojas ir gamintojas  
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nyderlandai.  
Tel.: 00800-66550123 (arba +32 2 241 81 00)  
El. paštas: dpoc.benelux@organon.com

Registruota registre su RVG 22743

Šis vaistas yra registruotas EEE valstybėse narėse šiais pavadinimais:  
Belgija, Danija, Vokietija, Suomija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija,  
Austrija, Portugalija, Jungtinė Karalystė, Švedija: Cerazette  
Ispanija: Cerazet

Ši pakuotės lapelė paskutinį kartą patvirtinta 2021 m. gruodžio mėn.