

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Avloclor® 250 mg Tabletten

Chloroquinphosphat

Lesen Sie alle bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, da sie wichtige Informationen für Sie enthält.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage oder nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. hat Ihnen gesagt.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht: Wirkungen, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind. Siehe Abschnitt 4.

Avloclor

1. ist und wofür es angewendet wird Was Sie vor der Einnahme von Avloclor
2. wissen müssen Avloclor
3. Wie man einnimmt Avloclor
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie man aufbewahrt Avloclor
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was Avloclor ist und wofür es angewendet wird

Avloclor enthält ein Arzneimittel namens Chloroquinphosphat. Dieses gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als ‚Anti-malarika‘ bezeichnet werden.

‚Anti-malarika‘ können in bestimmten Teilen der Welt eingenommen werden, um Malaria vorzubeugen. Dies ist eine ernste Krankheit, die durch infizierte Mücken übertragen wird. Avloclor bietet einen gewissen Schutz (Prophylaxe) gegen Malaria in bestimmten Ländern.

Medikamente zur Vorbeugung von Malaria (Malariaphylaxe) werden empfohlen für:

- Personen, die in Länder reisen, in denen Malaria vorkommt.
- Personen, die in Malariagebieten leben und nicht immun gegen Malaria sind.

Diese Personen haben wenig oder keine Immunität gegen Malaria und sind daher einem Risiko schwerer Anfälle ausgesetzt.

Sie müssen sich ärztlich beraten lassen, welche Anti-Malaria-Medikamente Sie einnehmen sollen. Sie müssen

Ihren Arzt oder Apotheker fragen, ob Avloclor für den Teil der Welt geeignet ist, den Sie besuchen. In einigen Ländern müssen Sie Avloclor mit einem anderen Medikament einnehmen, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

Vermeidung von Mückenstichen

Wenn Sie dieses Medikament zur Vorbeugung von Malaria einnehmen, sollten Sie auch die Wahrscheinlichkeit verringern, von Mücken gestochen zu werden.

- Tragen Sie helle, langärmelige Kleidung und lange Hosen, wenn Sie nach Sonnenuntergang.
- Verwenden Sie Insektenschutzcremes oder -sprays auf Körperteilen, die nicht von Kleidung bedeckt sind.
- Schlafen Sie in einem ordnungsgemäß abgeschirmten Raum oder unter einem Moskitonetz.
- Sprühen Sie, um alle Mücken zu töten, die in die Räume eingedrungen sein könnten trotz der Abschirmung.

Anzeichen von Malaria

Kein Medikament kann garantieren, in jedem Fall vor Malaria zu schützen. Wenn Sie während Ihres Besuchs in einem Malariagebiet oder bis zu einem Jahr nach Ihrer Rückkehr nach Hause hohes Fieber (Temperatur) haben, sollten Sie Malaria vermuten. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt und informieren Sie ihn oder sie darüber, dass Sie ein Malariagebiet besucht haben.

2. Was Sie wissen müssen, bevor Sie

Avloclor einnehmen

Nehmen Sie Avloclor nicht ein, wenn:

- Sie allergisch gegen Chloroquinphosphat oder einen der anderen Bestandteile von Avloclor sind (siehe Abschnitt 6: Inhalt der Packung und weitere Informationen).
- Sie ein Medikament namens Amiodaron einnehmen (zur Kontrolle der Herzfrequenz). Avloclor kann das Risiko unregelmäßiger Herzschläge (Herzrhythmusstörungen) erhöhen, wenn es gleichzeitig mit Amiodaron eingenommen wird. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Ihr Medikament einnehmen, wenn: Sie jemals Epilepsie, Krampfanfälle oder Anfälle hatten.

- Sie jemals Probleme mit Ihrer Leber oder Ihren Nieren hatten.
- Ihnen jemals gesagt wurde, dass Sie eine seltene Erkrankung des Blutfarbstoffs namens ‚Porphyrrie‘ haben oder jemand in Ihrer Familie sie hat. Dies liegt daran, dass Avloclor schwere kann schwere verursachen Sie eine schuppige Hauterkrankung namens Psoriasis haben.
- Sie ein Muskelproblem namens ‚Myasthenia gravis‘ haben.
- Avloclor kann die kann erhöhen die Erkrankung (Neostigmin und Pyridostigmin) verringern. Sie ein Blutproblem namens ‚Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel‘ haben.
- Sie haben ein Blutproblem namens ‚Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel‘.

Avloclor kann bei Menschen mit dieser Blutkrankheit Blutzellen schädigen.

Chloroquin kann den Blutzuckerspiegel senken. Bitte bitten Sie Ihren Arzt, Sie über Anzeichen und Symptome eines niedrigen Blutzuckerspiegels zu informieren. Eine Überprüfung des Blutzuckerspiegels kann notwendig sein.

Chloroquin kann bei einigen Patienten Herzrhythmusstörungen verursachen: Vorsicht ist geboten bei der Anwendung von Chloroquin, wenn Sie mit einem verlängerten QT-Intervall geboren wurden oder eine familiäre Vorgeschichte davon haben, wenn Sie eine erworbene QT-Verlängerung haben (sichtbar im EKG, elektrische Aufzeichnung des Herzens), wenn Sie Herzerkrankungen haben oder eine Vorgeschichte von Herzinfarkt (Myokardinfarkt) haben, wenn Sie ein Salzungleichgewicht im Blut haben (insbesondere niedriger Kalium- oder Magnesiumspiegel, siehe Abschnitt „Andere Medikamente und Avloclor“).

Wenn Sie während der Behandlungszeit Herzklopfen oder unregelmäßigen Herzschlag erleben, sollten Sie sofort Ihren Arzt informieren. Das Risiko von Herzproblemen kann mit der Erhöhung der Dosis steigen. Daher sollte die empfohlene Dosierung eingehalten werden.

Einige Menschen, die mit Chloroquin behandelt werden, können psychische Probleme wie irrationale Gedanken, Halluzinationen, Verwirrtheit, Aggressivität, Paranoia, depressive Verstimmungen oder Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid haben, auch wenn Sie zuvor nie ähnliche Probleme hatten. Wenn Sie oder andere um Sie herum, eines dieser Nebenwirkungen bemerken (siehe Abschnitt 4), suchen Sie sofort medizinischen Rat.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Avloclor.

Wenn Sie ins Krankenhaus gehen, informieren Sie das medizinische Personal, dass Sie Avloclor.

Wenn Sie in einem Land leben, in dem Malaria vorkommt, sind Sie möglicherweise bereits leicht immun gegen die Krankheit. Sie müssen einen Arzt oder Apotheker um Rat fragen, bevor Sie Anti-Malaria-Medikamente einnehmen.

Andere Medikamente und Avloclor

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Medikamente einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder einnehmen könnten. Dies schließt Medikamente ein, die Sie ohne Rezept kaufen, sowie pflanzliche Medikamente.

Amiodaron (zur Kontrolle der Herzfrequenz) darf nicht gleichzeitig mit Avloclor eingenommen werden (siehe Abschnitt 2: Was Sie wissen müssen, bevor Sie Avloclor einnehmen).

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden Medikamente einnehmen. Dies ist weil Avloclor die Menge dieser Medikamente in Ihrem Blut beeinflussen kann.

- Praziquantel (wird zur Behandlung von Infektionen des Darms und der Blase durch Parasiten verwendet).
- Ciclosporin (wird hauptsächlich von Transplantationspatienten verwendet, aber auch zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und Psoriasis eingesetzt).
- Antikonvulsiva (werden zur Verhinderung von Krampfanfällen oder Anfällen verwendet).
- Digoxin (wird zur Behandlung von Herzproblemen verwendet).

Informieren Sie auch Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden Medikamente einnehmen:

- Medikamente, die den Herzrhythmus beeinflussen. Dazu gehören Medikamente gegen abnormen Herzrhythmus (Antiarrhythmika), gegen Depressionen (trizyklische Antidepressiva) gegen psychische Störungen (Antipsychotika), gegen bakterielle Infektionen oder gegen Malaria (z.B. Halofantrin).
- Azithromycin, Clarithromycin oder Erythromycin (Antibiotika zur Behandlung von Infektionen). Die gleichzeitige Einnahme dieser Medikamente mit Chloroquin kann das Risiko erhöhen, Nebenwirkungen zu bekommen, die Ihr Herz betreffen.
- Mefloquin (zur Vorbeugung von Malaria eingenommen) kann das Risiko von Krampfanfällen oder Anfällen erhöhen, wenn es gleichzeitig mit Avloclor.
- Medikamente zur Behandlung von Epilepsie, da Avloclor ihre Wirksamkeit verringern kann.
- Agalsidase (zur Behandlung der Fabry-Krankheit), da Avloclor seine Aktivität verringern kann.
- Cimetidin (zur Behandlung von Magenproblemen). Dieses Medikament beeinflusst, wie Avloclor in Ihrem Körper abgebaut wird und kann die Menge von Avloclor in Ihrem Blut beeinflussen. in Ihrem Blut.
- Levothyroxin (Schilddrüsenmedikament).
- Medikamente wie Kaolin (verwendet bei Durchfall) die als 'Adsorbentien'.
- Antazida (Aluminium, Calcium- und Magnesiumsalze, die zur Behandlung von Sodbrennen oder Verdauungsstörungen verwendet werden).

Adsorbentien und Antazida können die Menge an Avloclor reduzieren, die aus Ihrem Darm aufgenommen wird. Dies kann bedeuten, dass die volle Dosis von Avloclor nicht in Ihren Körper aufgenommen wird und es nicht richtig wirkt. Daher sollten Sie diese Medikamente mindestens vier Stunden vor oder nach der Einnahme Ihrer Avloclor Dosis einnehmen.

Einige Medikamente (zum Beispiel Ciprofloxacin, Cimetidin, Omeprazol, Pyrimethamin) können die Menge von Avloclor in Ihrem Körper erhöhen und dies kann Nebenwirkungen verursachen. Es ist wichtig, dass Sie keine zusätzlichen Medikamente (weder verschriebene noch nicht verschriebene) einnehmen, bevor Sie mit Ihrem Arzt sprechen.

Wenn Sie eine Impfung gegen Tollwut benötigen, stellen Sie sicher, dass Sie diese erhalten, bevor Sie mit Ihrer Anti-Malaria-Medikation beginnen. Wenn Sie Ihre Tollwutimpfung gleichzeitig mit der Einnahme Ihrer Anti-Malaria-Medikation erhalten, könnte Ihr Tollwutimpfstoff nicht so gut wirken.

Schwangerschaft

Wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden könnten, sprechen Sie mit einem Arzt oder Apotheker:

- bevor Sie Avloclor einnehmen,
- bevor Sie ein Medikament zur Malariaprophylaxe einnehmen,
- und bevor Sie in ein Land reisen, in dem Malaria vorkommt.

Stillzeit

- Wenn Sie stillen, sprechen Sie mit einem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Avloclor.

- Obwohl Avloclor geht in die Muttermilch über, die Menge reicht jedoch nicht aus, um Ihr Baby vor Malaria zu schützen. Daher muss Ihrem Baby weiterhin ein Antimalariamittel verabreicht werden. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, der Ihnen Ratschläge geben kann.

Fahren und Bedienen von Maschinen

Manchmal Avloclor verursacht verschwommenes Sehen oder erschwert das Fokussieren der Augen. Wenn dies bei Ihnen auftritt, dürfen Sie nicht fahren oder Werkzeuge oder Maschinen bedienen.

3. Wie ist Avloclor

Immer einnehmen Avloclor einzunehmen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wann Sie mit der Einnahme Ihres Medikaments beginnen sollten

Beginnen Sie mit der Einnahme dieses Medikaments eine Woche bevor Sie in das Malariagebiet einreisen.

- Sie müssen es während Ihres Aufenthalts weiter einnehmen.
- Sie müssen dieses Medikament 4 Wochen nach Verlassen des Malariagebiets weiter einnehmen.
- Erwachsene und Kinder über 14 Jahre

Erwachsene und Kinder über 14 Jahre

- Nehmen Sie zwei Avloclor Tabletten einmal pro Woche am selben Tag jeder Woche.

Ältere Menschen

- Wenn Sie eine ältere Person sind, kann Ihr Arzt vorschlagen, dass Sie Bluttests durchführen lassen. Ihr Arzt
- kann auch entscheiden, Ihnen eine andere Dosis zu geben.

Kinder

Geben Sie Avloclor nicht an Kinder unter 1 Jahr. Für Kinder über 1 Jahr hängt die Dosis vom Alter des Kindes ab.

- Alter 1 bis 4 Jahre: Nehmen Sie eine halbe Avloclor Tablette einmal pro Woche (am selben Tag jeder Woche).
- Alter 5 bis 8 Jahre: Nehmen Sie eine Avloclor Tablette einmal pro Woche (am selben Tag jeder Woche).
- Alter 9 bis 14 Jahre: Nehmen Sie anderthalb Avloclor Tabletten einmal pro Woche (am selben Tag jede Woche).

Wie Sie Ihre Tabletten einnehmen

- Nehmen Sie die Tablette(n) nach dem Essen ein.
- Schlucken Sie die Tablette(n) oder Teildabletten ganz mit einem Glas Wasser.

Wenn Sie mehr Avloclor Tabletten einnehmen, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich mehr Avloclor Tabletten einnehmen, als Sie sollten, informieren Sie sofort einen Arzt. Die folgenden Effekte können auftreten: Herzprobleme – führend zu unregelmäßigen Herzschlägen.

Wenn Sie vergessen, Ihre Avloclor Tabletten einzunehmen

- Wenn Sie eine Dosis von Avloclor vergessen haben, nehmen Sie sie ein, sobald Sie sich erinnern.
- Warten Sie dann 7 Tage, bevor Sie die nächste Dosis von Avloclor.
- Nehmen Sie Ihre Avloclor Tabletten jede Woche an diesem neuen Wochentag weiter ein.

Das Absetzen von Avloclor

Setzen Sie Avloclor nur vier Wochen nach Verlassen des Malariagebiets ab oder wenn Ihr Arzt es Ihnen sagt

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Produkts haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann Avloclor Nebenwirkungen verursachen, obwohl nicht jeder sie bekommt.

Schwere Nebenwirkungen

Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, setzen Sie Avloclor ab und suchen Sie medizinische

Hilfe holen oder sofort Ihren Arzt kontaktieren.

- Allergische Reaktionen einschließlich Atembeschwerden, Schwellungen im Gesicht, an den Lippen, der Zunge oder im Rachen was zu Schluckbeschwerden und einem juckenden Ausschlag führen kann (ähnlich wie Nesselausschlag oder Nesselsucht)
- Ein schwerer Ausschlag mit Blasen oder Abschälen der Haut und möglicherweise Blasen im Mund und Nase.
- Dinge sehen, fühlen oder hören, die nicht da sind (Halluzinationen) (selten).
- Herzmuskelkrankheit (Kardiomyopathie), die im Falle von hochdosierter langfristiger Anwendung tödlich sein kann. Siehe Abschnitt 2, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen (selten).
- Abnormer Herzrhythmus, lebensbedrohliche unregelmäßige Herzrhythmen (auf dem EKG sichtbar). Siehe Abschnitt 2, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen (Häufigkeit unbekannt).
- Leberprobleme, die eine Gelbfärbung Ihrer Haut oder des Weißen Ihrer Augen verursachen können. Wenn Sie Avloclor über einen längeren Zeitraum einnehmen, kann Ihr Arzt vorschlagen, dass Sie Bluttests durchführen lassen um zu überprüfen, wie gut Ihre Leber funktioniert (selten).
- Entzündung der Lungen, die zu einer als diffuse parenchymale Lungenerkrankung bekannten Erkrankung führt.

Wenn Sie ernsthafte Atemnot entwickeln oder sich die Atemnot verschlimmert, Beratung.

- Rat.
- Krämpfe oder Anfälle.
- Teilweiser oder vollständiger Verlust des Sehvermögens. Sehkraft.
- Sehvermögen führen. Ein durch das Medikament verursachter Ausschlag, der mit einer Zunahme der Anzahl weißer Blut bemerkbar sind einige oder einige oder alle der folgenden Symptome bemerkbar sind: ein Hautausschlag und Fieber, Schwellung des Gesichts, empfindliche, allgemein geschwollene oder vergrößerte Lymphknoten oder andere Symptome, die auf die Beteiligung anderer Körperorgane einschließlich der Leber, Niere oder Lunge hindeuten (wie Gelbfärbung der Haut oder Augen, Harnprobleme, Atemnot).
- Eine verringerte Anzahl von Blutzellen. Dies kann dazu führen, dass Sie leichter blaue Flecken bekommen, ernsthafte Infektionen erleiden, plötzlich bluten oder sich sehr müde oder atemlos fühlen. Wenn Sie Avloclor über einen längeren Zeitraum einnehmen, könnte Ihr Arzt vorschlagen, dass Sie Bluttests durchführen lassen.

Andere mögliche Nebenwirkungen (Häufigkeit nicht bekannt)

Wenn Avloclor zur Vorbeugung oder Unterdrückung von Malaria verwendet wird, sind diese im Allgemeinen nicht ernst. Wenn

Avloclor über einen längeren Zeitraum verwendet wird, können sie ernster sein.

Herz

- Veränderungen in der Funktionsweise Ihres Herzens (bekannt als 'elektrokardiographische Veränderungen').
- Niedriger Blutdruck. Dies kann dazu führen, dass Sie sich schwach oder schwindelig fühlen.

Nervensystem

- Kopfschmerzen.
- Schwindelgefühl oder Benommenheit.
- Unwillkürliche Muskelbewegungen oder Krämpfe.

Verhalten

- Schlaflosigkeit.
- Stimmungsänderungen oder andere Auswirkungen auf das Verhalten. Dazu gehören das Gefühl, depressiv zu sein oder Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid, Angstgefühle, Verwirrung, irrationale Gedanken, Paranoia, Aggressivität, Schlafstörungen, Unruhe, Hochstimmung oder Übererregung, Konzentrationsmangel.

Haut

- Hautausschlag, einschließlich eines schuppigen Ausschlags (Psoriasis) oder Juckreiz.
- Schälende Haut.
- Verfärbung der Haut oder Schleimhäute (wie die Innenseite Ihres Mundes).
- Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht, die eine medizinische Behandlung erfordern kann.
- Das Auftreten von kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen auf der Haut.

Haare

- Veränderungen der Haarfarbe.
- Haarausfall.

Augen

- Verschwommene Sicht.
- Probleme mit Ihrem Farb- sehen.
- Schwierigkeiten beim Fokussieren Ihre Augen.
- Doppeltsehen.

Wenn Sie Avloclor über einen längeren Zeitraum einnehmen, kann Ihr Arzt vorschlagen, dass Sie Augenuntersuchungen durchführen lassen.

Ohren

- Hörverlust.
- Klingeln in den Ohren (Tinnitus).

Magen und Darm

- Magenbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Magenkrämpfe.

Andere

- Schwächung Ihrer Muskeln (Neuromyopathie und Myopathie).
- Senkung des Blutzuckerspiegels.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies umfasst alle möglichen Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Internet unter www.mhra.gov.uk/yellowcard melden oder nach MHRA Yellow Card im Google Play oder Apple App Store suchen. Durch das Melden von Nebenwirkungen Wirkungen Sie können helfen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels bereitzustellen.

5. Wie ist Avloclor

- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. . Ihr Arzneimittel könnte ihnen schaden.
- Lagern Sie Ihr Arzneimittel nicht über 30 °C.
- Schützen Sie die Tabletten vor Licht und Feuchtigkeit.
- Bewahren Sie die Tabletten in dem Behälter auf, in dem sie geliefert wurden.
- Nehmen Sie Avloclor nicht nach dem auf dem Karton angegebenen Verfallsdatum ein. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Hausmüll entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie Sie Arzneimittel entsorgen, die nicht mehr benötigt werden. Dies wird helfen, die Umwelt zu schützen.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Avloclor Tabletten enthalten

- Der Wirkstoff in Avloclor Tabletten ist Chloroquinphosphat. Jede Tablette enthält 250 mg Chloroquinphosphat (entsprechend 155 mg Chloroquinbase).
- Die anderen Bestandteile sind Magnesiumstearat (E572) und Maisstärke.

Wie Avloclor Tabletten aussehen und Inhalt der Packung

Avloclor Tabletten sind weiß und rund. Sie haben eine Bruchlinie auf einer Seite und den Buchstaben 'A'

auf beiden Seiten der Linie. Avloclor Tabletten sind in Packungen mit 20 Tabletten erhältlich.

Zulassungs- Inhaber und Hersteller Der Zulassungs-

Das Marketing Zulassung für Avloclor Tabletten wird von Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, UK gehalten.

Avloclor Tabletten werden hergestellt von AndersonBrecon (UK) Limited, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5PG UK.

Um dieses Merkblatt in Braille, Großdruck oder Audio zu hören oder anzufordern, bitte rufen Sie kostenlos an:

0800 198 5000 (nur UK)

Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit:

Produktname Avloclor Tabletten

Referenznummer 16853/0143

Dies ist ein Service des Royal National Institute of blind people.

Dieses Merkblatt wurde zuletzt im April 2022 überarbeitet.

© Alliance Pharmaceuticals Limited 2022

Avloclor, Alliance und zugehörige Geräte sind eingetragene Warenzeichen von Alliance Pharmaceuticals Limited