

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Avloclor® 250 mg Tabletit

klorokiinifosfaatti

Lue kaikki tärkeitä tietoja sinulle.

Ota tätä lääkettä aina täsmälleen tämän selosteen ohjeiden mukaisesti tai lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan

antamien ohjeiden mukaan. Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

Kysy apteekista, jos tarvitset lisätietoja tai neuvoja.

Jos saat haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa. Katso kohta 4. Mitä tämä seloste sisältää:

Mitä

1. Avloclor on ja mihin sitä käytetään Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat
2. Avloclor Avloclor
3. Kuinka ottaa Avloclor
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kuinka säilyttää Avloclor
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Avloclor on ja mihin sitä käytetään

Avloclor sisältää lääkettä nimeltä klorokiinifosfaatti. Tämä kuuluu ryhmään lääkkeitä, joita kutsutaan 'anti-malarialääkkeiksi'.

'Anti-malarialääkkeet' voidaan ottaa tietyissä osissa maailmaa malarian ehkäisemiseksi. Tämä on vakava sairaus, joka leviää tartunnan saaneiden hyttysten kautta. Avloclor antaa jonkin verran suojaa (profylaksia) malariaa vastaan tietyissä maissa.

Lääkkeitä malarian ehkäisyyn (malarian profylaksia) suositellaan:

- Ihmisille, jotka matkustavat maihin, joissa malariaa esiintyy.
- Ihmisille, jotka asuvat malaria-alueilla eivätkä ole immuuneja malarialle.

Näillä ihmisillä on vähän tai ei lainkaan immunitettia malariaa vastaan, joten he ovat vaarassa saada vakavia kohtauksia.

Sinun on saatava lääkärin neuvoa siitä, mitä malariaa estäviä lääkkeitä sinun tulisi ottaa. Sinun on kysyttävä

lääkäriltäsi tai apteekkariltasi, jos Avloclor sopii siihen osaan maailmaa, johon olet matkustamassa.

Joissakin maissa sinun on otettava Avloclor toisen lääkkeen kanssa maksimaalisen suojan saamiseksi.

Vältä hyttysten puremia

Kun otat tätä lääkettä malarian ehkäisyyn, sinun tulisi myös vähentää mahdollisuuksia tulla hyttysten puremaksi.

- Käytä vaaleanvärisiä, pitkähihaisia vaatteita ja pitkiä housuja, kun olet ulkona auringonlaskun jälkeen. auringonlasku.
- Käytä hyönteiskarkoteväriä tai -suihkeita kehon osiin, joita vaatteet eivät peitä.
- Nuku kunnolla suojatussa huoneessa tai hyttysverkon alla.
- Suihkuta tappaaksesi kaikki huoneisiin päässeet hyttyset huolimatta suojauksesta.

Malarian oireet

Mikään lääke ei voi taata suojaa malariaa vastaan kaikissa tapauksissa. Jos sinulla on korkea lämpö (kuume) vierailusi aikana malaria-alueella tai jopa vuoden kuluttua kotiin paluusta, sinun tulisi epäillä malariaa. Ota heti yhteyttä lääkäriin ja kerro hänelle, että olet vierailut malaria-alueella.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Avloclor

Älä ota Avloclor jos:

- Olet allerginen klorokiinifosfaatille tai jollekin muulle Avloclor aineosalle (katso Kohta 6: Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
- Käytät lääkettä nimeltä amiodaroni (käytetään sydämen sykkeen hallintaan). Avloclor saattaa lisätä epäsäännöllisten sydämenlyöntien (sydämen rytmihäiriöiden) riskiä, kun sitä otetaan samaan aikaan amiodaronin kanssa. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekista, jos et ole varma.

Varoitukset ja varotoimet

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista ennen lääkkeen ottamista, jos:

- Sinulla on koskaan ollut epilepsiaa, kouristuksia tai kohtauksia.
- Sinulla on koskaan ollut maksa- tai munuaisongelmia.
- Sinulle on koskaan kerrottu, että sinulla on harvinainen veripigmenttisairaus nimeltä 'porfyria' tai jollakin perheenjäsenelläsi on se. Tämä johtuu siitä, että Avloclor voi aiheuttaa vakavia porfyrian oireita, erityisesti jos juot alkoholia.
- Sinulla on ihon hilseilevä tila nimeltä psoriasis.
- Sinulla on lihasongelma nimeltä 'myasthenia gravis'. Avloclor voi pahentaa tämän tilan oireita. Se voi myös heikentää tämän tilan hoitoon käytettävien lääkkeiden vaikutusta (neostigmiini ja pyridostigmiini).
- Sinulla on veriongelma nimeltä 'glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos'.

Avloclor voi vahingoittaa verisoluja ihmisillä, joilla on tämä verisairaus.

Klorokiini voi aiheuttaa verensokeritason laskua. Pyydä lääkäriäsi kertomaan sinulle matalan verensokeritason merkeistä ja oireista. Verensokeritason tarkistus voi olla tarpeen.

Klorokiini voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä joillakin potilailla: varovaisuutta tulee noudattaa, kun käytät klorokiinia, jos olet syntynyt tai sinulla on suvussa pitkä QT-aika, jos sinulla on hankittu QT-ajan pidentyminen (näkyvät EKG:ssä, sydämen sähköisessä tallenteessa), jos sinulla on sydänsairauksia tai sinulla on ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti), jos sinulla on suolan epätasapaino veressä (erityisesti matala kalium- tai magnesiumtaso, katso kohta "Muut lääkkeet ja Avloclor").

Jos koet sydämentykytystä tai epäsäännöllistä sydämenlyöntiä hoitajakson aikana, sinun tulee ilmoittaa asiasta välittömästi lääkärillesi. Sydänongelmien riski voi kasvaa annoksen kasvaessa. Siksi suositeltua annostusta tulee noudattaa.

Jotkut klorokiinilla hoidettavat ihmiset voivat kokea mielenterveysongelmia, kuten järjettömät ajatukset, hallusinaatiot, sekavuuden tunne, aggressiivisuus, vainoharhaisuus, masentuneisuus tai ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta, jopa niillä, joilla ei ole koskaan ollut vastaavia ongelmia aiemmin. Jos sinä tai muut ympärilläsi huomaatte jonkin näistä sivuvaikutuksista (katso kohta 4), hakeudu heti lääkärin hoitoon.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Avloclor.

Jos joudut sairaalaan, kerro hoitohenkilökunnalle, että käytät Avloclor.

Jos asut maassa, jossa malariaa esiintyy, saatat jo olla hieman immuuni taudille. Sinun on kysyttävä lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin otat malariaa ehkäiseviä lääkkeitä.

Muut lääkkeet ja Avloclor

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä sisältää lääkkeitä, jotka ostat ilman reseptiä, sekä rohdosvalmisteet. Lääkkeet.

Amiodaronia (käytetään sydämen sykkeen hallintaan) ei saa ottaa samanaikaisesti kuin Avloclor (katso kohta 2: mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Avloclor).

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä. Tämä on koska Avloclor voi vaikuttaa näiden lääkkeiden määrään veressäsi.

- Pratsikvanteli (käytetään suoliston ja virtsarakon infektioiden hoitoon, jotka johtuvat loisista).
- Siklosporiini (käytetään pääasiassa elinsiirtopotilailla, mutta myös nivelreuman ja psoriaasin hoitoon). ja psoriaasi).
- Digoksiini (käytetään sydänongelmien hoitoon).
- Kerro myös lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

Lääkkeet, joiden tiedetään vaikuttavan sydämesi rytmiin. Tämä sisältää lääkkeitä, joita käytetään

- epänormaaliin sydämen rytmiin (antiarytmiat), masennukseen (trisykliset masennuslääkkeet), psykiatriin häiriöihin (antipsykootit), bakteeri-infektioihin tai malariaa vastaan (esim. halofantriini). halofantriini).
- Atsitromysiini, klaritromysiini tai erytromysiini (antibiootteja, joita käytetään infektioiden hoitoon). Näiden lääkkeiden ottaminen samanaikaisesti klorokiinin kanssa voi lisätä riskiä saada sydämeen vaikuttavia sivuvaikutuksia.
- Meflokiini (käytetään malarian ehkäisyyn) voi lisätä kouristusten tai kohtausten riskiä, kun otetaan samanaikaisesti Avloclor.
- Lääkkeet, joita käytetään epilepsian hoitoon, koska Avloclor voi heikentää niiden tehoa.

- Agalsidaasi (käytetään Fabryn taudin hoitoon), koska Avloclor voi heikentää sen aktiivisuutta.
- Simetidiini (käytetään vatsavaivojen hoitoon). Tämä lääke vaikuttaa siihen, miten Avloclor hajoaa kehossasi ja voi vaikuttaa Avloclor määrään veressäsi.
- Levotyrokksiini (kilpirauhaslääke).
- Lääkkeet kuten kaoliini (käytetään ripuliin) joita kutsutaan 'adsorbenteiksi'.
- Antasidilääkkeet (alumiini, kalsium ja magnesiumsuolat, joita käytetään hoitamaan närästystä tai ruoansulatushäiriöitä).

Adsorbentit ja antasidilääkkeet voivat vähentää Avloclorin imeytymistä suolistostasi. Tämä voi tarkoittaa, että koko annos Avlocloria ei imeydy kehoosi ja se ei toimi kunnolla. Siksi sinun tulisi ottaa nämä lääkkeet vähintään neljä tuntia ennen tai jälkeen Avloclor annoksen ottamista.

Jotkut lääkkeet (esimerkiksi siprofloksasiini, simetidiini, omepratsoli, pyrimetamiini) voivat lisätä määrää Avloclor kehossasi ja tämä voi aiheuttaa sivuvaikutuksia. On tärkeää, että et ota mitään lisälääkkeitä (joko reseptillä tai ilman) ennen kuin olet puhunut lääkärisi kanssa.

Jos tarvitset rokotuksen vesikauhua vastaan, varmista, että saat sen ennen kuin aloitat malarianestolääkityksesi. Jos saat vesikauhurokotuksen samaan aikaan kun otat malarianestolääkettäsi, vesikauhurokote ei välttämättä toimi niin hyvin.

Raskaus

Jos olet raskaana tai saatat tulla raskaaksi, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa:

- ennen kuin otat Avloclor,
- ennen kuin otat mitään lääkettä malarian ehkäisyyn,
- ja ennen kuin menet maahan, jossa on malariaa.

Imetys

- Jos imetät, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Avloclor.
- Vaikka Avloclor kulkeutuu rintamaitoon, mutta määrä ei ole riittävä suojaamaan vauvaasi malarialta. Siksi vauvallesi on silti annettava malariaa ehkäiseviä lääkkeitä. Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista.

Ajoneuvojen ja koneiden käyttö

Joskus Avloclor aiheuttaa näön hämärtymistä tai vaikeuttaa silmien tarkentamista. Jos näin käy sinulle, älä aja tai käytä työkaluja tai koneita.

3. Miten Avloclor

Ota aina Avloclor täsmälleen tämän pakkausselosteen ohjeiden mukaisesti tai lääkärisi tai apteekkisi antamien ohjeiden mukaan. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma.

Milloin aloittaa lääkkeen ottaminen

- Aloita tämän lääkkeen ottaminen viikko ennen malaria-alueelle menoa.
- Sinun on jatkettava sen ottamista oleskelusi aikana.

- Sinun on jatkettava tämän lääkkeen ottamista 4 viikkoa malaria-alueelta poistumisen jälkeen.

Aikuiset ja yli 14-vuotiaat lapset

- Ota kaksi Avloclor tablettia kerran viikossa samana viikonpäivänä.

lääkäät ihmiset

- Jos olet iäkäs henkilö, lääkärisi saattaa ehdottaa verikokeita. Lääkärisi saattaa myös päättää antaa sinulle eri annoksen.

Lapset

Älä anna Avloclor lapsille, jotka ovat alle 1 vuoden ikäisiä. Yli 1-vuotiaille lapsille annos riippuu lapsen iästä.

- Iät 1–4 vuotta: Ota puoli Avloclor tablettia kerran viikossa (samana viikonpäivänä).
- Iät 5–8 vuotta: Ota yksi Avloclor tabletti kerran viikossa (samana viikonpäivänä).
- Iät 9–14 vuotta: Ota puolitoista Avloclor tablettia kerran viikossa (samana viikonpäivänä) joka viikko).

Kuinka ottaa tabletit

- Ota tabletti(t) ruoan jälkeen.
- Niele tabletti(t) tai osittaiset tabletit kokonaisina vesilasillisen kanssa.

Jos otat enemmän Avloclor tabletteja kuin pitäisi

Jos otat vahingossa enemmän Avloclor tabletteja kuin pitäisi, kerro heti lääkäriille. Seuraavat vaikutukset voivat tapahtua: tapahtua: Jos unohdat ottaa

Avloclor tabletit Jos unohdat ottaa annoksen

- Avloclor , ota se heti kun muistat.Odota sitten 7 päivää ennen kuin otat seuraavan annoksen
- Odota sitten 7 päivää ennen kuin otat seuraavan annoksen Avloclor.
- Jatka Avloclor -tablettien ottamista joka viikko, uutena viikonpäivänä.

Lopettaminen Avloclor

Lopeta Avloclor neljä viikkoa malaria-alueelta poistumisen jälkeen tai jos lääkärisi kehottaa sinua tekemään niin.

Jos sinulla on kysyttävää tämän tuotteen käytöstä, kysy lääkäriltäsi tai apteekista.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Avloclor voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Jos koet jonkin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta Avloclor ja hakeudu lääkäriin hakeudu heti apuun tai ota yhteyttä lääkäriisi.

- Allergiset reaktiot, mukaan lukien hengitysvaikeudet, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotus jotka voivat aiheuttaa nielemisvaikeuksia ja kutisevaa ihottumaa (samankaltainen kuin nokkosihottuma tai urtikaria)

- Vakava ihottuma, jossa on rakkuloita tai ihon kuoriutumista ja mahdollisesti rakkuloita suussa ja nenässä.
- Näkeminen, tunteminen tai kuuleminen asioita, joita ei ole olemassa (hallusinaatiot) (harvinainen).
- Sydänlihassairaus (kardiomyopatia), joka voi olla kohtalokas suurilla annoksilla pitkäaikaisessa käytössä. Katso kohta 2, varoitukset ja varotoimet (harvinainen).
- Epänormaali sydämen rytmi, hengenvaarallinen epäsäännöllinen sydämen rytmi (näkyä EKG:ssä). Katso kohta 2, Varoitukset ja varotoimet (yleisyyttä ei tiedetä).
- Maksavaivat, jotka voivat aiheuttaa ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta. Jos käytät Avloclor pitkään, lääkärisi saattaa ehdottaa verikokeita tarkistaakseen, kuinka hyvin maksasi toimii (harvinainen).
- Keuhkojen tulehdus, joka aiheuttaa tilan, joka tunnetaan nimellä diffuusi parenkymaalinen keuhkosairaus.

Jos sinulle kehittyy vakavaa hengitysvaikeutta tai hengitysvaikeuden pahenemista hengitysvaikeus hakeudu välittömästi lääkärin neuvoihin.

- Kouristukset tai kohtaukset.
- Osittainen tai täydellinen näönmenetyk.
- Muutokset silmän verkkokalvossa (retinopatia) tai sarveiskalvossa. Tämä voi johtaa 'laikukkaaseen' näköön.
- Lääkkeen aiheuttama ihottuma, johon liittyy valkosolujen määrän lisääntyminen (verikokeissa voi näkyä) ja oireita, jotka vaikuttavat koko kehoon. Saatat huomata joitakin tai kaikkia seuraavista oireista: ihottuma ja kuume, kasvojen turvotus, arkoja yleistyneitä turvonneita tai suurentuneita imusolmukkeita tai muita oireita, jotka viittaavat muiden elinten, kuten maksan, munuaisten tai keuhkojen, osallistumiseen (kuten ihon tai silmien keltaisuus, virtsaamisongelmat, hengitysvaikeudet). Vähentynyt verisolujen määrä. Tämä voi aiheuttaa helpommin mustelmia, vakavia
- infektioita, äkillistä verenvuotoa tai voimakasta väsymystä tai hengitysvaikeuksia. Jos käytät infektioita, äkillistä verenvuotoa tai tunnet olosi erittäin väsyneeksi tai hengästyneeksi. Jos käytät Avloclor pitkän aikaa lääkärisi saattaa ehdottaa, että sinulle tehdään verikokeita.

Muut mahdolliset haittavaikutukset (yleisyyttä ei tiedetä)

Kun Avloclor käytetään malarian ehkäisyyn tai tukahduttamiseen, nämä eivät yleensä ole vakavia. Jos Avloclor käytetään pitkään, ne voivat olla vakavampia.

Sydän

- Muutokset sydämen toiminnassa (tunnetaan nimellä 'elektrokardiografiset muutokset').
- Matala verenpaine. Tämä voi aiheuttaa heikotusta tai huimausta.

Hermosto

- Päänsärky.
- Huimauksen tai pyörrytyksen tunne.
- Tahattomat lihasliikkeet tai kouristukset.

Käyttäytyminen

- Unettomuus.
- Mielialan muutokset tai muut vaikutukset käyttäytymiseen Näihin kuuluu masentuneisuus tai ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta, ahdistuneisuuden tunne, sekavuuden tunne, irrationaalinen ajatukset, vainoharhaisuus, aggressiivisuus, unihäiriöt, levottomuus, kohonnut tai yli-innokas mieliala, keskittymiskyvyn puute.

Iho

- Ihottuma, mukaan lukien hilseilevä ihottuma (psoriasis) tai kutina.
- Ihon hilseily.
- Värimuutokset ihossa tai limakalvoilla (kuten suun sisäpuolella).
- Herkkyys auringonvalolle, joka saattaa vaatia lääkärinhoitoa.
- Pienten nesteiden täyttämien rakkuloiden ilmestyminen iholle.

Hiukset

- Muutokset hiusten värissä.
- Hiustenlähtö.

Silmät

- Näön hämärtyminen.
- Ongelmia värinäön kanssa.
- Vaikeuksia tarkentamisessa silmäsi.
- Kaksoiskuvat.

Jos käytät Avloclor pitkään, lääkärisi saattaa ehdottaa silmätutkimuksia.

Korvat

- Kuulon heikkeneminen.
- Korvien soiminen (tinnitus).

Vatsa ja suolisto

- Vatsavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ripuli tai vatsakrampit.

Muut

- Lihasten heikkeneminen (neuromyopatia ja myopatia).
- Verensokeritason lasku.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä esitteessä. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan internetissä osoitteessa www.mhra.gov.uk/yellowcard tai etsi MHRA Yellow Card Google Playsta tai Applen App Storesta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista suoraan vaikutukset sinä voit auttaa tarjoamaan lisätietoa tämän turvallisuudesta lääke.

5. Säilyttäminen Avloclor

- Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa ja näkyvissä. . Lääkkeesi voi vahingoittaa heitä.
- Älä säilytä lääkettäsi yli 30 °C lämpötilassa.
- Suojaa tabletit valolta ja kosteudelta.

- Pidä tabletit alkuperäisessä pakkauksessa.
- Älä ota Avloclor pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule hävittää jäteveden tai talousjätteen mukana. Kysy apteekista kuinka hävittää lääkkeet, joita ei enää tarvita. Tämä auttaa suojelemaan ympäristöä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Avloclor -tabletit sisältävät

- Vaikuttava aine Avloclor -tableteissa on klorokiinifosfaatti. Jokainen tabletti sisältää 250 mg klorokiinifosfaattia (vastaa 155 mg klorokiinipohjaa).
- Muut aineet ovat magnesiumstearaatti (E572) ja maissitärkkelys.

Miltä Avloclor -tabletit näyttävät ja pakkauksen sisältö

Avloclor -tabletit ovat valkoisia ja pyöreitä. Niissä on jakourre toisella puolella ja kirjain 'A' jakoviivan molemmin puolin. Avloclor -tabletit ovat 20 tabletin pakkauksissa.

Myynti- lupa haltija ja valmistaja

Myynti- Lupa varten Avloclor -tableteille on myöntänyt Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, UK.

Avloclor -tabletit valmistaa AndersonBrecon (UK) Limited, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5PG UK.

Jos haluat kuunnella tai pyytää tämän esitteen kopion pistekirjoituksella, suurikokoisena tai äänitteenä, ole hyvä ja

soita maksutta:

0800 198 5000 (vain Iso-Britanniassa)

Ole valmis antamaan seuraavat tiedot:

Tuotteen nimi Avloclor -tabletit

Viitenumero 16853/0143

Tämä on palvelu, jonka tarjoaa Royal National Institute of blind people.

Tätä pakkausselostetta tarkistettiin viimeksi huhtikuussa 2022.

© Alliance Pharmaceuticals Limited 2022

Avloclor, Alliance ja siihen liittyvät laitteet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Alliancen Pharmaceuticals Limited