

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Avloclor® 250 mg tabletės

chlorokvino fosfatas

Perskaitykite visą šį lapelį atidžiai prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame yra svarbios informacijos jums.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė jūsų gydytojas ar vaistininkas. yra jums pasakęs.

Kreipkitės į vaistininką, jei jums reikia daugiau informacijos ar patarimo.

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Tai apima bet kokį galimą šalutinį

poveikį, kuris nėra išvardytas šiame lapelyje. Žr. 4 skyrių. Kas yra šiame lapelyje:

Kas yra

1. Avloclor ir kam jis vartojamas Ką reikia žinoti prieš vartojant
2. Avloclor Avloclor
3. Kaip vartoti Avloclor
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Avloclor
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Avloclor ir kam jis vartojamas

Avloclor sudėtyje yra vaisto, vadinamo chlorokvino fosfatu. Tai priklauso grupei vaistų, vadinamų 'anti-maliariniais'.

'Anti-maliariniai' gali būti vartojami tam tikrose pasaulio vietose, siekiant padėti išvengti maliarijos.

Tai yra

rimta liga, plintanti per užkrėstus uodus. Avloclor suteiks tam tikrą apsaugos laipsnį (profilaktika) nuo maliarijos tam tikrose šalyse.

Vaistai, padedantys išvengti maliarijos (maliarijos profilaktika), rekomenduojami:

- Žmonėms, keliaujantiems į šalis, kuriose pasitaiko maliarija.
- Žmonėms, gyvenantiems maliarijos zonose, kurie nėra atsparūs maliarijai.

Šie žmonės turi mažai arba visai neturi imuniteto maliarijai, todėl jiems gresia sunkūs priepuoliai.

Jūs turite gauti medicininę konsultaciją, kokius vaistus nuo maliarijos vartoti. Jūs turite paklausti savo gydytojo arba vaistininko, ar Avloclor tinka pasaulio daliai, į kurią keliaujate. Kai kuriose šalyse gali tekti vartoti Avloclor kartu su kitu vaistu, kad būtų užtikrinta maksimali apsauga.

Vengti uodų įkandimų

Kai vartojate šį vaistą maliarijos profilaktikai, taip pat turėtumėte sumažinti tikimybę būti įkandami uodų.

- Dėvėkite šviesios spalvos, ilgomis rankovėmis drabužius ir ilgas kelnes, kai esate lauke po saulėlydžio.

- Naudokite vabzdžių repelentus kremus ar purškalus ant kūno dalių, kurios nėra padengtos drabužiais.
- Miegokite tinkamai apsaugotame kambaryje arba po tinkleliu nuo uodų.
- Purškite, kad nužudytumėte bet kokius uodus, kurie galėjo patekti į kambarius nepaisant apsaugos.

Maliarijos požymiai

Nė vienas vaistas negali būti garantuotas apsaugoti nuo maliarijos kiekvienu atveju. Jei turite aukštą

temperatūrą (karščiavimą) savo vizito į maliarijos zoną metu arba iki metų po grįžimo namuose, turėtumėte įtarti maliariją. Nedelsdami susisieki su gydytoju ir praneškite jam ar jai, kad lankėtės maliarijos zonoje.

2. Ką reikia žinoti prieš vartojant Avloclor

Nevartokite Avloclor jei:

- Esate alergiškas chlorokvino fosfatui arba bet kuriai kitai Avloclor sudedamajai daliai (žr. 6 skyrius: Pakuotės turinys ir kita informacija).
- Vartojate vaistą, vadinamą amiodaronu (naudojamas širdies ritmo kontrolei). Avloclor gali padidinti nereguliaraus širdies plakimo (širdies aritmijų) riziką, kai jis vartojamas tuo pačiu metu kaip amiodaronas. Pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku, jei nesate tikri.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku prieš vartodami savo vaistus, jei:

- Jums kada nors buvo epilepsija, traukuliai ar priepuoliai.
- Jums kada nors buvo problemų su kepenimis ar inkstais.
- Jums kada nors buvo pasakyta, kad turite retą kraujo pigmento ligą, vadinamą 'porfirija', arba kas nors iš jūsų šeimos ją turi. Taip yra todėl, kad Avloclor gali sukelti sunkų porfirijos simptomus, ypač jei vartojate alkoholį.
- Jūs turite žvynelinę odos būklę, vadinamą psoriaze.
- Jūs turite raumenų problemą, vadinamą 'myasthenia gravis'. Avloclor gali padidinti šios būklės simptomus. Jis taip pat gali sumažinti vaistų, skirtų šiai būklės gydymui (neostigminas ir piridostigminas), poveikį.
- Jūs turite kraujo problemą, vadinamą 'gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumu'.

Avloclor gali pažeisti kraujo ląsteles žmonėms, turintiems šią kraujo būklę.

Chlorokvinas gali sukelti gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimą. Prašome paprašyti savo gydytojo informuoti jus apie žemo gliukozės kiekio kraujyje požymius ir simptomus. Gali būti būtina patikrinti gliukozės kiekį kraujyje. būtina.

vartojate chlorokviną, jei gimėte su arba turite šeimos istoriją dėl pailgėjusio QT intervalo, jei jums yra įgytas QT intervalo pailgėjimas (matomas EKG, širdies elektrinis įrašas), jei turite širdies sutrikimų arba turite širdies priepuolio (miokardo infarkto) istoriją, jei jums yra druskų jūs turite druskos vaistai ir Avloclor ").Jei gydymo laikotarpiu jaučiate širdies plakimą ar nereguliarų

širdies ritmą, turėtumėte nedelsiant informuoti savo gydytoją. Širdies problemų rizika gali padidėti didėjant dozei. Todėl reikia laikytis rekomenduojamos dozės. Kai kurie žmonės, gydomi chlorokvinu, gali patirti psichikos sveikatos problemų, tokių kaip

Kai kuriems žmonėms, gydomiems chlorokvinu, gali pasireikšti psichikos sveikatos problemos, tokios kaip neracionalios mintys, haliucinacijos, sumišimo jausmas, agresyvumas, paranoja, depresijos jausmas arba turite minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę, net jei anksčiau tokių problemų neturėjote. Jei jūs arba kiti aplinkui pastebi bet kurį iš šių šalutinių poveikių (žr. 4 skyrių), nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jei nesate tikri, ar kas nors iš aukščiau paminėtų dalykų jums tinka, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku prieš vartodami Avloclor.

Jei atsidursite ligoninėje, pasakykite medicinos personalui, kad vartojate Avloclor.

Jei gyvenate šalyje, kurioje pasitaiko maliarija, galite būti šiek tiek imunitetiški šiai ligai. Prieš vartodami vaistus nuo maliarijos, turite pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Kiti vaistai ir

Avloclor Avloclor

kitus vaistus. Tai apima vaistus, kuriuos perkate be recepto, ir vaistažoles. kiti vaistai. Tai apima vaistus, kuriuos perkate be recepto, ir vaistažoles vaistai.

Amiodaronas (vartojamas širdies ritmui kontroliuoti) neturi būti vartojamas tuo pačiu metu kaip Avloclor (žr. 2 skyrių: ką reikia žinoti prieš vartojant Avloclor).

Pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui, jei vartojate bet kurį iš šių vaistų. Taip yra todėl, kad Avloclor gali paveikti šių vaistų kiekį jūsų kraujyje.

- Prazikvantelis (vartojamas žarnyno ir šlapimo pūslės infekcijoms, sukeltoms parazitų, gydyti).
- Ciklosporinas (daugiausia vartojamas transplantacijos pacientams, bet taip pat vartojamas reumatoidiniam artritui ir psoriazei gydyti).
- Antikonvulsiniai vaistai (vartojami traukuliams ar priepuoliams išvengti).
- Digoksinas (vartojamas širdies problemoms gydyti).

Taip pat pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui, jei vartojate bet kurį iš šių vaistų:

- Vaistai, žinomi kaip veikiantys jūsų širdies ritmą. Tai apima vaistus, vartojamus nenormaliam širdies ritmui (antiaritminiai), depresijai (tricikliai antidepresantai) gydyti, psichikos sutrikimams (antipsichotikai), bakterinėms infekcijoms ar nuo maliarijos (pvz., halofantrinas) gydyti.
- Azitromicinas, klaritromicinas arba eritromicinas (antibiotikai, naudojami infekcijoms gydyti). Šiuos vaistus vartojant kartu su chlorokvinu gali padidėti tikimybė, kad patirsite šalutinį poveikį, kuris veikia jūsų širdį.
- Meflokvinas (vartojamas maliarijai išvengti) gali padidinti traukulių ar priepuolių riziką, kai vartojamas kartu su Avloclor.
- Vaistai, naudojami epilepsijai gydyti, nes Avloclor gali sumažinti jų veiksmingumą.
- Agalsidazė (naudojama Fabry ligai gydyti), nes Avloclor gali sumažinti jos aktyvumą.
- Cimetidinas (naudojamas skrandžio problemoms gydyti). Šis vaistas veikia, kaip Avloclor yra skaidomas jūsų organizme ir gali paveikti Avloclor kiekį jūsų kraujyje.

- Levotiroksinas (skyd liaukės vaistas).
- Vaistai, tokie kaip kaolinai (naudojamas viduriavimui), kurie vadinami 'adsorbentais'.
- Antacidiniai vaistai (aliuminio, kalcio ir magnio druskos, naudojami gydyti rėmenį ar nevirškinimą).

Adsorbentai ir antacidiniai vaistai gali sumažinti Avloclor kiekį, absorbuojamą iš jūsų žarnyno. Tai gali reikšti, kad visa Avloclor dozė nėra absorbuojama į jūsų kūną ir jis neveiks tinkamai. Todėl šiuos vaistus turėtumėte vartoti bent keturias valandas prieš arba po Avloclor dozės vartojimo.

Kai kurie vaistai (pavyzdžiui, ciprofloksacinai, cimetidinas, omeprazolas, pirimetaminas) gali padidinti Avloclor kiekį jūsų organizme ir tai gali sukelti šalutinį poveikį. Svarbu, kad nepradėtumėte vartoti jokių papildomų vaistų (tiek receptinių, tiek nereceptinių) prieš pasikonsultuodami su savo gydytoju.

Jei jums reikia skiepytis nuo pasiutligės, įsitikinkite, kad tai padarysite prieš pradėdami vartoti vaistus nuo maliarijos. Jei skiepytės nuo pasiutligės tuo pačiu metu, kai vartojate vaistus nuo maliarijos, jūsų pasiutligės vakcina gali neveikti taip gerai.

Nėštumas

Jei esate nėščia arba galite pastoti, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku:

- prieš pradėdami vartoti Avloclor,
- prieš pradėdami vartoti bet kokius vaistus maliarijos profilaktikai,
- ir prieš vykdami į šalį, kurioje yra maliarija.

Žindymas

- Jei žindote kūdikį, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Avloclor.
- Nors Avloclor patenka į motinos pieną, tačiau kiekis nėra pakankamas jūsų kūdikiui apsaugoti nuo maliarijos. Todėl jūsų kūdikiui vis tiek reikės duoti vaistų nuo maliarijos. Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką, kuris galės jums patarti.

Vairavimas ir mechanizmų naudojimas

Kartais Avloclor sukelia neryškų matymą arba sunkina akių fokusavimą. Jei taip atsitinka jums, nevairuokite ir nenaudokite jokių įrankių ar mechanizmų.

3. Kaip vartoti Avloclor

Visada vartokite Avloclor tiksliai taip, kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė jūsų gydytojas ar vaistininkas.

Jei nesate tikri, pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku.

Kada pradėti vartoti vaistus

- Pradėkite vartoti šį vaistą likus savaitei iki įžengimo į maliarijos zoną.
- Turite tęsti jo vartojimą visos viešnagės metu.
- Turite tęsti šio vaisto vartojimą 4 savaites po išvykimo iš maliarijos zonos.

Suaugusieji ir vaikai vyresni nei 14 metų

- Vartokite dvi Avloclor tabletes kartą per savaitę tą pačią savaitės dieną.

Senyvo amžiaus žmonės

- Jei esate senyvo amžiaus, gydytojas gali pasiūlyti atlikti kraujo tyrimus. Jūsų gydytojas gali taip pat nuspręsti skirti kitokią dozę.

Vaikai

Neduokite Avloclor vaikams iki 1 metų amžiaus. Vaikams, vyresniems nei 1 metų, dozė priklauso nuo vaiko amžiaus.

- Amžius 1-4 metai: Vartokite pusę Avloclor tabletės kartą per savaitę (tą pačią savaitės dieną).
- Amžius 5-8 metai: Vartokite vieną Avloclor tabletę kartą per savaitę (tą pačią savaitės dieną).
- Amžius 9-14 metai: Vartokite pusantros Avloclor tabletės kartą per savaitę (tą pačią savaitės dieną) kiekvieną savaitę).

Kaip vartoti tabletes

- Vartokite tabletes po valgio.
- Nurykite tabletes arba jų dalis užsigerdami vandeniu.

Jei išgėrėte daugiau Avloclor tablečių nei reikia

Jei netyčia išgėrėte daugiau Avloclor tablečių nei reikia, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali pasireikšti šie poveikiai: įvykti: Jei pamiršote išgerti savo

Avloclor tabletes Jei pamiršote išgerti dozę

- Avloclor Avloclor Tada palaukite 7 dienas prieš vartodami kitą dozę
- Tada palaukite 7 dienas prieš vartodami kitą dozę Avloclor.
- Tęskite vartoti savo Avloclor tabletes kiekvieną savaitę, šią naują savaitės dieną.

Nutraukimas Avloclor

Nutraukite Avloclor vartojimą tik praėjus keturioms savaitėms po išvykimo iš malarijos zonos arba jei jūsų gydytojas jums liepia tai padaryti.

Jei turite daugiau klausimų apie šio produkto vartojimą, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir visi vaistai, Avloclor gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas jį patiria.

Rimtas šalutinis poveikis

Jei patariate bet kurį iš šių šalutinių poveikių, nutraukite Avloclor vartojimą ir kreipkitės į gydytoją kreipkitės pagalbos arba nedelsdami susisieki su savo gydytoju.

- Alerginės reakcijos, įskaitant kvėpavimo sunkumus, veido, lūpų, liežuvio ar gerklės patinimą kurios gali sukelti rijimo sunkumų ir niežtinčią bėrimą (panašų į dilgėlinę ar avilius)
- Sunkus bėrimas su pūslėmis ar odos lupimusi ir galbūt pūslėmis burnoje ir nosyje.
- Matymas, jutimas ar girdėjimas dalykų, kurių nėra (haliucinacijos) (retai).

- Širdies raumens liga (kardiomiopatija), kuri gali būti mirtina esant didelėms dozėms ilgalaikiam vartojimui. Žr. 2 skyrių, įspėjimai ir atsargumo priemonės (retai).
- Nenormalus širdies ritmas, gyvybei pavojingas nereguliarus širdies ritmas (matomas EKG). Žr. 2 skyrių, įspėjimai ir atsargumo priemonės (dažnis nežinomas). Kepenų problemos, kurios gali sukelti odos ar akių baltymų pageltimą.
- Jei vartojate Avloclor Avloclor norint patikrinti, kaip gerai veikia jūsų kepenys (retai). Plaučių uždegimas, sukeliantis būklę, žinomą kaip difuzinė parenchiminė plaučių liga.
- Plaučių uždegimas, sukeliantis būklę, vadinamą difuzine parenchimine plaučių liga.

Jei atsiranda rimtas dusulys arba dusulio pablogėjimas dusulys nedelsiant kreipkitės į gydytoją patarimo.

- Traukuliai arba priepuoliai.
- Dalinis arba visiškas regėjimo praradimas.
- Pokyčiai tinklainėje (retinopatija) arba ragenoje. Tai gali sukelti 'dėmėtą' regėjimą.
- Bėrimas, kurį sukelia vaistas, susijęs su padidėjusiu baltųjų kraujo kūnelių skaičiumi (tai gali pasirodyti kraujo tyrimuose) ir simptomais, apimančiais visą kūną. Jūs galite pastebėti kai kuriuos arba visus šiuos simptomus: odos bėrimas ir karščiavimas, veido patinimas, skausmingi bendri patinę arba padidėję limfmazgiai, arba kiti simptomai, rodantys kitų kūno organų, įskaitant kepenis, inkstus ar plaučius, įsitraukimą (pvz., odos ar akių pageltimas, šlapinimosi problemos, dusulys). Sumažėjęs kraujo ląstelių skaičius. Tai gali sukelti lengvą mėlynių atsiradimą, rimtas
- infekcijas, staigų kraujavimą arba labai didelį nuovargį ar dusulį. Jei vartojate infekcijos, staigus kraujavimas arba jaučiatės labai pavargę ar dusulys. Jei vartojate Avloclor ilgą laiką jūsų gydytojas gali pasiūlyti atlikti kraujo tyrimus.

Kiti galimi šalutiniai poveikiai (dažnis nežinomas)

Kai Avloclor naudojamas maliarijos prevencijai ar slopinimui, jie paprastai nėra rimti. Jei Avloclor naudojamas ilgą laiką, jie gali būti rimtesni.

Širdis

- Širdies veiklos pokyčiai (žinomi kaip „elektrokardiografiniai pokyčiai“).
- Žemas kraujospūdis. Tai gali sukelti alpimą ar galvos svaigimą.

Nervų sistema

- Galvos skausmas.
- Galvos svaigimas ar lengvas galvos sukimasis.
- Nevalingi raumenų judesiai ar spazmai.

Elgesys

- Nemiga.
- Nuotaikos pokyčiai ar kiti poveikiai elgesiui. Tai apima depresijos jausmą arba mintis apie savęs žalojimą ar savižudybę, nerimo jausmą, sumišimą, neracionalias mintis, paranoją, agresyvumą, miego sutrikimus, susijaudinimą, pakilią ar per daug susijaudinusią būseną, koncentracijos stoka.

Oda

- Odos bėrimas, įskaitant pleiskanojantį bėrimą (psoriazę) arba niežulį.
- Odos lupimasis.

- Spalvos pakitimas odos ar gleivinių (pvz., burnos viduje).
- Jautrumas saulės šviesai, kuris gali reikalauti medicininio gydymo.
- Mažų skysčiu užpildytų pūslelių atsiradimas ant odos.

Plaukai

- Plaukų spalvos.
- Plaukų slinkimas.

Akys

- Neryškus regėjimas.
- Problemos su spalvų regėjimu.
- Sunkumai fokusuojant jūsų akis.
- Dvigubas matymas.

Jei vartojate Avloclor ilgą laiką, jūsų gydytojas gali pasiūlyti atlikti akių tyrimus.

Ausys

- Klausos praradimas.
- Spengimas ausyse (tinitas).

Skrandis ir žarnynas

- Skrandžio sutrikimai, pykinimas, vėmimas, viduriavimas arba skrandžio spazmai.

Kita

- Raumenų silpnėjimas (neuromiopatija ir miopatija).
- Gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimas.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Tai apima bet kokią galimą šalutinį poveikį, kuris nėra išvardytas šiame lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai internetu adresu www.mhra.gov.uk/yellowcard arba ieškokite MHRA Yellow Card „Google Play“ arba „Apple“ App Store. Pranešdami apie šalutinį poveikį jūs galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Avloclor

- Laikykite šį vaistą vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Jūsų vaistas gali jiems pakenkti.
- Nelaikykite savo vaisto aukštesnėje nei 30o C temperatūroje.
- Apsaugokite tabletes nuo šviesos ir drėgmės.
- Laikykite tabletes originalioje pakuotėje.
- Nevartokite Avloclor po ant dėžutės nurodytos galiojimo datos. Galiojimo data nurodo to mėnesio paskutinę dieną.

Vaistai neturėtų būti šalinami per nuotekas ar buitinius atliekomis. Paklauskite savo vaistininko kaip atsikratyti vaistų, kurie nebėra reikalingi. Tai padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kas Avloclor tabletės sudėtyje

- Veiklioji medžiaga Avloclor tabletėse yra chlorokvino fosfatas. Kiekvienoje tabletėje yra 250 mg chlorokvino fosfato (atitinka 155 mg chlorokvino bazės).
- Kiti ingredientai yra magnio stearatas (E572) ir kukurūzų krakmolos.

Kaip atrodo Avloclor tabletės ir pakuotės turinys

Avloclor tabletės yra baltos ir apvalios. Jos turi lūžio liniją vienoje pusėje ir raidę 'A' abiejose linijos pusėse. Avloclor tabletės tiekiamos pakuotėse po 20 tablečių.

Rinkodaros Leidimo turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros Leidimas už Avloclor tabletes yra išduotas Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, JK.

Avloclor tabletes gaminamos AndersonBrecon (UK) Limited, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5PG JK.

Norėdami klausytis arba užsisakyti šio lapelio kopiją Brailio raštu, dideliu šriftu ar garso formatu, prašome

skambinti nemokamai:

0800 198 5000 (tik JK)

Prašome būti pasiruošus pateikti šią informaciją:

Produkto pavadinimas Avloclor tabletės

Nuorodos numeris 16853/0143

Tai yra paslauga, teikiama Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto.

Šis lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2022 m. balandžio mėn.

© Alliance Pharmaceuticals Limited 2022

Avloclor, Alliance ir susiję įrenginiai yra registruoti prekių ženklai Alliance Pharmaceuticals Limited