

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Avloclor® 250 mg Tabletten

chloroquinefosfaat

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel, want het bevat

belangrijke informatie voor u.

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u heeft verteld.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan zijn dat u deze nogmaals moet lezen.

Vraag uw apotheker om meer informatie of advies als u dat nodig heeft.

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Wat er in deze bijsluiter staat:

1. Wat Avloclor is en waarvoor het wordt gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Avloclor
3. Hoe te nemen Avloclor
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe te bewaren Avloclor
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat Avloclor is en waarvoor het wordt gebruikt

Avloclor bevat een geneesmiddel genaamd chloroquinefosfaat. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen genaamd 'anti-malaria's'.

'Anti-malaria's' kunnen in bepaalde delen van de wereld worden ingenomen om malaria te helpen voorkomen. Dit is een ernstige ziekte die wordt verspreid door geïnfecteerde muggen. Avloclor zal enige mate van bescherming bieden (profyaxe) tegen malaria in bepaalde landen.

Geneesmiddelen om malaria te helpen voorkomen (malariaprofyaxe) worden aanbevolen voor:

- Mensen die naar landen reizen waar malaria voorkomt.
- Mensen die in malaria-gebieden wonen en niet immuun zijn voor malaria.

Deze mensen hebben weinig of geen immuniteit tegen malaria, dus lopen ze risico op ernstige aanvallen.

U moet medisch advies inwinnen over welke anti-malariamiddelen u moet nemen. U moet vragen aan uw arts of apotheker of Avloclor geschikt is voor het deel van de wereld dat u bezoekt. In sommige landen moet u Avloclor met een ander geneesmiddel innemen voor maximale bescherming.

Het vermijden van muggenbeten

Wanneer u dit geneesmiddel gebruikt om malaria te voorkomen, moet u ook de kans verkleinen om door muggen gebeten te worden.

- Draag lichtgekleurde, lange mouwen en lange broeken wanneer u na zonsondergang buiten bent.
- Gebruik insectenwerende crèmes of sprays op delen van uw lichaam die niet bedekt zijn door kleding.
- Slaap in een goed afgeschermd kamer of onder een klamboe.
- Spray om eventuele muggen te doden die de kamers zijn binnengekomen ondanks de afscherming.

Tekenen van malaria

Geen enkel medicijn kan gegarandeerd beschermen tegen malaria in elk geval. Als u een hoge temperatuur (koorts) heeft tijdens uw bezoek aan een malaria-gebied, of tot een jaar na terugkeer

thuis, moet u malaria vermoeden. Neem direct contact op met een arts en laat hem of haar weten

dat u een malaria-gebied heeft bezocht.

2. Wat u moet weten voordat u Avloclor

inneemt Neem Avloclor

- niet in als: Avloclor Avloclor Sectie 6: Inhoud van de verpakking en overige informatie).
- Sectie 6: Inhoud van de verpakking en andere informatie). Avloclor kan het risico op onregelmatige hartslagen (cardiale aritmieën) verhogen wanneer het gelijktijdig met amiodaron wordt ingenomen. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u uw medicijn inneemt als:

- U ooit epilepsie, convulsies of aanvallen heeft gehad.
- U ooit problemen met uw lever of nieren heeft gehad.
- U ooit te horen heeft gekregen dat u een zeldzame ziekte van het bloedpigment heeft genaamd 'porfyrie' of iemand in uw familie het heeft. Dit komt omdat Avloclor ernstige symptomen van porfyrie kan veroorzaken, vooral als u alcohol drinkt.
- U een schilferige huidaandoening heeft genaamd psoriasis.
- U een spierprobleem heeft genaamd 'myasthenia gravis'. Avloclor kan de symptomen van deze aandoening verergeren. Het kan ook het effect verminderen van medicijnen die worden gebruikt om deze aandoening te behandelen (neostigmine en pyridostigmine).
- U een bloedprobleem heeft genaamd 'glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie'.

Avloclor kan bloedcellen beschadigen bij mensen met deze bloedconditie.

Chloroquine kan een verlaging van het bloedsuikergehalte veroorzaken. Vraag uw arts om u te informeren over de tekenen en symptomen van een laag bloedsuikergehalte. Een controle van het bloedsuikergehalte kan nodig zijn.

Chloroquine kan bij sommige patiënten hartritmestoornissen veroorzaken: voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van chloroquine, als u geboren bent met of een familiegeschiedenis heeft van verlengde QT-interval, als u een verworven QT-verlenging heeft (zichtbaar op ECG, elektrische registratie van het hart), als u hartstoornissen heeft of een geschiedenis van hartaanval (myocardinfarct) heeft, als u een zout onbalans in het bloed heeft (vooral een laag kalium- of magnesiumgehalte, zie rubriek "Andere geneesmiddelen en Avloclor").

Als u hartkloppingen of een onregelmatige hartslag ervaart tijdens de behandelingsperiode, moet u onmiddellijk uw arts informeren. Het risico op hartproblemen kan toenemen met een verhoging van de dosis. Daarom moet de aanbevolen dosering worden gevolgd.

Sommige mensen die met chloroquine worden behandeld, kunnen geestelijke gezondheidsproblemen ervaren zoals irrationele gedachten, hallucinaties, verwardheid, agressiviteit, paranoia, depressieve gevoelens of gedachten aan zelfbeschadiging of zelfmoord, zelfs als u nooit eerder soortgelijke problemen heeft gehad. Als u of anderen om u heen een van deze bijwerkingen opmerken (zie rubriek 4), zoek dan onmiddellijk medisch advies.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Avloclor.

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertel het medisch personeel dan dat u Avloclor.

Als u in een land woont waar malaria voorkomt, bent u mogelijk al enigszins immuun voor de ziekte. U moet een arts of apotheker om advies vragen voordat u anti-malariamiddelen inneemt.

Andere geneesmiddelen en Avloclor

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, recent heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken. Dit omvat geneesmiddelen die u zonder recept koopt en kruidengeneesmiddelen. geneesmiddelen.

Amiodaron (gebruikt om de hartslag te controleren) mag niet gelijktijdig worden ingenomen met Avloclor (zie sectie 2: wat u moet weten voordat u Avloclor inneemt).

Vertel uw arts of apotheker als u een van de volgende medicijnen gebruikt. Dit is omdat Avloclor de hoeveelheid van deze medicijnen in uw bloed kan beïnvloeden.

- Praziquantel (gebruikt om infecties van de darmen en blaas veroorzaakt door parasieten te behandelen).
- Ciclosporine (voornamelijk gebruikt door transplantatiepatiënten maar ook gebruikt om reumatoïde artritis en psoriasis te behandelen).
- Anti-convulsieve medicijnen (gebruikt om aanvallen of stuipen te voorkomen).
- Digoxine (gebruikt om hartproblemen te behandelen).

Vertel ook uw arts of apotheker als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

- Medicijnen waarvan bekend is dat ze het ritme van uw hart beïnvloeden. Dit omvat medicijnen die worden gebruikt voor abnormale hartritmes (antiarritmica), voor depressie (tricyclische antidepressiva) voor psychiatrische stoornissen (antipsychotica), voor bacteriële infecties of tegen malaria (bijv. halofantrine).
- Azithromycine, clarithromycine of erytromycine (antibiotica gebruikt voor het behandelen van infecties). Het gelijktijdig innemen van deze medicijnen met chloroquine kan de kans vergroten dat u bijwerkingen krijgt die uw hart beïnvloeden.

- Mefloquine (ingenomen om malaria te voorkomen) kan het risico op stuipen of aanvallen verhogen wanneer het gelijktijdig wordt ingenomen met Avloclor.
- Medicijnen gebruikt voor de behandeling van epilepsie, aangezien Avloclor hun effectiviteit kan verminderen.
- Agalsidase (gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Fabry), aangezien Avloclor de activiteit ervan kan verminderen.
- Cimetidine (gebruikt voor de behandeling van maagproblemen). Dit medicijn beïnvloedt hoe Avloclor door uw lichaam wordt afgebroken en kan de hoeveelheid Avloclor in uw bloed beïnvloeden. in uw bloed.
- Levothyroxine (schildkliermedicijn).
- Geneesmiddelen zoals kaolien (gebruikt voor diarree) die 'adsorbentia'.
- Antacida (aluminium, calcium en magnesiumzouten die worden gebruikt om brandend maagzuur of indigestie te behandelen).

Adsorbentia en antacida kunnen de hoeveelheid Avloclor die uit uw darm wordt opgenomen verminderen. Dit kan betekenen dat de volledige dosis Avloclor niet in uw lichaam wordt opgenomen en het zal niet goed werken. Daarom moet u deze geneesmiddelen ten minste vier uur voor of na inname van uw Avloclor dosis innemen.

Sommige medicijnen (bijvoorbeeld ciprofloxacin, cimetidine, omeprazol, pyrimethamine) kunnen de hoeveelheid Avloclor in uw lichaam verhogen en dit kan bijwerkingen veroorzaken. Het is belangrijk dat u geen extra medicijnen inneemt (zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven) voordat u met uw arts spreekt.

Als u een vaccinatie tegen hondsdolheid nodig heeft, zorg ervoor dat u deze krijgt voordat u met uw anti-malariamiddel begint. Als u uw hondsdolheidinjectie krijgt terwijl u uw anti-malariamiddel neemt, kan uw hondsdolheidvaccin mogelijk minder goed werken.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of zwanger kunt worden, praat met een arts of apotheker:

- voordat u Avloclor inneemt,
- voordat u een medicijn inneemt om malaria te voorkomen,
- en voordat u naar een land gaat waar malaria voorkomt.

Borstvoeding

- Als u borstvoeding geeft, praat met een arts of apotheker voordat u Avloclor.
- Hoewel Avloclor komt in de moedermelk terecht, maar de hoeveelheid is niet genoeg om uw baby tegen malaria te beschermen. Daarom moet uw baby nog steeds anti-malariamiddelen krijgen. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Autorijden en het gebruik van machines

Soms Avloclor bij u gebeurt, mag u niet autorijden of gereedschap of machines gebruiken.

3. Hoe te gebruiken

Avloclor Neem altijd

Avloclor Avloclor u heeft verteld. U moet uw arts of apotheker raadplegen als u het niet zeker weet.

Wanneer u uw medicijn moet beginnen in te nemen

Begin met het innemen van dit medicijn een week voordat u het malariagebied betreedt.

- U moet het blijven innemen tijdens uw verblijf.
- U moet dit medicijn 4 weken blijven innemen nadat u het malariagebied heeft verlaten.
- Volwassenen en kinderen ouder dan 14 jaar

Volwassenen en kinderen ouder dan 14 jaar

- Neem twee Avloclor tabletten eenmaal per week op dezelfde dag elke week.

Ouderen

- Als u een oudere persoon bent, kan uw arts voorstellen dat u bloedonderzoeken laat doen.
Uw arts
- kan ook besluiten u een andere dosis te geven.

Kinderen

Geef geen Avloclor aan kinderen jonger dan 1 jaar. Voor kinderen ouder dan 1 jaar is de dosis afhankelijk van de leeftijd van het kind.

- Leeftijden 1 tot 4 jaar: Neem een halve Avloclor tablet eenmaal per week (op dezelfde dag elke week).
- Leeftijden 5 tot 8 jaar: Neem één Avloclor tablet eenmaal per week (op dezelfde dag elke week).
- Leeftijden 9 tot 14 jaar: Neem anderhalve Avloclor tabletten eenmaal per week (op dezelfde dag elke week).

Hoe u uw tabletten moet innemen

- Neem de tablet(ten) na de maaltijd in.
- Slik de tablet(ten), of delen van tabletten, in hun geheel door met een glas water.

Als u meer Avloclor tabletten inneemt dan u zou moeten

Als u per ongeluk meer Avloclor tabletten inneemt dan u zou moeten, vertel dit dan onmiddellijk aan een arts. De volgende effecten kunnen optreden: hartproblemen – leidend tot onregelmatige hartslagen.

Als u vergeet uw Avloclor tabletten in te nemen

- Als u een dosis Avloclor vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert.
- Wacht dan 7 dagen voordat u de volgende dosis van Avloclor.
- Blijf uw Avloclor tabletten elke week innemen, op deze nieuwe dag van de week.

Stoppen met Avloclor

Stop alleen met het innemen van Avloclor vier weken na het verlaten van het malaria-gebied of als uw arts u dat vertelt te doen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag het uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Avloclor bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze krijgt.

Ernstige bijwerkingen

Als u een van de volgende bijwerkingen ervaart, stop dan met het innemen van Avloclor en zoek medische

hulp of neem direct contact op met uw arts.

- Allergische reacties waaronder ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel wat slikproblemen en een jeukende uitslag kan veroorzaken (vergelijkbaar met netelroos of galbulten)
- Een ernstige uitslag met blaren of vervelling van de huid en mogelijk blaren in de mond en neus.
- Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties) (zeldzaam).
- Hartspierziekte (cardiomyopathie) die fataal kan zijn in geval van hoge dosis langdurig gebruik. Zie rubriek 2, waarschuwingen en voorzorgen (zeldzaam).
- Abnormaal hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme (te zien op ECG). Zie rubriek 2, Waarschuwingen en voorzorgen (frequentie niet bekend).
- Leverproblemen die geelzucht van uw huid of het wit van uw ogen kunnen veroorzaken. Als u Avloclor langdurig gebruikt, kan uw arts voorstellen dat u bloedonderzoek laat doen om te controleren hoe goed uw lever functioneert (zeldzaam).
- Ontsteking van de longen die een aandoening veroorzaakt die bekend staat als diffuse parenchymateuze longziekte.

Als u ernstige kortademigheid ontwikkelt of verergering van kortademigheid zoek onmiddellijk medische advies.

- Convulsies of aanvallen.
- Gedeeltelijk of volledig verlies van gezichtsvermogen.
- Veranderingen aan het netvlies van uw oog (retinopathie) of aan het hoornvlies. Dit kan leiden tot 'vlekkerig' gezichtsvermogen.
- Een uitslag veroorzaakt door het medicijn geassocieerd met een toename van het aantal witte bloed cellen (dat kan blijken uit bloedonderzoeken) en symptomen die het hele lichaam betreffen. U kunt enkele of alle van de volgende symptomen opmerken: een huiduitslag en koorts, zwelling van het gezicht, gevoelige gegeneraliseerde gezwollen of vergrote lymfeklieren, of andere symptomen die wijzen op betrokkenheid van andere lichaamsorganen, waaronder de lever, nieren of longen (zoals geelzucht van de huid of ogen, urineproblemen, kortademigheid).
- Een verminderd aantal bloedcellen. Dit kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker blauwe plekken krijgt, ernstige infecties oploopt, plotselinge bloedingen krijgt of zich erg moe of kortademig voelt. Als u Avloclor langdurig gebruikt, kan uw arts voorstellen dat u bloedonderzoeken ondergaat.

Andere mogelijke bijwerkingen (frequentie niet bekend)

Wanneer Avloclor wordt gebruikt om malaria te voorkomen of te onderdrukken, zijn deze over het algemeen niet ernstig. Als Avloclor langdurig wordt gebruikt, kunnen ze ernstiger zijn.

Hart

- Veranderingen in de manier waarop uw hart werkt (bekend als 'elektrocardiografische veranderingen').
- Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u zich flauw of duizelig voelt.

Zenuwstelsel

- Hoofdpijn.
- Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd.
- Onvrijwillige spierbewegingen of spasmen.

Gedrag

- Slapeloosheid.
- Stemningsveranderingen of andere effecten op gedrag. Deze omvatten zich depressief voelen of gedachten aan zelfbeschadiging of zelfmoord, zich angstig voelen, zich verward voelen, irrationele gedachten hebben, paranoia, agressiviteit, slaapstoornissen, agitatie, zich opgewekt of overenthousiast voelen, gebrek aan concentratie.

Huid

- Huiduitslag, inclusief een schilferige uitslag (psoriasis) of jeuk.
- Schilferende huid.
- Verkleuring van de huid of slijmvliezen (zoals de binnenkant van uw mond).
- Gevoeligheid voor zonlicht die medische behandeling kan vereisen.
- Het verschijnen van kleine met vocht gevulde bultjes op de huid.

Haar

- Veranderingen in haarkleur.
- Haaruitval.

Ogen

- Wazig zicht.
- Problemen met uw kleur zicht.
- Moeite met focussen je ogen.
- Dubbelzien.

Als u Avloclor langdurig gebruikt, kan uw arts voorstellen dat u oogtesten ondergaat.

Oren

- Gehoorverlies.
- Oorsuizen (tinnitus).

Maag en darmen

- Maagklachten, misselijkheid, overgeven, diarree of maagkrampen.

Overige

- Verzwakking van uw spieren (neuromyopathie en myopathie).

- Verlaging van het bloedsuikergehalte.

Melden van bijwerkingen

Als u bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit omvat ook mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. U kunt bijwerkingen ook direct melden via internet op www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store. Door bijwerkingen te melden effecten u kunt helpen meer informatie te geven over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe te bewaren Avloclor

- Bewaar dit medicijn buiten het zicht en bereik van kinderen. Uw medicijn kan hen schaden.
- Bewaar uw medicijn niet boven 30o C.
- Bescherm de tabletten tegen licht en vocht.
- Bewaar de tabletten in de verpakking waarin ze zijn geleverd.
- Neem Avloclor niet na de vervaldatum die op de doos staat vermeld. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen mogen niet via afvalwater of huishoudelijk afval worden weggegooid. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen die niet meer nodig zijn kunt weggooiden. Dit zal helpen om het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat Avloclor Tabletten bevatten

- De werkzame stof in Avloclor Tabletten is chloroquinefosfaat. Elke tablet bevat 250 mg chloroquinefosfaat (equivalent aan 155 mg chloroquinebase).
- De andere ingrediënten zijn magnesiumstearaat (E572) en maïszetmeel.

Hoe Avloclor Tabletten eruitzien en inhoud van de verpakking

Avloclor Tabletten zijn wit en rond. Ze hebben een breuklijn aan één kant en de letter 'A' aan beide zijden van de lijn. Avloclor Tabletten worden geleverd in verpakkingen van 20 tabletten.

Vergunning Houder en Fabrikant De Vergunning

De marketing Vergunning voor Avloclor Tabletten wordt gehouden door Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, VK.

Avloclor Tabletten worden vervaardigd door AndersonBrecon (UK) Limited, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5PG VK.

Om te luisteren naar of een kopie van deze bijsluiter in braille, groot lettertype of audio aan te vragen, kunt u

gratis bellen:

0800 198 5000 (alleen VK)

Houd de volgende informatie bij de hand:

Productnaam Avloclor Tabletten

Referentienummer 16853/0143

Dit is een dienst van het Royal National Institute of blind people.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2022.

© Alliance Pharmaceuticals Limited 2022

Avloclor, Alliance en bijbehorende apparaten zijn geregistreerde handelsmerken van Alliance Pharmaceuticals Limited

Transtoyou