

Pakendi infoleht: teave kasutajale
CIALIS 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
tadalafil

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab olulist teavet teie jaoks.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.

Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.

Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on CIALIS ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on CIALIS ja milleks seda ravimit kasutatakse?

CIALIS on mõeldud täiskasvanud meestele erektsioonihäirete raviks. See on seisund, kus mees ei suuda erektsiooni saavutada või hoida seda piisavalt kaua, et see sobiks seksuaalseks tegevuseks. CIALIS on näidanud, et see parandab oluliselt erektsiooni saavutamise võimet, mis sobib seksuaalseks tegevuseks. erektsioon, mis sobib seksuaalseks tegevuseks, tugevasti paraneb.

Oluline on teada, et CIALIS ei toimi, kui seksuaalset stimulatsiooni ei ole. Teie ja teie partner

peate teadma, et eelmäng on vajalik, nagu teeksite seda ka siis, kui te ei kasutaks ravimit erektsioonihäirete raviks. 2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline tadalafilile või mõne muu selle ravimi koostisosa suhtes.

- Neid aineid leiate jaotisest 6. Te kasutate orgaanilist nitraati mingil kujul või ravimit, mis vabastab lämmastikoksiidi
- (nagu amüülnitrit). See on ravimite rühm (nitraadid), mida kasutatakse stenokardia (valu rinnus) raviks. On tõestatud, et CIALIS tugevdab nende ravimite toimet. Kui te kasutate nitraati mingil kujul või ei ole kindel, kas te seda kasutate, rääkige sellest oma arstile. Teil on raske südamehaigus või olete viimase 90 päeva jooksul saanud südameinfarkti. Teil on viimase 6 kuu jooksul olnud insult.
- Teil on madal vererõhk või kõrge vererõhk, mis ei ole kontrolli all.
- Teil on kunagi olnud nägemise kaotus mitte-arteriaalse isheemilise
- Teil on madal vererõhk või kõrge vererõhk, mis ei ole kontrolli all.

- Teil on kunagi olnud nägemise kaotus mitteamarteriaalse isheemilise tõttu anterioorne nägemisnärv kahjustus (NAION), seisund, mida kirjeldatakse kui "halvatus silm".
- Te kasutate riociguati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (see on kõrge vererõhk kopsudes) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalse hüpertensiooni (see on kõrge vererõhk kopsudes verehüüvete tagajärjel) raviks. PDE5 inhibiitorid, nagu CIALIS, on näidanud selle ravimi vererõhku alandava toime suurendamist. Kui te kasutate riociguati või ei ole selles kindel, võtke ühendust oma arstiga.

Millal peaksite selle ravimiga olema eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arstiga enne selle ravimi kasutamist.

Olge teadlik, et seksuaalne aktiivsus võib olla riskantne südamehaigusega patsientidele, kuna see tegevus nõuab teie südamest lisapingutust. Kui teil on südamehaigus, rääkige sellest oma arstile.

Rääkige oma arstile enne tablettide võtmist, kui teil on üks järgmistest seisunditest:

- sirprakuline aneemia (punaste vereliblede häire),
- müeloom (luuüdi vähk),
- leukeemia (vererakkude vähk),
- teie peenise vääreng,
- raske maksaprobleem,
- raske neeruprobleem.

Ei ole teada, kas CIALIS on efektiivne patsientidel, kes

- vaagnapiirkonna operatsiooni läbi teinud,
- eesnäärme täielik või osaline eemaldamine, mille käigus on närviteed eesnäärmest läbi lõigatud (radikaalne mitte-närvisäästev prostatektoomia), on läbi viidud.

Kui märkate äkilist nägemise vähenemist või kaotust, või kui teie nägemine on moonutatud või hägune CIALIS-e kasutamise ajal, lõpetage CIALIS-e kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Äkiline kuulmise vähenemine või kuulmiskaotus on täheldatud mõnel patsiendil pärast tadalafiili kasutamist. Kuigi ei ole teada, kas need juhtumid on otseselt seotud tadalafiiliga, peate võtma ühendust oma arstiga niipea, kui märkate äkilist kuulmise vähenemist või kuulmiskaotust. märgib.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel kuni 18 aastat.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks CIALIS-ele veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate varsti teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile. Ärge võtke CIALIS-t, kui te juba võtate nitraate.

Mõned ravimid on mõjutatud CIALIS-est või võivad mõjutada, kuidas CIALIS

toimib. Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te juba võtate järgmisi ravimeid: alfablokaator (kasutatakse kõrge vererõhu või urineerimisprobleemide raviks, mis on seotud healoomulise

- alfa-blokaator (kasutatakse kõrge vererõhu või urineerimiskaebuste korral, mis on seotud healoomulise eesnäärme hüpertroofia raviks),
- teised ravimid kõrge vererõhu raviks,
- riotsiguaat,
- 5-alfa-reduktaasi inhibiitor (kasutatakse healoomulise eesnäärme hüperplaasia raviks),
- ravimid nagu ketokonasooli tabletid (seeninfektsiooni raviks) ja proteaasi inhibiitorid AIDS-i või HIV-infektsiooni raviks,
- fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin (ravimid krampide raviks),
- rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin või itrakonasool,
- muud erektsioonihäirete ravimeetodid.

Millele peaksite tähelepanu pöörama joomise ja alkoholiga?

Vaadake jaotist 3 teabe saamiseks alkoholi mõju kohta. Greibimahl võib mõjutada kui hästi CIALIS toimib ja seda tuleks ettevaatlikult võtta. Küsige oma arstilt lisateavet selle kohta.

Viljakus

Koertel, keda raviti, oli munandites vähem spermatootmist. Sperma vähenemist on täheldatud ka mõnel mehel. On ebatõenäoline, et need mõjud põhjustavad viljakuse puudumist. Juhtimisvõime ja masinate kasutamine viljakusele.

Kontrollige hoolikalt, kuidas te tablettidele reageerite, enne kui hakkate autot juhtima või masinat kasutama.

Mõned mehed, kes osalesid CIALIS-e kliinilistes uuringutes, teatasid pearinglusest. Kontrollige hoolikalt, kuidas te tablettidele reageerite, enne kui hakkate autot juhtima või masinat käsitsema.

CIALIS sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke ühendust oma arstiga enne selle ravimi võtmist.

CIALIS sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tableti kohta, mis tähendab, et see on põhimõtteliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kas teil on kahtlusi õige kasutamise osas? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

CIALIS tabletid on mõeldud ainult suukaudseks kasutamiseks meestele. Neelake tablett tervelt alla koos veega. Võite CIALIS-t võtta koos toiduga või ilma.

Soovitav annus on 5 mg üks kord päevas, iga päev umbes samal ajal. Teie arst võib sõltuvalt teie reaktsioonist CIALIS-le annust kohandada 2,5 mg-ni. See antakse 2,5 mg tableti kujul. Ärge võtke CIALIS-t sagedamini kui üks kord päevas.

CIALIS-e igapäevane kasutamine võib olla kasulik meestele, kes eeldavad seksuaalset aktiivsust kaks korda nädalas või sagedamini.

Kui võtate CIALIS-t iga päev, olete igal ajal 24 tunni jooksul võimeline saama erektsiooni, kui teid seksuaalselt stimuleeritakse. On oluline teada, et CIALIS ei toimi, kui seksuaalset stimulatsiooni ei ole. Teie ja teie partner peate teadma, et eelmäng on vajalik, nagu teeksite seda ka siis, kui te ei kasutaks ravimit erektsioonihäirete vastu.

Alkoholi joomine võib mõjutada teie võimet erektsiooni saada ja võib ajutiselt alandada teie vererõhku. Kui olete võtnud CIALIS-t või plaanite seda võtta, vältige liialdamist alkoholiga (vere alkoholisisaldus 0,08% või rohkem), kuna see võib suurendada pearingluse riski püsti tõustes.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Teavitage oma arsti. Teil võivad tekkida kõrvaltoimed, nagu kirjeldatud jaotises 4.

Kas unustasite seda ravimit kasutada?

Võtke oma annus niipea, kui meelde tuleb, kuid ärge võtke kahekordset annust, et unustatud tabletti kompenseerida. Te ei tohi võtta CIALIS-t rohkem kui üks kord päevas.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged kuni mõõdukad.

Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, lõpetage CIALIS-e võtmine ja otsige kohe meditsiinilist abi:

- Allergilised reaktsioonid, sealhulgas nahalööve (esineb mõnikord).
- Valu rinnus - ärge kasutage nitraate, vaid otsige kohe meditsiinilist abi (esineb mõnikord).
- Priapism, pikaajaline ja võimalik, et valulik erektsioon pärast CIALIS-e võtmist (esineb harva kui teil on selline erektsioon ja see kestab kauem kui 4 tundi, võtke kohe ühendust oma arstiga).
- Te ei pruugi äkki enam näha (esineb harva), moonutatud, hägune, udune keskne nägemine või äkiline nägemise vähenemine (sagedus teadmata).

Muud teatatud kõrvaltoimed on:

Sageli (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 10-st)

- peavalu, seljavalu, lihasvalu, valu kätes ja jalgades, näo punetus, ninakinnisus ja seedeprobleemid.

Mõnikord (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 100-st)

- pearinglus, kõhuvalu, iiveldus (oksendamine), refluks, hägune nägemine, silmavalu, hingamisraskused, vere esinemine uriinis, pikaajaline erektsioon, südamepekslemine, kiire pulss, kõrge vererõhk, madal vererõhk, ninaverejooks, kõrvade kohin, käte, jalgade või pahklude turse ja väsimustunne. Harva (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 1000-st)

minestamine, krambid ja mööduv mälukaotus, silmalaugude turse, punased silmad,

- äkiline kuulmise vähenemine või kaotus, nõgestõbi (sügelus punased triibud nahapinnal), peenise veritsus, vere esinemine spermas ja suurenenud higistamine. Südameatakk ja insult on samuti harva teatatud meestel, kes kasutavad CIALIS-t. Enamik neist higistamine.

Südameatakk ja insult on samuti harva teatatud meestel, kes kasutavad CIALIS-t. Enamik neist need mehed olid juba südameprobleemidega enne selle ravimi võtmist.

Harva on teatatud osalisest, ajutisest või püsivast nägemise vähenemisest või kadumisest ühes või mõlemas silmas.

Mõned teised kõrvaltoimed, mis esinesid harva meestel, kes võtsid CIALIS-t ja mida ei täheldatud kliinilistes uuringutes, on:

- migreen, paistes nägu, tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo ja kurgu paistetust, tõsine nahalööve, teatud häired, mis on seotud verevarustusega silmadesse, ebaregulaarne südamerütm, stenokardia ja äkksurm südame põhjustel.
- moonduvad, hägune, udune keskne nägemine või äkiline nägemise vähenemine (sagedus teadmata).

Kõrvaltoime peeringlus on sagedamini teatatud meestel üle 75 aasta, kes kasutavad CIALIS-t.

Kõhulahtisus on sagedamini teatatud meestel üle 65 aasta, kes kasutavad CIALIS-t.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest võite teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi kaudu, nagu on märgitud lisas V. Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast EXP. Seal on märgitud kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta niiskuse eest. Hoida temperatuuril alla 30°C.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi ega WC-potti ning ärge visake neid prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need vastutustundlikult ja need ei satu keskkonda. õigel viisil kõrvaldatakse need vastutustundlikult ja ei satu keskkonda 6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on tadalafiil. Iga tablett sisaldab 2,5 mg tadalafiili.

- Muud ained selles ravimis on:

- Tableti südamik: laktoosmonohüdraat (vt lõik 2 lõpus), kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalne tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat, vt lõik 2 „CIALIS sisaldab laktoosi“. Filmkate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, triatsetiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane rauaoksiid (E172), talk. Kuidas CIALIS välja näeb ja kui palju on pakendis?

CIALIS 2,5 mg on heleoranžikaskollane mandlikujuline filmkaetud tablett ja on ühel küljel märgistatud tähisega "C 2½".
koos "C 2½".

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland B.V, Papendorpseweg
Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland B.V, Papendorpseweg
83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

Tootja: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Hispaania.

Kõigi selle ravimi kohta käivate küsimuste korral võtke ühendust kohaliku esindajaga müügiloa hoidja:

België/Belgique/Belgien
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva
Eli Lilly Lietuvaė
Tel. +370 (5) 2649600
70

България
ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika
ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország
Lilly Hungária Kft.
Tel: + 36 1 328 5100

Taani
Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: +45 45 26 60 00

Malta
Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Saksamaa
Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Holland
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +372 6 817 280

Norra
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Kreeka
FARMASERV-LILLY A.E.B.E.
Tel: +30 210 629 4600

Austria
Eli Lilly Ges.m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

Hispaania
Lilly S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

Poola
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 440 33 00

Prantsusmaa
Lilly France
Tel: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal
Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

Horvaatia
Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

Rumeenia
Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Iirimaa
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Sloveenia
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0)1 580 00 10

Island
Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000

Slovakkia Vabariik
Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Itaalia
Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Soome
Oy Eli Lilly Finland Ab
Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Küpros
Phadisco Ltd
Tel: +357 22 715000

Rootsi
Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Läti
Eli Lilly (Suisse) S.A esindus Lätis
Tel: +371 67364000

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377
Seda pakendi infolehte uuendati viimati {KK/AAAA}

Lisateavet selle ravimi kohta leiate Euroopa

Ravimiameti veebisaidilt: <http://www.ema.europa.eu>.

Transtoyou