

Pakendi infoleht: teave kasutajale
CIALIS 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
tadalafiil

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab olulist teavet teie jaoks.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mis ei ole selles infolehes loetletud? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on CIALIS ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave.

1. Mis on CIALIS ja milleks seda ravimit kasutatakse?

CIALIS sisaldab toimeainet tadalafiili, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse fosfodi esteraasi inhibiitorid tüüp 5 nimetatakse.

CIALIS 5 mg kasutatakse meeste raviks, kellel on:

- erektsioonihäire. See on probleem, kui mees ei suuda saavutada või säilitada piisavalt pikka erektsiooni, mis sobib seksuaalseks tegevuseks. On leitud, et CIALIS parandab oluliselt võimet saavutada seksuaalseks tegevuseks sobiv erektsioon. paraneb. verel voolata teie peenisesse. See toob kaasa teie erektsiooni paranemise. CIALIS ei toimi kui teil ei ole erektsioonihäiret. On oluline teada, et CIALIS ei toimi erektsioonihäire raviks, kui seksuaalset stimulatsiooni ei ole. Teie ja teie partner peate teadma, et eelmäng on vajalik, nagu teeksite seda ka siis, kui te ei kasutaks ravimit erektsioonihäire jaoks. kuseteede sümptomid, mis on seotud tavalise seisundiga, mida nimetatakse healoomuliseks
- eesnäärme hüperplaasiaks. See tähendab, et eesnäärme nääre suureneb vanusega. Sümptomiteks on raskused urineerimisel, tunne, et põis ei ole täielikult tühi, ja sagedasem urineerimisvajadus, ka öösel. CIALIS parandab verevoolu eesnäärmesse ja põide ning lõdvestab nende lihaseid; see võib vähendada healoomulise eesnäärme hüperplaasia sümptomeid. On leitud, et CIALIS vähendab neid kuseteede sümptomeid 1 kuni 2 nädala jooksul pärast ravi algust. sümptomeid healoomulise eesnäärme hüperplaasia vähendamaks. On leitud, et CIALIS neid sümptomeid kuseteedes 1 kuni 2 nädala jooksul pärast ravi algust parandab.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

- Te olete allergiline tadalafiili või mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6
- Te kasutate orgaanilist nitraati mingil kujul või ravimit, mis vabastab lämmastikoksiidi (nagu amüülnitrit). See on rühm ravimeid (nitraadid), mida kasutatakse stenokardia (valu rinnus) raviks. On tõestatud, et CIALIS tugevdab nende ravimite toimet. Kui te kasutate nitraati mingil kujul või ei ole kindel, kas kasutate, rääkige sellest oma arstile nende ravimite toimet. Kui te kasutate nitraate mis tahes kujul või ei ole kindel teil on raske südamehaigus või olete viimase 90 päeva jooksul saanud infarkti.
- Te teil on viimase 6 kuu jooksul olnud insult.
- Te teil on madal vererõhk või kõrge vererõhk, mida ei ole kontrolli all.
- Teil on kunagi olnud nägemise kaotus mitte-arteriaalse isheemilise on madal vererõhk või kõrge vererõhk, mis ei ole kontrolli all.
- optilise neuropaatia tõttu. eesmine nägemishärvi kahjustus (NAION), seisund, mida kirjeldatakse kui "halvatust silm".
- Te kasutate riociguati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (see on kõrge vererõhk kopsudes) ja kroonilise tromboemboolilise pulmonaalse hüpertensiooni (see on kõrge vererõhk kopsudes verehüüvete tagajärjel) raviks. PDE5 inhibiitorid, nagu CIALIS, on näidanud selle ravimi vererõhku alandava toime suurendamist. Kui te kasutate riociguati või ei ole selles kindel, võtke ühendust oma arstiga.

Millal peaksite selle ravimiga olema eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arstiga enne selle ravimi kasutamist.

Olge teadlik, et seksuaalne aktiivsus võib olla riskantne südamehaigusega patsientidele, kuna see tegevus nõuab teie südamele lisapingutust. Kui teil on südamehaigus, rääkige sellest oma arstile.

Kuna healoomuline eesnäärme hüperplaasia ja eesnäärmevähk võivad omada samu sümptomeid, kontrollib teie arst teid eesnäärmevähi suhtes enne ravi alustamist CIALIS'ega CIALIS vastu Rääkige oma arstile enne tablettide võtmist, kui teil on mõni järgmistest seisunditest

Rääkige oma arstile enne tablettide võtmist, kui teil on mõni järgmistest seisunditest on teil:

- sirprakuline aneemia (punaste vereliblede häire)
- hulgimüeloom (luuüdi vähk),
- leukeemia (vererakkude vähk),
- teie peenise väärareng,
- raske maksaprobleem,
- raske neeruprobleem.

Ei ole teada, kas CIALIS on efektiivne patsientidel, kellel on:

- vaagnapiirkonna operatsioon läbi viidud,
- eesnäärme täielik või osaline eemaldamine, mille käigus on närviteed eesnäärmest läbi lõigatud (radikaalne mitte-närvisäästev prostatektoomia), läbi viidud.

Kui märkate äkilist nägemise vähenemist või kaotust, või kui teie nägemine on moonutatud või hägune CIALIS-e kasutamise ajal, lõpetage CIALIS-e kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Äkiline kuulmise vähenemine või kuulmiskaotus on täheldatud mõnel patsiendil pärast tadalafiili kasutamist. Kuigi ei ole teada, kas need juhtumid on otseselt seotud tadalafiiliga, peate võtma ühendust oma arstiga niipea, kui märkate äkilist kuulmise vähenemist või kuulmiskaotust. märgib.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel kuni 18 aastat.
CIALIS ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ja noorukitel kuni 18-aastastele.

Kas te kasutate veel muid ravimeid?

Kas te kasutate lisaks CIALIS-ile veel muid ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate varsti muid ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile. võimalus, et hakkate varsti muid ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile.

Ärge võtke CIALIS-t, kui te juba võtate nitraate.

Mõned ravimid on mõjutatud CIALIS-st või võivad mõjutada, kuidas CIALIS töötab. Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te juba võtate järgmisi ravimeid:

- alfablokaator (kasutatakse kõrge vererõhu või urineerimisprobleemide raviks, mis on seotud healoomulise eesnäärme hüpertroofiaga),
- muud ravimid kõrge vererõhu raviks,
- riociguat,
- 5-alfa-reduktaasi inhibiitor (kasutatakse healoomulise eesnäärme hüperplaasia raviks), ravimid nagu ketokonasooli tabletid (kasutatakse seeninfektsiooni raviks) ja proteaasi inhibiitorid AIDS-i või HIV-infektsiooni raviks,
- fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin (ravimid krampide raviks),
- rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin või intrakonasool,
- muud erektsioonihäirete ravimeetodid.

Millele peaksite tähelepanu pöörama joomise ja alkoholiga?

Vaadake jaotisest 3 teavet alkoholi tarbimise mõju kohta. Greibimahl võib mõjutada kui hästi CIALIS töötab ja seda tuleks ettevaatlikult võtta. Küsige oma arstilt rohkem teave selle kohta.

Viljakus

Ravitud koertel oli munandites vähenenud seemnerakkude tootmine. Vähenemine seemnerakkudes on täheldatud ka mõnel mehel. On ebatõenäoline, et need mõjud põhjustavad viljakuse puudumist. viljakuse puudumist.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Mõned mehed, kes osalesid CIALIS kliinilistes uuringutes, teatasid peeringlusest. Kontrollige hoolikalt, kuidas te tablettidele reageerite, enne kui hakkate autot juhtima või masinat kasutama. CIALIS sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi võtmist ühendust oma arstiga.

CIALIS sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tableti kohta, mis tähendab, et see on põhimõtteliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kas teil on kahtlusi õige kasutamise osas? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

CIALIS tabletid on mõeldud ainult suukaudseks kasutamiseks meestele. Neelake tablett tervelt alla koos veega. Võite CIALIS-t kasutada koos toiduga või ilma.

Alkoholi joomine võib ajutiselt alandada teie vererõhku. Kui olete CIALIS-t võtnud või kui te kavatsete CIALIS-t võtta, vältige liigset joomist (alkoholi sisaldus veres 0,08% või rohkem), kuna see võib suurendada peeringluse riski püsti tööstes.

Erektsioonihäirete ravi jaoks

Soovitav annus on 5 mg üks kord päevas, iga päev umbes samal ajal.

Teie arst võib sõltuvalt teie reaktsioonist CIALIS-le annust 2,5 mg-ni kohandada. See antakse 2,5 mg tabletina. Ärge võtke CIALIS-t sagedamini kui üks kord päevas.

Kui võtate CIALIS-t üks kord päevas, olete igal ajal 24 tunni jooksul võimeline saama erektsiooni, kui teid seksuaalselt stimuleeritakse. CIALIS-e igapäevane kasutamine võib olla kasulik meestele, kes eeldavad, et nad on seksuaalselt aktiivsed kaks korda nädalas või sagedamini. On oluline teada, et CIALIS ei toimi, kui seksuaalset stimulatsiooni ei ole. Teie ja teie partner peavad teadma, et eelmäng on vajalik, nagu teeksite, kui te ei kasutaks erektsioonihäirete ravimit. kasutama.

Healoomulise eesnäärme hüperplaasia ravi jaoks

Annus on üks 5 mg tablett, mida võetakse üks kord päevas umbes samal ajal.

Kui teil on healoomuline eesnäärme hüperplaasia ja erektsioonihäire, jääb annus üheks 5 mg tabletiks päevas. Ärge võtke CIALIS-t sagedamini kui üks kord päevas.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Teavitage oma arsti. Teil võivad tekkida kõrvaltoimed, nagu on kirjeldatud jaotises 4.

Kas unustasite seda ravimit kasutada?

Võtke oma annus niipea, kui see teile meenub, kuid ärge võtke kahekordset annust, et unustatud tabletti tasa teha. Te ei tohi CIALIS-t võtta rohkem kui üks kord päevas.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi mitte kõigil ei pruugi need esineda. Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged kuni mõõdukad.

Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, lõpetage CIALIS-e võtmine ja otsige ja otsige kohe meditsiinilist abi:

- Allergiline reaktsioon, sealhulgas nahalööve (esineb mõnikord).
- Valu rinnus - ärge kasutage nitraate, vaid otsige kohe meditsiinilist abi (esineb mõnikord).
- Priapism, pikaajaline ja võimalik, et valulik erektsioon pärast CIALIS-e võtmist (esineb harva). Kui teil on selline erektsioon ja see kestab kauem kui 4 tundi, võtke kohe ühendust oma arstiga.
- Võite äkki nägemise kaotada (esineb harva), moonutatud, hägune, udune keskne nägemine või äkiline nägemise vähenemine (sagedus teadmata).

Muud teatatud kõrvaltoimed on:

Sageli (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 10-st)

- peavalu, seljavalu, lihasvalu, valu kätes ja jalgades, näo punetus, ninakinnisus ja seedehäired.

Mõnikord (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 100-st)

- peapööritus, kõhuvalu, iiveldus (oksendamine), refluks, hägune nägemine, silma valu, raskused hingamine, vere esinemine uriinis, pikaajaline erektsioon, südamepekslemine, kiire südame löögisagedus, kõrge vererõhk, madal vererõhk, ninaverejooksud, kõrvade kohin, käte turse, jalad või pahklud ja väsimustunne.

Harva (esineb vähem kui 1-l patsiendil 1000-st)

- minestamine, krampid ja mööduv mälukaotus, silmade turse, punased silmad, äkiline kuulmise vähenemine või kaotus, nõgestõbi (sügelus punased triibud nahapinnal), peenise verejooks, vere olemasolu spermas ja suurenenud higistamine.

Südameatakk ja insult on samuti harva teatatud meestel, kes kasutavad CIALIS-t. Enamik neist meestest oli juba südameprobleemidega enne selle ravimi võtmist.

Harva on teatatud osalisest, ajutisest või püsivast nägemise vähenemisest või kaotusest ühes või mõlemas silmas.

Mõned teised kõrvaltoimed, mis esinesid harva meestel, kes võtsid CIALIS-t ja mida ei täheldatud kliinilistes uuringutes, on:

- migreen, paistes nägu, tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo ja kurgu turset, tõsine nahalööve, teatud häired, mis on seotud verevarustusega silmadesse, ebaregulaarne südametegevus, stenokardia ja äkiline südamega seotud surm.
- moonunenud, hägune, udune keskne nägemine või äkiline nägemise vähenemine (sagedus teadmata).

Kõrvaltoime pearinglus on sagedamini teatatud meestel üle 75 aasta, kes kasutavad CIALIS-t. Kõhulahtisus on sagedamini teatatud meestel üle 65 aasta, kes kasutavad CIALIS-t.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi kaudu, nagu on märgitud lisas V. Kõrvaltoimete teatamisega saate aidata meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Hoida temperatuuril alla 25°C.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need vastutustundlikult ja need ei satu keskkonda. pakendisisu ja muu teave õige.

6. Selle ravimi toimeaine on

tadalafiil

- . Iga tablett sisaldab 5 mg tadalafiili. Iga tablett sisaldab 5 mg tadalafiil.
- Selle ravimi teised ained on:
Tableti südamik: laktoosmonohüdraat (vt lõik 2), kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalne tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat, vt lõik 2 „CIALIS sisaldab laktoosi“.
- Filmkate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, triazetiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), talk.

Kuidas CIALIS välja näeb ja kui palju on pakendis?

CIALIS 5 mg on helekollane mandlikujuline filmkatttega tablett ja on ühel küljel märgistatud "C 5".

CIALIS 5 mg on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 14, 28 või 84 tabletti.

Mitte kõiki nimetatud pakendi suurusi ei turustata.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland B.V, Papendorpseweg
83, 3528 BJ Utrecht, Holland

Tootja: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Hispaania.

Kõigi selle ravimi kohta käivate küsimuste korral võtke ühendust müügiloa hoidja kohaliku esindajaga: Belgia

/Belgique/Belgien Belgia
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tel/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Bulgaaria
TP"Eli Lilly Nederland" B.V.- Bulgaaria
tel. + 359 2 491 41 40

Tšehhi vabariik
ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Taani
Eli Lilly Danmark A/S
Tel: +45 45 26 60 00

Saksamaa
Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +372 6 817 280

Ελλάδα
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥΑ.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

España
Lilly S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

Prantsusmaa
Lilly Prantsusmaa

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Horvaatia

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

Iirimaa

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Leedu

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

Luksemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Ungari

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Rumeenia

Eli Lilly Rumeenia S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Sloveenia
Eli Lilly farmatseutiline ettevõtte, d.o.o.
Tel: +386 (0)1 580 00 10
76

Island
Slovenská vabariik
Icepharma hf.
Telefon: + 354 540 8000

Itaalia
Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

KüprosPhadisco
Ltd Tel
: +357 22 715000Läti

Läti
Eli Lilly (Suisse) S.A Esindus Lätis
Tel: +371 67364000

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Soome
Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250
Rootsi

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Seda pakendi infolehte uuendati viimati {KK/AAAA}

Lisateavet selle ravimi kohta leiate Euroopa
Ravimiameti veebisaidilt: <http://www.ema.europa.eu>.