

Pakkausseloste: tietoa potilaalle

Kodeiinifosfaatti Costero 10 mg, tabletit
Kodeiinifosfaatti Costero 15 mg, tabletit
Kodeiinifosfaatti Costero 20 mg, tabletit
Kodeiinifosfaatti Costero 30 mg, tabletit
kodeiinifosfaattihemihydraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle tai lapsellesi. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota siinä tapauksessa yhteyttä teidän lääkäri tai apteekkari.

Sisältö tästä tämä pakkausseloste

1. Mikä on Kodeiinifosfaatti Costero ja mihin tätä lääkettä käytetään?
2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?
3. Kuinka käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mikä on Kodeiinifosfaatti Costero ja mihin tätä lääkettä käytetään?

Tämä lääke sisältää kodeiinia. Kodeiini kuuluu heikkojen kipulääkkeiden ryhmään. Sitä voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden kipulääkkeiden, kuten parasetamolin, kanssa. Tätä lääkettä käytetään myös yskän oireiden hoitoon (yskän hillitsemiseksi). Sitä voidaan käyttää myös ripulin oireiden hoitoon (vaikutus suolistoon).

Tätä lääkettä käytetään:

lyhyeen keuhkokuumeen kivun hoitoon, joka ei lieviy muilla kipulääkkeillä, kuten pelkällä parasetamolilla tai pelkällä ibuprofeenilla, aikuisilla ja 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla.

kuivan yskän oireiden hoitoon, aikuisilla ja 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla.
ripulin oireiden hoitoon. Tämä koskee aikuisia, joille loperamidi (ripulilääke) ei ole toiminut hyvin.

2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

jos olet allerginen kodeiinifosfaatille tai jollekin tämän lääkkeen muulle aineelle. Nämä aineet löytyvät tämän pakkausselosteen kohdasta 6.

jos sinulla on hengitysvaikeuksia tai jos sinulla on muita pitkäaikaisia keuhkosairauksia.

jos sinua hoidetaan astman vuoksi.

jos sinulla on maksavaivoja.

jos juot liikaa alkoholia (alkoholismi).

jos sinulla on suurempi riski suoliston tukkeutumiseen.

jos sinulla on voimakkaita vatsakrampeja ja kipukohtauksia. Tämä johtuu sappikivistä. sappikivet.

sinulla on voimakasta ripulia. jos

olet saanut päävamman (esimerkiksi onnettomuuden seurauksena). Tai jos sinulla on ollut korkea aivopaine (voi aiheuttaa kipeitä silmiä, heikentyntä näköä tai päänsärkyä silmien takana). jos olette saanut päävamman (esimerkiksi onnettomuuden seurauksena). Tai jos teillä on ollut korkea paine aivoissa (voi aiheuttaa silmien kipua, näön heikkenemistä tai päänsärkyä silmien takana).

olet alle 12-vuotias. vähentämään

kipua leikkauksen jälkeen, jossa nielurisat (tonsillat) tai nenänielurisat (adenoidit) on poistettu. Tämä koskee lapsia ja nuoria alle 18-vuotiaita, johtuen obstruktiivisen uniapneasyndrooman riskistä. Tämä on vakava ja mahdollisesti kuolemaan johtava haittavaikutus, jossa kieli ja pehmeät kurkun osat voivat estää hengityksen. kivun lievittämiseen leikkauksen jälkeen, jossa nielurisat (tonsillat) tai kitarisat (adenoidit) on poistettu. Tämä koskee lapsia ja nuoria alle 18-vuotiaita, obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän riskin vuoksi. Tämä on vakava ja hengenvaarallinen haittavaikutus, jossa kieli ja pehmeät kurkun osat voivat estää hengityksen.

sinä imetat imetys antaa.

jos tiedät, että muutat tämän lääkkeen hyvin nopeasti morfiiniksi (aineenvaihdunnan kautta).

jos käytät monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä (ryhmä lääkkeitä vakavaan masennukseen). Tai jos olet käyttänyt lääkettä tästä ryhmästä viimeisten 14 päivän aikana.

Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos jokin seuraavista koskee sinua:

jos sinulla on ollut epileptisiä kohtauksia tai kouristuksia (lihasten kouristelu ja koko kehon nykiminen). Tämä on usein osa alkaen epileptistä kohtausta)jos sinulla on vakava mielenterveyshäiriö, jossa sinulla on ongelmia oman käyttäytymisesi ja toimintasi hallinnassa (toksinen psykoosi) sinulla on vakava mielisairaus, jossa sinulla on ongelma oman käyttäytymisesi ja toimintasi hallinnassa (toksinen psykoosi)

jos olet shokissa

jos sinulla on sydänongelma, erityisesti jos sydämesi lyö nopeammin kuin normaalisti (supraventrikulaarinen takykardia)

jos sinulla on astma tai hengitysvaikeuksia

jos sinulla on suolistosairaus, johon liittyy suoliston tulehdus, kuten verinen ripuli (pseudomembranoottinen koliitti)

jos olet äskettäin ollut maha-suolikanavan tai virtsateiden leikkauksessa

jos sinulla on äkillisiä vatsaoireita

jos sinulla on munuaissairaus tai maksasairaus

jos sinulla on sappikiviä tai sappirakon sairaus

jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia suurentuneen eturauhasen tai muun syyn vuoksi

jos korkea verenpaine johtuu lisämunuaisten turvotuksesta (feokromosytooma)

jos lisämunuaiset eivät toimi kunnolla (Addisonin tauti)

jos sinulla on lihassairaus. Lihaksesi ovat erittäin heikot (myastenia gravis)

jos sinulla on matala verenpaine tai jos kilpirauhasesi toimii liian hitaasti

jos sinulla on ollut ongelmia liiallisen alkoholin juomisen (alkoholismi), huumeiden väärinkäytön tai huumeriippuvuuden kanssa

jos olet raskaana taivutus

jos olet vanha tai terveydentilasi on heikko

Tämän lääkkeen käyttö voi aiheuttaa suoliston tukkeutumista. Siksi voi olla tarpeen käyttää yhdessä Kodeiinifosfaatin kanssa Costero laksatiivia, jotta ulostaminen helpottuisi. Tämä on mahdollista vain, jos et käytä Kodeiinifosfaattia Costero ripulin hoitoon.

Älä käytä tätä lääkettä pidempään kuin lääkärisi, apteekkarisi tai sairaanhoitajasi on neuvonut. Käytätkö tätä lääkettä säännöllisesti ja pitkään? Silloin et ehkä voi olla ilman tätä lääkettä (olet riippuvainen). Jos olet riippuvainen ja lopetat tablettien ottamisen äkillisesti, voit tulla levottomaksi ja ärtyneeksi. Jos otat säännöllisesti ja liian pitkään tai liikaa päänsärkyläkettä, päänsärky voi pahentua.

Kodeiini muuttuu maksassa entsyymien avulla morfiiniksi. Morfiini vastaa tämän lääkkeen vaikutuksesta. Se lievittää kipua ja yskän oireita. Joillakin ihmisillä on erilainen tyyppi tästä entsyymistä. Siksi tämä lääke voi vaikuttaa eri tavoin eri ihmisillä. Joillakin ihmisillä kodeiini ei muutu morfiiniksi tai vain hyvin vähän. Tämän vuoksi lääke ei riitä lievittämään kipua tai yskän oireita. Toisilla on suurempi riski saada vakavia sivuvaikutuksia, koska morfiinia muodostuu paljon. Jos saat jonkin seuraavista sivuvaikutuksista, sinun on lopetettava lääkkeen käyttö ja haettava välittömästi lääkärin apua: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta

Käyttö lapsilla ja nuorilla alle 18 vuotta leikkauksen jälkeen

Tätä lääkettä ei saa käyttää kivun lievittämiseen leikkauksen jälkeen, jossa poistetaan nielurisat (tonsillat) tai kitarisat (adenoidit). Tämä koskee lapsia ja nuoria alle 18 vuotta, koska on olemassa riski obstruktiiviselle uniapneasyndroomalle. Tämä on vakava ja hengenvaarallinen sivuvaikutus, jossa kieli ja pehmeät kurkun osat voivat estää hengityksen (katso kohta "Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?").

Käyttö lapsilla, joilla on hengitysvaikeuksia

Tätä lääkettä ei suositella lapsille, joilla on hengitysvaikeuksia. Morfiinimyrkytyksen oireet voivat olla pahempia näillä lapsilla.

Nuoret yli 12 vuotta

Tätä lääkettä ei suositella nuorille, joilla on hengitysvaikeuksia yskän hoitoon.

Tätä lääkettä ei suositella ripulin hoitoon lapsilla ja nuorilla alle 18 vuotta.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Kodeiinifosfaatin Costero lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai aiotko ehkä käyttää niitä pian? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Tee tämä erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä hoitoon:

masennus tai Parkinsonin tauti (monoamiinioksidaasin (MAO) estäjät, kuten moklobemidi, linezolid tai selegiliini). Kodeiinifosfaatti Costero ei saa käyttää yhdessä MAO-estäjien kanssa. Kodeiinifosfaatti Costero voidaan käyttää vasta kahden viikon kuluttua MAO-estäjien käytön lopettamisesta (katso kohta 'Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää').

masennukset (trisykliset masennuslääkkeet, kuten amitriptyliini)
pahoinvointi ovat ja oksentavat (metoklopramidi tai domperidoni)

epäsäännöllinen sydämenlyönti (meksiletiini tai kinidiini)
ripuli (loperamidi tai kaoliini)
mahaavaat (simetidiini)
korkea verenpaine
hiv-virus (kutenritonaviiri) allergiat
allergiat (antihistamiinit; tämä voi aiheuttaa uneliaisuutta)
hidas hitaasti sydämen rytmi (atropiini)
unilääkkeet (lääkkeet, jotka auttavat nukkumaan)
ärsytys, kiihtymys tai ahdistus (lääkkeet, jotka rauhoittavat sinua (sedatiivit) tai rauhoittavat aineet)
vakava kipu (voimakkaammat kipulääkkeet kuin kodeiinifosfaatti Costero)
kipu leikkausten aikana (lääkkeet puuduttamiseen (anesteetit))
myrkytys huumeista tai niiden riippuvuus (buprenorfiini, naltreksoni, naloksoni)
äkillinen nukahtaminen (narkolepsia) (natriumoksybataatti)

Kodeiinifosfaatin käyttö Costero yhdessä rauhoittavien lääkkeiden (kuten bentsodiatsepiinien tai muiden lääkkeiden, jotka vähentävät ahdistusta ja jännitystä) kanssa lisää riskiä uneliaisuuteen, hengitysvaikeuksiin (hengityslama) ja tajuttomuuteen (kooma). Tämä voi olla hengenvaarallista. Kodeiinifosfaatin käyttö Costero yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa tulisi harkita vain, jos muita hoitovaihtoehtoja ei ole. Suositteleeko lääkärisi tätä lääkettä yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa? Silloin annoksen tulisi olla mahdollisimman pieni ja lääkkeitä tulisi käyttää mahdollisimman lyhyen aikaa.

Kerro lääkäriillesi kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä. Noudata lääkärisi annosohjeita tarkasti. Voi olla hyödyllistä kertoa ystäville ja perheelle yllä mainituista oireista. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos saat näitä oireita.

Mihin sinun tulee kiinnittää huomiota alkoholin kanssa?
Älä juo alkoholia tämän lääkkeen käytön aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käytä tätä lääkettä vain, jos olet raskaana, jos se on todella tarpeen. Käytätkö tätä lääkettä säännöllisesti raskaana ollessasi? Tämä voi aiheuttaa vastasyntyneelle vieroitusoireita (fyysisiä ja henkisiä oireita) lääkkeen lopettamisen jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät. Kodeiini ja morfiini erittyvät äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tämä lääke voi aiheuttaa sekavuutta, uneliaisuutta, huimausta, hallusinaatioita (näet, tunnet tai kuulet asioita, joita ei ole olemassa), näön hämärtymistä tai kaksoiskuvia tai kouristuksia (lihasten kouristelu ja koko kehon nykiminen. Tämä on usein osa epileptistä kohtausta). Siksi tämä lääke voi vaikuttaa kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita. Etkö ole varma, onko turvallista ajaa autoa tämän lääkkeen käytön aikana? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi. Älä käytä koneita, jos et pysty keskittymään yhtä hyvin kuin normaalisti.

Kodeiinifosfaatti Costero sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että et siedä tiettyjä sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Kuinka käytät tätä lääkettä?

Ota tätä lääkettä aina täsmälleen siten kuin lääkärisi tai apteekkarisi on neuvonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi.

Suosittelun annostus on:

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset

Lievään tai kohtalaiseen kipuun:

30–60 milligrammaa (mg) enintään 4 kertaa päivässä (joka 6. tunti) tarpeen mukaan. Älä ota enempää kuin 240 mg 24 tunnin aikana.

Yskään:

15–30 mg, 3–4 kertaa päivässä.

Tätä lääkettä ei suositella yli 12-vuotiaille nuorille, joilla on hengitysvaikeuksia yskän hoitoon.

Ripuliin:

Tätä lääkettä ei suositella ripulin hoitoon alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Aikuiset: 15–60 mg, 3–4 kertaa päivässä.

Potilaat, joilla on maksasairaus tai munuaissairaus

Lääkärisi voi suositella pienempää annosta, jos sinulla on maksasairaus tai munuaissairaus. On erittäin tärkeää noudattaa lääkärisi ohjeita tässä tapauksessa.

Käyttötapa

Tämä lääke on tarkoitettu suun kautta otettavaksi. Niele tabletit lasillisen vettä kanssa.

Hoidon kesto

Tätä lääkettä ei saa käyttää pidempään kuin 3 päivää. Jos kipu ei ole vähentynyt 3 päivän jälkeen, ota yhteyttä lääkäriisi.

Oletko ottanut liikaa tätä lääkettä?

Oletko ottanut enemmän tätä lääkettä kuin lääkärisi on suositellut (tai onko joku muu ottanut lääkettäsi)? Ota heti yhteyttä lääkäriisi. Jos et saa yhteyttä lääkäriisi, mene lähimpään sairaalaan ja ota pakkaus mukaan.

Yliannostuksen oireita voivat olla: pahoinvointi, sekavuus, lihaskouristukset ja koko kehon kouristukset (kouristuskohtaus), huimaus, hermostuneisuus, levottomuus, kiihtyneisyys, asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen, joita ei ole (hallusinaatiot), lihasheikkous, uneliaisuus, väsymys, matala verenpaine, pupillien pieneneminen, hidas hengitys ja nopea syke.

Oletko unohtanut ottaa tämän lääkkeen?

Oletko unohtanut annoksen ja onko melkein aika seuraavalle annokselle? Jätä unohtunut annos väliin ja jatka normaalia annosteluajataulua.

Jos lopetat tämän lääkkeen ottamisen

Älä lopeta tablettien ottamista keskustelematta asiasta lääkärisi kanssa. Sinun tulee jatkaa hoitoa, jos lääkärisi katsoo sen tarpeelliseksi.

Jos lopetat äkillisesti, voi ilmetä seuraavia vieroitusoireita (lopettamisen aiheuttamia oireita): vapina, univaikeudet, levottomuus, ärtyneisyys, ahdistus, masennus, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, hikoilu, kyynelvuoto, vuotava nenä ja aivastelu, haukottelu, kananliha, pupillien laajeneminen, heikkouden tunne, kuume, lihaskrampit, kuivuminen, sydämen sykkeen kiihtyminen, nopeampi hengitys kuin normaalisti tai korkea verenpaine.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi.

4. Mahdolliset sivuvaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös tällä lääkkeellä voi olla sivuvaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä koe.

Harvoin (esiintyy alle yhdellä 1 000 käyttäjästä)

Vakava allerginen reaktio (anafylaksia). Tämä voi aiheuttaa kasvojen, kielen ja kurkun turvotusta, hengitysvaikeuksia tai sokin. Jos saat näitä oireita, lopeta lääkkeen ottaminen heti ja ota heti yhteyttä lääkäriisi.

Maha ja suolisto-ongelmat, jotka voivat aiheuttaa ummetusta (konsipaatiota) Suolistosairaus tulehduksilla (ei ehkä parane). Tämä voi aiheuttaa vatsakipua ja veristä ripulia

Tuntematon (ei voida määrittää käytettävissä olevien tietojen perusteella)

Allergiset reaktiot, kuten ihottuma, ihottuma vaaleanpunaisilla näppylöillä ja voimakas kutina (urtikaria), kutina, hengitysvaikeudet, normaalia enemmän hikoilua, punainen iho tai liiallinen punastuminen, turvonneet nilkat ja jalat

Tunteiden muuttuminen, masennus, asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen, joita ei ole (hallusinaatiot), levottomuus, hermostuneisuus, kiihtyneisyys tai rauhattomuus, painajaiset, sekavuus, olette niin sekaisin, ettette tunnista ihmisiä, paikkoja tai asioita (desorientaatio), totutte tähän lääkkeeseen (se toimii huonommin) tai teillä on tunne, ettette voi olla ilman tätä lääkettä, vähemmän halua seksiin

Uneliaisuus, teillä on huono olo tai ette voi hyvin, väsymys, huimaus, kohtaukset (lihasten kouristelu ja nykiminen koko kehossa, usein osana epileptistä kohtausta), päänsärky, erittäin matala ruumiinlämpö, korkea paine päässä (voi aiheuttaa kipeitä silmiä, heikentyntä näköä tai päänsärkyä silmien takana)

Pienet pupillit, näön hämärtyminen tai kaksoiskuvat

Sydämenlyönti hitaampi kuin normaalisti, sydämenlyönti nopeampi kuin normaalisti, sydämentykytys, nopea tai epäsäännöllinen syke

Pyörtyminen, matala verenpaine, matala verenpaine ylösnoustaessa, mikä voi aiheuttaa huimausta ja kaatumista

Hengitätte harvemmin, erityisesti tämän lääkkeen suuren annoksen ottamisen yhteydessä

Ummetus (voi esiintyä, jos käytätte tätä lääkettä pitkään), vatsakipu, haimatulehdus, pahoinvointi, oksentelu, kuiva suu

Tylsä kipu, kipu joka ei mene ohi tai kivuliaat kouristukset ylävatsassa (sappikoliikki) • Jäykät lihakset

Kipu virtsatessa, harvemmin virtsaaminen, vähemmän virtsaaminen, vaikeus virtsata

Vaikeus saada tai ylläpitää erektiota
Vähemmän ruokahalua
Yksi heikko tunne, väsynyt ovat
Vieroitusoireet tämän lääkkeen lopettamisen jälkeen, katso kohta "Kun lopetat tämän lääkkeen käytön"

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan. Lareb, verkkosivusto www.lareb.nl. Haittavaikutuksista ilmoittamalla autat meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Löydät sen pakkauksesta ja läpipainopakkauksesta merkinnän "EXP:" jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Tälle lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai wc:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeitä oikein, ne tuhoetaan asianmukaisesti eivätkä ne päädy ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muut tiedot

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

- Tämän lääkkeen vaikuttava aine on kodeiinifosfaattihemihydraatti

Kodeiinifosfaatti Costero 10 mg, tabletit

Jokainen tabletti sisältää 10 mg kodeiinifosfaattihemihydraatti, joka vastaa 7,37 mg kodeiinia.

Kodeiinifosfaatti Costero 15 mg, tabletit

Jokainen tabletti sisältää 15 mg kodeiinifosfaattihemihydraattia, joka vastaa 11,05 mg kodeiinia.

Kodeiinifosfaatti Costero 20 mg, tabletit

Jokainen tabletti sisältää 20 mg kodeiinifosfaattihemihydraattia, joka vastaa 14,73 mg kodeiinia.

Kodeiinifosfaatti Costero 30 mg, tabletit

Jokainen tabletti sisältää 30 mg kodeiinifosfaattihemihydraattia, joka vastaa 22,10 mg kodeiinia.

- Muut aineet tässä lääkkeessä ovat:

Mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, perunatärkkelys, kolloidinen vedetön piidioksidi, talkki, magnesiumstearaatti

Miltä Codeinefosfaatti Costero näyttää ja mitä pakkaus sisältää?

Codeinefosfaatti Costero 10 mg, tabletit

Valkoiset tai melkein valkoiset, pyöreät, kaksoiskuperat tabletit (halkaisija 6 mm), joissa on merkintä 'COD' yli '10' yhdellä puolella.

Codeinefosfaatti Costero 15 mg, tabletit

Valkoiset tai melkein valkoiset, pyöreät, kaksoiskuperat tabletit (halkaisija 7 mm), joissa on merkintä 'COD' yli '15' yhdellä puolella.

Codeinefosfaatti Costero 20 mg, tabletit

Valkoiset tai melkein valkoiset, pyöreät, kaksoiskuperat tabletit (halkaisija 8 mm), joissa on kaiverrus 'COD' yli '20' yhdellä puolella.

Kodeiinifosfaatti Costero 30 mg, tabletit

Valkoiset tai melkein valkoiset, pyöreät, kaksoiskuperat tabletit (halkaisija 9 mm), joissa on kaiverrus 'COD' yli '30' yhdellä puolella.

Kodeiinifosfaatti Costero 10 mg, 20 mg, tabletit

PVC/Alu läpipainopakkaus: 30 tablettia

HDPE-säiliö, jossa on lapsiturvallinen PP-kansi: 250 tablettia

Kodeiinifosfaatti Costero 15 mg, 30 mg, tabletit

PVC/Alu läpipainopakkaus: 10, 30 tablettia

On mahdollista, että kaikkia mainittuja pakkauskokoja ei tuoda markkinoille.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Costero B.V.

Olympiastadion 24

1076DE Amsterdam

Alankomaat

Valmistaja

Meditop Pharmaceutical Ltd.

Ady Endre katu 1

2097 Pilisborosjenő

Unkari

Tämä lääke on rekisteröity numerolla:

Kodeiinifosfaatti Costero 10 mg, tabletit - RVG 127423

Kodeiinifosfaatti Costero 15 mg, tabletit - RVG 127424

Kodeiinifosfaatti Costero 20 mg, tabletit - RVG 127425

Kodeiinifosfaatti Costero 30 mg, tabletit - RVG 127426

Tämä lääke on rekisteröity Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Tšekki: Kodeiini Schmid 10, 15, 20, 30 mg tabletit
Alankomaat: Kodeiinifosfaatti Costero 10, 15, 20, 30 mg, tabletit

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty huhtikuussa 2025

Transtoyou