

Condylox 0,5%-solución para uso externo GI

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Condylox 0,5% - solución para uso externo

Sustancia activa: Podofilotoxina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este

medicamento.

- Conserve el prospecto. Puede que desee leerlo de nuevo más tarde.
- Si tiene más preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento ha sido recetado exclusivamente para usted. No lo entregue a terceros. Puede ser perjudicial para otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.
- Si alguno de los efectos secundarios le afecta gravemente o si observa efectos secundarios no mencionados en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Este prospecto contiene:

1. ¿Qué es Condylox 0,5%-solución y para qué se utiliza?
2. ¿Qué debe tener en cuenta antes de usar Condylox 0,5%-solución?
3. ¿Cómo se debe usar Condylox 0,5%-solución?
4. ¿Qué efectos secundarios son posibles?
5. ¿Cómo se debe almacenar Condylox 0,5%-solución?
6. Más información

#### 1. ¿QUÉ ES CONDYLOX 0,5%-SOLUCIÓN Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

El principio activo podofilotoxina es el componente terapéuticamente activo del podofilino, la resina del rizoma de especies de Podophyllum (Berberidaceae).

La podofilotoxina inhibe la división celular y actúa como antiinflamatorio. Condylox 0,5%-solución se utiliza para verrugas genitales no inflamadas y no sangrantes (condilomas acuminados) en la zona genital externa de mujeres y hombres.

#### 2. ¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA ANTES DE USAR CONDYLOX 0,5%-SOLUCIÓN? TENER EN CUENTA?

si es hipersensible (alérgico) a la podofilotoxina o a alguno de los demás

- componentes de Condylox 0,5%-solución. en verrugas genitales inflamadas o sangrantes
- con el uso simultáneo de otras preparaciones que contengan podofilotoxina
- durante el embarazo y la lactancia en niños menores de 12 años
- Se requiere especial precaución al usar Condylox 0,5%-solución,
- ya que Condylox 0,5%-solución es exclusivamente para el tratamiento de verrugas genitales.

Se requiere especial precaución al usar la solución Condylox 0,5%,

- ya que la solución de Condylox al 0,5% se utiliza exclusivamente para el tratamiento de verrugas genitales. Condylox 0,5%-solución no debe aplicarse en otras verrugas o lunares. Debe evitarse el contacto con la piel sana.

- ya que Condyllox 0,5%-solución no debe entrar en contacto con los ojos. Si Condyllox 0,5%-solución entra en el ojo, se debe realizar un enjuague inmediato con agua y contactar al médico.
- en pacientes masculinos. Estos deben usar preservativos hasta la curación completa. La pareja sexual también debe ser examinada por un médico.

KLGU 24.02.2014 Página 1 de 4 Takeda Austria

Condyllox 0,5%-solución para uso externo GI

- ante los primeros signos de efectos secundarios y en caso de embarazo. Por favor, informe esto inmediatamente a su médico.
- No hay experiencia sobre el uso de Condyllox 0,5%-solución en adolescentes entre 12 y 18 años. Al usar Condyllox 0,5%-solución con otros medicamentos

Debe evitarse el tratamiento simultáneo con otros preparados que contengan podofilina, ya que estos también contienen podofilotoxina. Por favor, informe a su médico o farmacéutico si está tomando o usando otros medicamentos, o si los ha tomado o usado recientemente, incluso si se trata de medicamentos sin receta. Al usar Condyllox 0,5%-solución junto con alimentos y bebidas

Al usar Condyllox solución al 0,5% junto con alimentos y bebidas Durante el tratamiento se debe evitar el consumo de alcohol. La ingesta de alcohol durante la terapia puede llevar a una intensificación masiva de los efectos no deseados.

Embarazo y lactancia

Por favor, informe inmediatamente a su médico si queda embarazada.

La solución Condyllox 0,5% causa daños graves al feto si se utiliza durante el embarazo.

La solución Condyllox 0,5% no debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia.

Capacidad para conducir y manejar maquinaria

La solución Condyllox 0,5% no tiene o tiene una influencia insignificante en la capacidad para conducir y la habilidad para manejar maquinaria.

### 3. ¿CÓMO DEBE UTILIZARSE LA SOLUCIÓN CONDYLOX 0,5%?

Utilice siempre la solución Condyllox 0,5% exactamente según las indicaciones de su médico. Por favor, consulte a su médico o farmacéutico si no está completamente seguro.

La solución Condyllox 0,5% se utiliza para el tratamiento externo de las verrugas genitales.

El tratamiento con la solución Condyllox 0,5% puede realizarse en casa por usted mismo.

Solo en caso de una extensión extraordinariamente grande de las verrugas genitales (> 4cm<sup>2</sup>), cuando la dosis única exceda 0,5ml, el tratamiento debe ser realizado por personal médico.

Antes de aplicar la solución, lave cuidadosamente las áreas del cuerpo a tratar con agua y jabón y séquelas con cuidado.

Aplique la solución sobre las verrugas genitales con un hisopo de algodón. El hisopo de algodón solo debe usarse una sola vez!

Asegúrese de que la solución no entre en contacto con la piel o mucosa circundante.

No aplique la solución Condyllox 0,5% en otras verrugas.

Deje que la solución se seque durante unos minutos después de la aplicación.

No es necesario lavar nuevamente la solución Condyllox 0,5%.

Lávese bien las manos después de cada tratamiento.

La solución Condyllox 0,5% no debe usarse en niños menores de 12 años.

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo usa la solución Condyllox 0,5%?

A menos que su médico le indique lo contrario, siga exactamente la dosis prescrita.

El tratamiento con la solución Condyllox 0,5% se realiza 2 veces al día (con un intervalo de 12 horas) durante 3 días consecutivos.

Después, debe observarse un período sin tratamiento de 4 días.

El tratamiento con la solución Condyllox 0,5% debe repetirse hasta la desaparición de las verrugas genitales, siendo la duración máxima del tratamiento de 4 semanas.

Si después de 4 semanas no se observa éxito en el tratamiento, consulte inmediatamente a su médico tratante.

Si ha usado una cantidad mayor de la solución Condyllox 0,5% de la que debería

El riesgo de aparición de efectos no deseados aumenta con el tratamiento en áreas extensas con cantidades excesivas durante un período prolongado o al tratar áreas sangrantes o recientemente verrugas genitales eliminadas o en caso de aplicación accidental sobre piel o mucosa intacta.

Después de una sobredosis, la piel debe limpiarse a fondo con agua y jabón. Los ojos deben enjuagarse con agua.

Si olvidó aplicar la solución Condyllox 0,5%

No aplique una dosis doble si olvidó la aplicación anterior.

#### 4. ¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS SON POSIBLES?

Al igual que todos los medicamentos, la solución Condyllox 0,5% puede tener efectos secundarios, pero no necesariamente ocurren en todos.

Las irritaciones locales afectan al 35-40% de los pacientes y suelen ser leves a moderadas. Solo unos pocos pacientes tienen molestias más severas.

##### Efectos secundarios conocidos

Muy frecuentes (afectan a más de 10 de cada 100 tratados): irritaciones locales de la mucosa tratada como picazón, ardor, dolor, enrojecimiento, formación de úlceras, pérdida de la capa externa de la mucosa.

Efectos secundarios raros cuya frecuencia no se conoce: adherencias e inflamaciones del glande y del prepucio.

##### Notificación de efectos secundarios

Si nota efectos secundarios, consulte a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar de los efectos secundarios directamente a través del sistema nacional de notificación:

Oficina Federal de Seguridad en el Cuidado de la Salud  
Traisengasse 5  
A-1200 Viena  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Sitio web: <http://www.basg.gv.at/>

#### 5. ¿CÓMO DEBE ALMACENARSE CONDYLOX 0,5% SOLUCIÓN?

No almacenar a más de 25°C. Conservar en el envase original para proteger el contenido de la luz. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños. No debe usar el medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes.

Después de la primera apertura, Condyllox 0,5% solución es estable durante 6 semanas.

#### 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Qué contiene Condyllox 0,5% solución

- El principio activo es: Podofiloxina. 1 ml de solución contiene 5 mg de Podofiloxina.
- Los demás componentes son: ácido láctico, lactato de sodio y alcohol etílico.

Cómo se ve la solución Condyllox 0,5% y contenido del paquete

Frasco de vidrio marrón con cierre de rosca a prueba de niños de polipropileno contiene 3,5 ml de solución.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Takeda Austria GmbH  
St.-Peter-Straße 25  
4020 Linz  
Austria

Distribución:

G.L. Pharma GmbH, Lannach

Z.Nr.: 1-18963

Esta información del prospecto fue aprobada por última vez en febrero de 2014.