

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle
Desogestrel CF 0,075 mg, tabletit
desogestreeli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.

Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mitä Desogestrel CF 0,075 mg on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Kuinka käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Desogestrel CF 0,075 mg on ja mihin sitä käytetään?

Desogestrel CF 0,075 mg käytetään raskauden ehkäisyyn. Desogestrel CF 0,075 mg sisältää pienen määrän yhtä naissukupuolihormonia, progestageeni desogestreeliä. Siksi Desogestrel CF 0,075 mg:ää kutsutaan myös pelkkää progestageenia sisältäväksi pilleriksi. Pelkkää progestageenia sisältävät pillerit eivät sisällä estrogeenihormonia progestageenin lisäksi, toisin kuin yhdistelmäpillerit.

Useimpien vaikutus pelkkiä progestageenia sisältävien pillereiden vaikutus perustuu pääasiassa siihen, että ne estävät siittiöiden pääsyn kohtuun. Munasolun kypsymistä ei aina estetä. Tämä jälkimmäinen on yhdistelmäpillerin tärkein vaikutus. Desogestrel CF 0,075 mg eroaa useimmista pelkkiä progestageenia sisältävistä pillereistä, koska annos on tarpeeksi korkea estämään munasolun kypsymisen useimmissa tapauksissa. Desogestrel CF 0,075 mg on siten erittäin luotettava.

Toisin kuin yhdistelmäpillerit, Desogestrel CF 0,075 mg voidaan käyttää naisilla, jotka eivät siedä estrogeeneja, ja naisilla, jotka imettävät. Desogestrel CF 0,075 mg:n haittapuolena on, että kuukautisvuodot voivat esiintyä epäsäännöllisin väliajoin. On myös mahdollista, että nämä vuodot jäävät kokonaan pois.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai on oltava erityisen varovainen?

Kuten muut hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, Desogestrel CF 0,075 mg ei suojaa HIV-infektiolta (AIDS) tai muilta sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta (STI).

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

Jos olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6.

Jos sinulla on tromboosi. Tromboosi on verihyytymän muodostuminen, joka voi tukkia verisuonen (esimerkiksi jaloissa [syvä laskimotromboosi] tai keuhkoissa [keuhkoembolia]).

Jos sinulla on tai on ollut keltatauti (ihon keltainen värjäytyminen) tai vakava maksasairaus ja maksan toiminta ei ole vielä normaali.

Jos sinulla on tai epäillään olevan syöpä, joka on herkkä sukupuolihormoneille, kuten jotkut rintasyövän muodot.

Jos sinulla on selittämätöntä emätinverenvuotoa.

Kerro lääkäriillesi ennen kuin aloitat Desogestrel CF 0,075 mg:n käytön, jos jokin näistä tilanteista koskee sinua. Lääkärisi saattaa suositella ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos jokin näistä tilanteista ilmenee ensimmäistä kertaa Desogestrel CF 0,075 mg:n käytön aikana.

Milloin on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos:

olet joskus sairastanut rintasyövän;

sinulla on maksasyöpä, koska Desogestrel CF 0,075 mg:n mahdollisia vaikutuksia ei voida sulkea pois;

olet joskus sairastanut tromboosin;

sinulla on diabetes;

sinulla on epilepsia (katso kohta "Käytätkö muita lääkkeitä?");

sinulla on tuberkuloosi (katso kohta "Käytätkö muita lääkkeitä?");

sinulla on korkea verenpaine;

sinulla on kloasma tai olet joskus kärsinyt siitä (keltaruskeita pigmenttiläiskiä, niin sanottuja 'raskausläiskiä', erityisesti kasvoissa); jos näin on, on suositeltavaa välttää suoraa altistumista auringonvalolle tai ultravioletivalolle.

Jos käytät Desogestrel CF 0,075 mg ja sinulla on jokin näistä sairauksista, voi olla tarpeen, että sinua seurataan tarkemmin. Lääkärisi voi selittää, mitä sinun tulee tehdä.

Rintasyöpä

On tärkeää tarkistaa rintasi säännöllisesti ja ottaa yhteyttä lääkäriin, jos tunnet kyhmyn rinnoissasi.

Naisilla, jotka käyttävät ehkäisypillereitä, todetaan hieman useammin rintasyöpää kuin samanikäisillä naisilla, jotka eivät käytä pillereitä. Kun naiset lopettavat pillereiden käytön, riski vähenee vähitellen, joten 10 vuotta lopettamisen jälkeen se on sama kuin naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet pillereitä. Rintasyöpä on harvinaisen alle 40-vuotiailla, mutta riski kasvaa iän myötä. Siksi ylimääräisten rintasyöpätapausten määrä on suurempi naisilla, jotka käyttävät pillereitä vanhempaan ikään asti. Pillereiden käytön kesto on vähemmän tärkeää.

Jokaisella 10 000 naisella, jotka käyttävät pillereitä 5 vuoden ajan mutta lopettavat 20-vuotiaina, löytyisi 10 vuoden kuluessa lopettamisesta alle 1 ylimääräinen rintasyöpätapaus, normaalin 4 tapauksen lisäksi tässä ikäryhmässä. Samalla tavalla jokaisella 10 000 naisella, jotka käyttävät pillereitä 5 vuoden ajan mutta lopettavat 30-vuotiaina, löytyisi 5 ylimääräistä rintasyöpätapausta, normaalin 44 tapauksen lisäksi. 10 000 naisella, jotka käyttävät pillereitä 5 vuoden ajan mutta lopettavat 40-vuotiaina, löytyisi 20 ylimääräistä rintasyöpätapausta, normaalin 160 tapauksen lisäksi.

Uskotaan, että pelkkää progestiinia sisältävien pillereiden, kuten Desogestrel CF 0,075 mg, käyttäjien rintasyöpäriski on suunnilleen sama kuin yhdistelmäpillereiden käyttäjillä, mutta todisteet tästä ovat vähemmän vakuuttavia.

Pillereiden käyttäjillä löydetyt rintasyöpätapaukset ovat useammin vähemmän edenneessä vaiheessa kuin ei-käyttäjillä. Ei tiedetä, johtuuko ero rintasyöpäriskissä pillereistä. Se voi myös johtua siitä, että pillereiden käyttäjiä tutkitaan useammin, jolloin rintasyöpä havaitaan aikaisemmin.

Tromboosi

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos sinulle ilmaantuu äkillisesti oireita, jotka voivat viitata tromboosiin (katso myös "Säännöllinen tarkastus").

Tromboosi on verihyytymän muodostuminen, joka voi tukkia verisuonen. Tromboosi esiintyy joskus syvällä säären laskimoissa (syvä laskimotromboosi). Jos hyytymä irtoaa, se voi kulkeutua keuhkojen valtimoihin ja tukkia siellä verisuonen (keuhkoembolia). Tämä voi joskus olla kohtalokasta. Syvä laskimotromboosi on harvinainen. Se voi esiintyä sekä pillereiden käyttäjillä että ei-käyttäjillä. Se voi esiintyä myös raskauden aikana.

Yhdistelmäpillereiden käyttäjillä tromboosiriski on suurempi kuin ei-käyttäjillä. Pelkkää progestiinia sisältävien pillereiden, kuten Desogestrel CF 0,075 mg, riski arvioidaan pienemmäksi kuin yhdistelmäpillereiden, jotka sisältävät myös estrogeeneja.

Psyykkiset häiriöt:

Jotkut naiset, jotka käyttävät hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, mukaan lukien desogestreeli, ovat raportoineet masennusta tai alakuloisuutta. Masennus voi olla vakavaa ja joskus johtaa itsemurha-ajatuksiin. Jos koet mielialan vaihteluita ja masennuksen oireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisäohjeita.

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta

Ei ole tutkimustietoa tehosta ja turvallisuudesta alle 18-vuotiailla nuorilla.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Desogestrel CF 0,075 mg:n lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai aiotko mahdollisesti käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Jotkut lääkkeet voivat heikentää Desogestrel CF 0,075 mg:n tehoa.

Näihin kuuluvat muun muassa lääkkeet seuraavien hoitoon:

epilepsia (esimerkiksi primidoni, fenytoiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, felbamaatti ja fenobarbitaali);

tuberkuloosi (esimerkiksi rifampisiini);

HIV-infektiot (esimerkiksi ritonaviiri) tai muut infektiotaudit (esimerkiksi griseofulviini);

maha- ja suolistovaivat (aktiivihiihi);

masentuneet mielialat (rohdosvalmiste mäkikuisma).

Lääkärisi voi kertoa, tarvitsetko ja kuinka kauan sinun tulee käyttää lisäehkäisyä.

Desogestrel CF 0,075 mg voi myös vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, ja tehostaa (esimerkiksi siklosporiini) tai heikentää niiden vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Älä käytä Desogestrel CF 0,075 mg, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.

Imetys

Desogestrel CF 0,075 mg voidaan käyttää imetyksen aikana. Desogestrel CF 0,075 mg ei näytä vaikuttavan rintamaidon tuotantoon tai laatuun. On kuitenkin raportoitu pieni määrä tapauksia, joissa rintamaidon tuotanto on vähentynyt Desogestrel CF 0,075 mg:n käytön aikana. Pieni määrä Desogestrel CF 0,075 mg:n vaikuttavaa ainetta päätyy rintamaitoon. Sellaisten lasten terveyttä, jotka saivat 7 kuukautta rintamaitoa ja joiden äidit käyttivät pelkkää desogestreeliä sisältävää pilleriä, on tutkittu 2,5 vuoden ikään asti. Lasten kasvussa tai kehityksessä ei havaittu mitään vaikutusta.

Jos imetät ja haluat käyttää Desogestrel CF 0,075 mg, ota yhteyttä lääkäriisi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei ole viitteitä siitä, että Desogestrel CF 0,075 mg vaikuttaisi keskittymiskykyyn tai reaktiokykyyn.

Desogestrel CF 0,075 mg sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että et siedä tiettyjä sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen ottamista.

Säännöllinen tarkastus

Lääkärisi saattaa suositella säännöllisiä lääkärintarkastuksia, jos käytät Desogestrel CF 0,075 mg. Henkilökohtaisesta tilanteestasi riippuu, kuinka usein sinun tulee käydä tarkastuksissa ja millaisia tutkimuksia tehdään.

Ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi seuraavissa tapauksissa:

jos sinulla on voimakasta kipua tai turvotusta jommassakummassa jalassa, selittämätöntä rintakipua, hengitysvaikeuksia, äkillistä epätavallista yskää, erityisesti jos siihen liittyy veren yskimistä (tämä voi viitata tromboosiin);

jos sinulla on äkillinen, voimakas vatsakipu tai keltaisuus (tämä voi viitata maksavaivoihin);

jos sinulla on kyhmy rinnassa (tämä voi viitata rintasyöpään);

jos sinulla on äkillinen, voimakas kipu alavatsassa tai vatsan alueella (tämä voi viitata kohdunulkoiseen raskauteen);

vähintään neljä viikkoa ennen leikkausta tai jos olet pitkään vuodelevossa tai et saa liikkua;

jos sinulla on selittämätöntä, voimakasta ja jatkuvaa verenvuotoa emättimestä;

jos epäilet olevasi raskaana.

3. Miten käytät tätä lääkettä?

Milloin ja miten otat tabletit?

Desogestrel CF 0,075 mg -liuska sisältää 28 tablettia. Liuskan etupuolella, tablettien välissä, on nuolia. Takapuolen foliosta löytyvät viikonpäivät. Jokaiselle päivälle on oma tabletti.

Aloita uusi liuska ottamalla tabletti ylimmästä rivistä. Varmista, että aloitat oikeasta tabletista. Esimerkiksi, jos aloitat keskiviikkona, ota tabletti ylimmästä rivistä, jossa (takapuolella) lukee Ke. Seuraa nuolten suuntaa ja ota joka päivä yksi tabletti, kunnes liuska on tyhjä. Liuskan takapuolelta voit helposti tarkistaa, oletko jo ottanut päivittäisen tablettisi.

Ota tabletit joka päivä suunnilleen samaan aikaan, veden kanssa pureskelematta. Desogestrel CF 0,075 mg:n käytön aikana saatat kokea kuukautisia muistuttavia vuotoja, mutta sinun tulee jatkaa tablettien ottamista normaalisti. Kun liuska on tyhjä, aloita heti seuraavana päivänä uusi Desogestrel CF 0,075 mg -liuska - ilman taukoa ja odottamatta vuotoa.

Milloin aloittaa ensimmäinen Desogestrel CF 0,075 mg -liuska?

Et ole käyttänyt ehkäisypillereitä viime kuukauden aikana
Odota kuukautisiasi. Ota ensimmäinen Desogestrel CF 0,075 mg -tabletti kuukautistesi ensimmäisenä päivänä. Sinun ei tarvitse käyttää lisäehkäisyä. ehkäisyä.
Voit myös aloittaa kuukautistesi 2.-5. päivänä, mutta tässä tapauksessa sinun on käytettävä lisäehkäisyä (kondomia) ensimmäisten 7 tabletin käyttöpäivän aikana.

Siirryt yhdistelmäpillereistä, emätinrenkaasta tai iholaastarista.
Aloita Desogestrel CF 0,075 mg seuraavana päivänä sen jälkeen, kun olet ottanut viimeisen tabletin nykyisestä pilleriliuskastasi, tai päivänä, jolloin poistat emätinrenkaan tai laastarin (ilman tabletti-, rengas- tai laastarivapaata jaksoa). Jos nykyisessä pilleriliuskassasi on myös lumetabletteja (ilman hormoneja), aloita Desogestrel CF 0,075 mg seuraavana päivänä sen jälkeen, kun olet ottanut viimeisen vaikuttavan tabletin (jos et ole varma, mikä se on, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista). Sinun ei tarvitse käyttää lisäehkäisyä, jos noudatat näitä ohjeita.

Voit myös aloittaa viimeistään päivänä tabletti-, rengas- tai laastarivapaan jakson tai lumetablettijakson jälkeen nykyisestä ehkäisymenetelmästäsi. Jos noudatat näitä ohjeita, sinun on käytettävä lisäehkäisyä (kondomia) ensimmäisten 7 tabletin käyttöpäivän aikana.

Siirryt toisesta pelkkää progestiinia sisältävästä pilleristä.
Voit siirtyä suoraan Desogestrel CF 0,075 mg:aan ilman lisäehkäisyä.

Siirryt injektiovalmisteesta, implantista taihormonia sisältävästä kierukasta
Voit aloittaa Desogestrel CF 0,075 mg:n käytön päivänä, jolloin seuraava injektio olisi annettava tai päivänä, jolloin implantti tai hormonia sisältävä kierukka poistetaan. Sinun ei tarvitse käyttää lisäehkäisyä.

Synnytyksen jälkeen

Aloita Desogestrel CF 0,075 mg:n käyttö 21-28 päivän kuluttua synnytyksestä. Jos aloitat myöhemmin, sinun on käytettävä lisäehkäisyä (kuten kondomia), kunnes olet käyttänyt tabletteja 7 päivän ajan. Jos olet jo ollut yhdynnässä, raskaus on suljettava pois ennen Desogestrel CF 0,075 mg:n aloittamista. Lisätietoja imettäville naisille löytyy kohdasta "Raskaus ja imetys" osiossa 2. Lääkärisi voi myös neuvoa sinua.

Keskenmenon tai abortin jälkeen
Noudata lääkärisi ohjeita.

Oletko siottaa tätä lääkettä?

Jos olet yli 12 tuntia myöhässä tabletin ottamisessa, tämän lääkkeen luotettavuus voi olla heikentynyt. Mitä useampia tabletteja olet unohtanut peräkkäin, sitä suurempi on riski, että ehkäisyteho on heikentynyt. Ota viimeinen unohtunut tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit tavalliseen aikaan. Käytä lisäksi seuraavien 7 päivän ajan lisäehkäisyä, kuten kondomia. Jos olet unohtanut yhden tai useamman tabletin ensimmäisellä viikolla ja olet ollut yhdynnässä 7 päivää ennen unohtamista, sinun on otettava huomioon raskauden mahdollisuus.

Jos olet yli 12 tuntia myöhässä tabletin ottamisesta, tämän lääkkeen luotettavuus voi olla heikentynyt. Mitä enemmän tabletteja olet peräkkäin unohtanut, sitä suurempi on mahdollisuus, että ehkäisyteho on heikentynyt. Ota viimeinen unohtunut tabletti heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit taas tavanomaiseen aikaan. Käytä myös seuraavien 7 päivän ajan tablettien käytön aikana lisäehkäisyä, kuten kondomia. Jos olet unohtanut yhden tai useamman tabletin liuskan ensimmäisellä viikolla ja olet ollut yhdynnässä 7 päivää ennen unohtamista, sinun on otettava huomioon raskauden mahdollisuus. Mitä tehdä, jos sinulla on maha-suolikanavan häiriöitä (esimerkiksi

oksentelua, vaikeaa ripulia)pahoinvointi, vaikea ripuli)

Oletko ottanut liikaa tätä lääkettä?

Oletko ottanut liikaa tätä lääkettä?

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Voit lopettaa Desogestrel CF 0,075 mg:n käytön milloin haluat. Siitä päivästä lähtien, kun lopetat, et ole enää suojattu raskaudelta.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä tai haluatko lopettaa hoidon? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä tai haluatko lopettaa hoidon? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saa.

Joitakin vakavia haittavaikutuksia, jotka liittyvät Desogestrel CF 0,075 mg:n käyttöön, on kuvattu kohdissa "Rintasyöpä" ja "Tromboosi" kohdassa 2. Voit lukea tämän osan saadaksesi lisätietoja ja ota yhteyttä lääkäriisi tarvittaessa.

Desogestrel CF 0,075 mg:n käytön aikana voi esiintyä epäsäännöllistä verenvuotoa emättimestä. Tämä voi rajoittua muutamaan tippaan tai voi olla enemmän verenvuotoa, kuten lievä kuukautisvuoto, jolloin tarvitset kuukautissuojia. On myös mahdollista, että verenvuodot jäävät kokonaan pois. Epäsäännölliset verenvuodot eivät ole merkki heikentyneestä raskaudenehkäisystä. Yleensä sinun ei tarvitse tehdä mitään ja voit jatkaa Desogestrel CF 0,075 mg:n ottamista. Jos verenvuoto on kuitenkin vakavaa tai pitkäkestoista, ota yhteyttä lääkäriisi.

Desogestrel 0,075 mg tablettien käyttäjät ovat ilmoittaneet seuraavista haittavaikutuksista:

Yleinen (esiintyy alle yhdellä kymmenestä käyttäjästä):

mielialan vaihtelut, masentunut mieliala, vähentynyt seksuaalinen halu (libido), päänsärky, pahoinvointi, akne, rintojen arkuus, epäsäännölliset tai puuttuvat kuukautiset, painonnousu.

Joskus (esiintyy alle yhdellä sadasta käyttäjästä):

emätintulehdus, silmien ärsytys piilolinssien käytön yhteydessä, oksentelu, hiustenlähtö, kivuliaat kuukautiset, munasarjakysta, väsymys.

Harvoin (esiintyy alle yhdellä tuhannesta käyttäjästä):

ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), kivuliaat sinipunaiset kyhmyt iholla (erythema nodosum).

Näiden haittavaikutusten lisäksi voi esiintyä myös rintojen vuotoa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos saat angioedeeman oireita, kuten (i) turvonnut kasvot, kieli tai kurkku; (ii) nielemisvaikeudet; tai (iii) nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Hollannin Haittavaikutuskeskus Larebille, verkkosivusto: www.lareb.nl. Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy pakkauksesta tai läpipainopakkauksesta "Niet te gebruiken na" tai "EXP" jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Tälle lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekkariltasi, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti, eivätkä ne päädy ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä valmiste sisältää?

Tämän valmisteen vaikuttava aine on desogestreeli. Jokainen tabletti sisältää 75 mikrogrammaa desogestreeliä.

Muut tämän valmisteen aineet ovat laktoosi, perunatärkkelys, povidoni, all-rac- α - tokoferoli, vedetön kolloidinen piidioksidi ja steariinihappo (katso myös "Desogestrel CF 0,075 mg sisältää laktoosia" kohdassa 2). Miltä Desogestrel CF 0,075 mg näyttää ja kuinka paljon pakkauksessa on?

Tabletti on pyöreä, valkoinen tai murtovalkoinen, päällystämätön ja kaksoiskupera, toisella puolella kaiverrus "152" ja toisella puolella tyhjä.
Jokainen pakkaus sisältää 1, 3, 6 tai 13 kalenteriläpipainopakkausta, joissa on 28 tablettia.
Jokainen läpipainopakkaus on pakattu kolmikerroksiseen alumiinipussiin, jossa voi olla tai ei olla kuivatusainetta.
Kaikkia mainittuja pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda
Alankomaat
Valmistaja

Valmistaja
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Saksa

STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36
1190 Wien
Itävalta

Rekisteröity seuraavasti:
RVG 110353 Desogestrel CF 0,075 mg, tabletit

Tämä lääke on rekisteröity seuraavissa EEA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä: EEA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Tanska	Desogestrel STADA
Suomi	Desogestrel STADA
Italia	MIRZAM
Alankomaat:	Desogestreeli CF 0,075 mg, tabletit
Espanja	Desogestreeli STADA 75 mikrogrammaa tabletit EFG
Ruotsi	Desogestreeli STADA

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty joulukuussa 2021.