

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Desogestrel CF 0,075 mg, tabletės
desogestrelis

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.

Jei turite klausimų, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Neduožite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai yra tokie patys kaip jūsų.

Ar pasireiškė šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje? Arba ar pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Desogestrel CF 0,075 mg ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Desogestrel CF 0,075 mg ir kam jis vartojamas?

Desogestrel CF 0,075 mg vartojamas nėštumui išvengti. Desogestrel CF 0,075 mg sudėtyje yra nedidelis kiekis vieno tipo moteriško lytinio hormono, progestagenu desogestrelis. Todėl Desogestrel CF 0,075 mg taip pat vadinamas tik progestagenu turinčia tablete. Tik progestagenu turinčios tabletės, skirtingai nei kombinuotos tabletės, neturi estrogeno hormono šalia progestagenu.

Daugumos veikimas tabletės su vien tik progestagenu daugiausia grindžiamas tuo, kad jos neleidžia spermatozoidams patekti į gimdą. Kiaušialąstės brendimas ne visada yra slopinamas. Pastarasis yra pagrindinis kombinuotų tablečių veikimo mechanizmas. Desogestrel CF 0,075 mg skiriasi nuo daugumos tablečių su vien tik progestagenu, nes dozė yra pakankamai didelė, kad daugeliu atvejų būtų užkirstas kelias kiaušialąstės brendimui. Todėl Desogestrel CF 0,075 mg yra labai patikimas.

Skirtingai nuo kombinuotų tablečių, Desogestrel CF 0,075 mg gali būti vartojamas moterų, kurios netoleruoja estrogenų, ir moterų, maitinančių krūtimi. Vienas iš Desogestrel CF 0,075 mg trūkumų yra tas, kad mėnesinės kraujavimai iš makšties gali atsirasti nereguliariais intervalais. Taip pat yra tikimybė, kad šie kraujavimai visiškai išnyks.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kaip ir kitos hormoninės kontraceptinės priemonės, Desogestrel CF 0,075 mg neapsaugo nuo ŽIV infekcijos (AIDS) ar kitų lytiškai plintančių ligų (LPL).

Kada negalima vartoti šio vaisto?

Jei esate alergiškas bet kuriai šio vaisto sudedamajai daliai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.

Jei turite trombozę. Trombozė yra kraujo krešulio susidarymas, dėl kurio gali būti užblokuota kraujagyslė (pavyzdžiui, kojose [giliųjų venų trombozė] arba plaučiuose [plaučių embolija]).

Jei turite arba turėjote geltą (odos pageltimą) ar sunkią kepenų ligą ir jūsų kepenų funkcija dar nėra normali.

Jei turite arba manoma, kad turite vėžio formą, kuri yra jautri lytiniams hormonams, pavyzdžiui, kai kurios krūties vėžio formos.

Jei turite nepaaiškinamą makšties kraujavimą.

Pasakykite savo gydytojui prieš pradėdami vartoti Desogestrel CF 0,075 mg, jei kuri nors iš šių situacijų jums tinka. Jūsų gydytojas gali rekomenduoti nehormoninį kontracepcijos metodą.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei kuri nors iš šių situacijų atsiranda pirmą kartą, kai vartojate Desogestrel CF 0,075 mg.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei:

jums kada nors buvo krūties vėžys;

turite kepenų vėžį, nes negalima atmesti galimo Desogestrel CF 0,075 mg poveikio;

jums kada nors buvo trombozė;

jei sergate cukriniu diabetu;

jei sergate epilepsija (žr. skyrių „Ar vartojate kitus vaistus?“);

jei sergate tuberkulioze (žr. skyrių „Ar vartojate kitus vaistus?“);

jei turite aukštą kraujospūdį;

jei turite chloazmą arba kada nors ją turėjote (geltonai rudos pigmentinės dėmės, vadinamos „nėštumo dėmėmis“, ypač veide); jei taip yra, patartina vengti tiesioginio saulės ar ultravioletinių spindulių poveikio.

Je vartojate Desogestrel CF 0,075 mg ir turite vieną iš šių būklių, gali prireikti papildomos priežiūros. Jūsų gydytojas gali paaiškinti, ką turėtumėte daryti.

Krūties vėžys

Svarbu reguliariai tikrinti savo krūtis ir pasikonsultuoti su gydytoju, jei jaučiate gumbelį krūtyse.

Moterims, kurios vartoja kontraceptines tabletes, krūties vėžys diagnozuojamas šiek tiek dažniau nei to paties amžiaus moterims, kurios jų nevartoja. Jei moterys nustoja vartoti tabletes, rizika vėl lėtai mažėja, todėl po 10 metų nuo nutraukimo ji yra tokia pati kaip moterims, kurios niekada nevartojo tablečių. Krūties vėžys retai pasitaiko jaunesnėms nei 40 metų moterims, tačiau rizika didėja su amžiumi. Todėl papildomų krūties vėžio atvejų skaičius yra didesnis tarp moterų, kurios vartoja tabletes iki vyresnio amžiaus. Kiek laiko vartojamos tabletės yra mažiau svarbu.

Iš 10 000 moterų, kurios 5 metus vartoja tabletes, bet nustoja, kai joms yra 20 metų, iki 10 metų po nutraukimo būtų nustatytas mažiau nei 1 papildomas krūties vėžio atvejis, be 4 atvejų, kurie paprastai nustatomi šioje amžiaus grupėje. Panašiai iš 10 000 moterų, kurios 5 metus vartoja tabletes, bet nustoja, kai joms yra 30 metų, būtų nustatyti 5 papildomi krūties vėžio atvejai, be 44 atvejų, kurie paprastai nustatomi. Iš 10 000 moterų, kurios 5 metus

vartoja tabletes, bet nustoja, kai joms yra 40 metų, būtų nustatyti 20 papildomų krūtis vėžio atvejų, be 160 atvejų, kurie paprastai nustatomi.

Manoma, kad krūtis vėžio rizika moterims, vartojančioms tik progestageno tabletes, tokias kaip Desogestrel CF 0,075 mg, yra maždaug panaši į riziką moterims, vartojančioms kombinuotas tabletes, tačiau įrodymai tam yra mažiau įtikinami.

Krūtis vėžio atvejai, nustatyti moterims, vartojančioms tabletes, dažniau būna mažiau pažengusioje stadijoje nei moterims, kurios jų nevartoja. Nežinoma, ar skirtumą krūtis vėžio rizikoje sukelia tabletės. Gali būti, kad moterys, vartojančios tabletes, dažniau tiriamos, todėl krūtis vėžys nustatomas anksčiau.

Trombozė

Nedelsdami susisiekite su savo gydytoju, jei staiga pajusite simptomus, kurie gali rodyti trombozę (taip pat žr. „Reguliarus tikrinimas“).

Trombozė yra kraujo krešulio susidarymas, kuris gali užblokuoti kraujagyslę. Trombozė kartais atsiranda vienoje iš giliai esančių blauzdos venų (giliųjų venų trombozė). Jei krešulys atsiskiria, jis gali patekti į plaučių arterijas ir ten užblokuoti kraujagyslę (plaučių embolija). Tai kartais gali būti mirtina. Giliųjų venų trombozė retai pasitaiko. Ji gali pasireikšti tiek moterims, vartojančioms tabletes, tiek nevartojančioms. Ji taip pat gali pasireikšti nėštumo metu.

Trombozės rizika moterims, vartojančioms kombinuotas tabletes, yra didesnė nei moterims, kurios jų nevartoja. Rizika vartojant tik progestageno tabletes, tokias kaip Desogestrel CF 0,075 mg, laikoma mažesne nei moterims, vartojančioms kombinuotas tabletes, kurios taip pat turi estrogenų.

Psichikos sutrikimai:

Kai kurios moterys, vartojančios hormoninius kontraceptikus, įskaitant desogestrelį, pranešė apie depresiją ar prislėgtumą. Depresija gali būti sunki ir kartais gali sukelti minčių apie savižudybę. Jei patiriate nuotaikos svyravimus ir depresijos simptomus, kuo greičiau kreipkitės į savo gydytoją dėl tolesnės medicininės konsultacijos.

Vaikai ir paaugliai iki 18 metų

Nėra tyrimų informacijos apie veiksmingumą ir saugumą jaunesniems nei 18 metų asmenims.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be Desogestrel CF 0,075 mg, ar neseniai vartojote, ar planuojate vartoti kitus vaistus artimiausiu metu? Pasakykite tai savo gydytojui arba vaistininkui.

Kai kurie vaistai gali sumažinti Desogestrel CF 0,075 mg veiksmingumą.

Tai apima vaistus, skirtus gydyti:

epilepsiją (pvz., primidonas, fenitoinas, karbamazepinas, okskarbazepinas, felbamatas ir fenobarbitalis);

tuberkuliozę (pvz., rifampicinas);

ŽIV infekcijas (pvz., ritonaviras) arba kitas infekcines ligas (pvz., grizeofulvinas);

skrandžio ir žarnyno sutrikimus (aktyvuota anglis);

depresines nuotaikas (jonažolės žolinis preparatas).

Jūsų gydytojas gali pasakyti, ar ir kiek laiko turite naudoti papildomas kontraceptines priemones.

Desogestrel CF 0,075 mg taip pat gali paveikti kitų vaistų veikimą, sustiprindamas (pvz., ciklosporinas) arba sumažindamas jų poveikį.

Nėštumas ir žindymas

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, norite pastoti ar maitinate krūtimi? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas

Nevartokite Desogestrel CF 0,075 mg, jei esate nėščia arba manote, kad galite būti nėščia.

Žindymas

Desogestrel CF 0,075 mg gali būti vartojamas žindymo metu. Desogestrel CF 0,075 mg neturi įtakos motinos pieno gamybai ar kokybei. Tačiau yra keletas pranešimų apie pieno gamybos sumažėjimą vartojant Desogestrel CF 0,075 mg. Nedidelis kiekis Desogestrel CF 0,075 mg veikliosios medžiagos patenka į motinos pieną.

Buvo tiriama vaikų, kurie 7 mėnesius buvo maitinami krūtimi, o jų motinos vartojo tik desogestrelio tabletes, sveikata iki 2,5 metų amžiaus. Nepastebėta jokie poveikio vaikų augimui ar vystymuisi.

Jei maitinate krūtimi ir norite pradėti vartoti Desogestrel CF 0,075 mg, pasitarkite su savo gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų naudojimas

Nėra jokių įrodymų, kad Desogestrel CF 0,075 mg vartojimas paveiktų koncentraciją ir reakcijos greitį.

Desogestrel CF 0,075 mg sudėtyje yra laktozės

Jei gydytojas jums pasakė, kad netoleruojate tam tikrų cukrų, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

Reguliarus tikrinimas

Gydytojas gali rekomenduoti reguliariai susitarti dėl medicininės apžiūros, jei vartojate Desogestrel CF 0,075 mg. Kaip dažnai turite grįžti tikrintis ir kokie tyrimai bus atliekami, priklauso nuo jūsų asmeninės situacijos.

Kreipkitės į gydytoją kuo greičiau šiais atvejais:

esant stipriam skausmui ar patinimui vienoje iš kojų, nepaaiškinamam krūtinės skausmui, dusuliui, staigiam neįprastam kosuliui, ypač jei tai lydi kraujo atkosėjimas (tai gali rodyti trombozę);

esant staigiam, stipriam pilvo skausmui ar geltais (tai gali rodyti kepenų problemas);

esant gumbeliui krūtyje (tai gali rodyti krūties vėžį);

esant staigiam, stipriam skausmui apatinėje pilvo dalyje ar skrandžio srityje (tai gali rodyti negimdinį nėštumą);

mažiausiai keturias savaites prieš operaciją arba kai esate priversti ilgai gulėti lovoje ar negalite vaikščioti;

esant nepaaiškinamam, stipriam ir nuolatiniam kraujavimui iš makšties;

jei įtariate, kad galite būti nėščia.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Kada ir kaip vartoti tabletes?

Desogestrel CF 0,075 mg juostelėje yra 28 tabletės. Juostelės priekyje, tarp tablečių, matote rodykles. Ant folijos juostelės gale yra savaitės dienos. Kiekvienai dienai priklauso viena tabletė.

Pradėkite kiekvieną naują juostelę nuo tabletės viršutinėje eilėje. Įsitinkite, kad pradėsite nuo tinkamos tabletės.

Pavyzdžiui, jei pradėsite trečiadienį, imkite tabletę iš viršutinės eilės, kur (ant nugarėlės) parašyta Tr. Sekite rodyklių kryptį ir kasdien vartokite po tabletę, kol juostelė bus tuščia. Juostelės gale galite lengvai pamatyti, ar jau išgėrėte savo dienos tabletę.

Tabletes vartokite kiekvieną dieną maždaug tuo pačiu metu, užgerdami vandeniu, nekramtydami. Vartojant Desogestrel CF 0,075 mg, galite patirti kraujavimą, primenantį menstruacijas, tačiau turite toliau vartoti tabletes. Kai pakuotė baigiasi, kitą dieną pradėkite naują Desogestrel CF 0,075 mg pakuotę - be pertraukos ir nelaukdami kraujavimo.

Kada pradėti pirmąją Desogestrel CF 0,075 mg pakuotę?

Praėjusį mėnesį neavartojote kontraceptinių tablečių

Palaukite menstruacijų. Pirmąją Desogestrel CF 0,075 mg tabletę išgerkite pirmąją menstruacijų dieną. Tuomet nereikia naudoti papildomos apsaugos priemonės.

Jūs taip pat galite pradėti 2-5 menstruacijų dieną, tačiau tokiu atveju turite naudoti papildomą apsaugos priemonę (prezervatyvą) pirmąsias 7 tablečių vartojimo dienas.

Pereinate nuo kombinuotų tablečių, makšties žiedo ar transderminio pleistro.

Pradėkite vartoti Desogestrel CF 0,075 mg kitą dieną po to, kai išgersite paskutinę dabartinės tablečių pakuotės tabletę, arba tą dieną, kai pašalinsite makšties žiedą ar pleistrą (be tablečių, žiedo ar pleistro pertraukos). Jei jūsų dabartinėje tablečių pakuotėje yra placebinių tablečių (be hormonų), pradėkite vartoti Desogestrel CF 0,075 mg kitą dieną po to, kai išgersite paskutinę veikliąją tabletę (jei nesate tikri, kuri tai yra, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku). Jei laikysitės šių nurodymų, nereikia naudoti papildomos apsaugos priemonės.

Jūs taip pat galite pradėti kitą dieną po jūsų dabartinės apsaugos priemonės tablečių, žiedo ar pleistro pertraukos arba placebinių tablečių laikotarpio. Jei laikysitės šių nurodymų, turite naudoti papildomą apsaugos priemonę (prezervatyvą) pirmąsias 7 tablečių vartojimo dienas.

Pereinate nuo kitų tik progestageno tablečių.

Jūs galite pereiti prie Desogestrel CF 0,075 mg iš karto ir nereikia naudoti papildomos apsaugos priemonės.

Pereinate nuo injekcinio preparato, implanto ar hormoninės spiralės

Galite pradėti vartoti Desogestrel CF 0,075 mg tą dieną, kai turėtų būti atlikta kita injekcija arba kai pašalinamas jūsų implantas ar hormoninė spiralė. Nereikia naudoti papildomos apsaugos priemonės.

Po gimdymo

Pradėkite vartoti Desogestrel CF 0,075 mg tarp 21 ir 28 dienos po gimdymo. Jei pradėsite vėliau, turite naudoti papildomą kontracepcijos priemonę (pvz., prezervatyvą), kol baigsite pirmąsias 7 tablečių vartojimo dienas. Jei jau turėjote lytinių santykių, prieš pradėdami vartoti Desogestrel CF 0,075 mg, turite įsitikinti, kad nesate nėščia. Papildomą informaciją žindančioms moterims galima rasti skyriuje „Nėštumas ir žindymas“ 2 dalyje. Jūsų gydytojas taip pat gali jums patarti.

Po persileidimo ar aborto
Laikykitės gydytojo patarimų.

Ar pamiršote išgerti šį vaistą? ar šį vaistą vartoti?

Jei pavėlavote išgerti tabletę daugiau nei 12 valandų, šio vaisto patikimumas gali būti sumažėjęs. Kuo daugiau tablečių iš eilės pamiršote, tuo didesnė tikimybė, kad kontraceptinis poveikis sumažės. Išgerkite paskutinę pamirštą tabletę, kai tik prisiminsite, ir toliau vartokite kitas tabletes įprastu laiku. Taip pat naudokite papildomą kontracepcijos priemonę, pvz., prezervatyvą, per pirmąsias 7 tablečių vartojimo dienas. Jei pamiršote vieną ar daugiau tablečių pirmąją savaitę ir per 7 dienas prieš pamiršimą turėjote lytinių santykių, turite atsižvelgti į nėštumo galimybę.

Jei pavėlavote išgerti tabletę daugiau nei 12 valandų, šio vaisto patikimumas gali būti sumažėjęs. Kuo daugiau tablečių iš eilės pamiršote, tuo didesnė tikimybė, kad kontraceptinis poveikis sumažėjo. Išgerkite paskutinę pamirštą tabletę, kai tik prisiminsite, ir toliau vartokite kitas tabletes įprastu laiku. Taip pat per pirmąsias 7 dienas, kai vartojate tabletes, naudokite papildomą kontracepcijos priemonę, pavyzdžiui, prezervatyvą. Jei pamiršote vieną ar daugiau tablečių per pirmąją juostelės savaitę ir per 7 dienas prieš pamiršimą turėjote lytinių santykių, turite atsižvelgti į nėštumo tikimybę. Ką daryti, jei turite virškinimo trakto sutrikimų (pvz.,

vėmimas, stiprus viduriavimas) vėmimas, stiprus viduriavimas)
Ar išgėrėte per daug šio vaisto?

Ar vartojote per daug šio vaisto?
Jei nustosite vartoti šį vaistą

Galite nustoti vartoti Desogestrel CF 0,075 mg, kada tik norite. Nuo tos dienos, kai nustosite, nebebūsate apsaugoti nuo nėštumo.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą ar norite nutraukti gydymą? Susisiekiite su savo gydytoju ar vaistininku.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą ar norite nutraukti gydymą? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

4. Galimos šalutinės reakcijos

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas taip pat gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas žmogus jį patiria.

Kai kurie sunkūs šalutiniai poveikiai, priskiriami Desogestrel CF 0,075 mg vartojimui, aprašyti skyriuose „Krūtis vėžys“ ir „Trombozė“ 2 dalyje. Galite perskaityti šią dalį, kad gautumėte daugiau informacijos, ir, jei reikia, susisiekiite su savo gydytoju.

Vartojant Desogestrel CF 0,075 mg, gali atsirasti nereguliarus kraujavimas iš makšties. Tai gali būti tik keli lašai arba daugiau kraujavimo, kaip lengvos mėnesinės, kurioms reikalingos higieninės priemonės. Taip pat yra tikimybė, kad kraujavimas visai nepasireikš. Nereguliarus kraujavimas nėra ženklas, kad sumažėjo apsauga nuo nėštumo. Paprastai jums nereikia nieko daryti ir galite toliau vartoti Desogestrel CF 0,075 mg. Tačiau jei kraujavimas yra stiprus ar ilgalaikis, turėtumėte susisiekti su savo gydytoju.

Desogestrel 0,075 mg tablečių vartotojai pranešė apie šiuos šalutinius poveikius:

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų):
nuotaikos svyravimai, prislėgta nuotaika, sumažėjęs lytinis potraukis (libido), galvos skausmas, pykinimas, aknė, skausmingos krūtys, neregulios arba nebuvusios menstruacijos, svorio padidėjimas.

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų):
makšties infekcija, akių dirginimas naudojant kontaktinius lęšius, vėmimas, plaukų slinkimas, skausmingos menstruacijos, kiaušidžių cista, nuovargis.

Retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų):
odos bėrimas, dilgėlinė (urtikarija), skausmingi mėlynai raudoni mazgeliai odoje (erythema nodosum).

Be šių šalutinių poveikių, gali pasireikšti ir išskyros iš krūties.

Nedelsdami susisieki su savo gydytoju, jei pasireiškia angioedemos simptomai, tokie kaip (i) patinęs veidas, liežuvis ar gerklė; (ii) sunkumas ryjant; arba (iii) dilgėlinė ir kvėpavimo sutrikimai.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, susisieki su savo gydytoju arba vaistininku. Tai taip pat taikoma galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai per Nyderlandų šalutinių poveikių centrą Lareb, svetainė: www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto po galiojimo pabaigos datos. Ją rasite ant dėžutės arba lizdinės plokštelės po „Niet te gebruiken na“ arba „EXP“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Šiam vaistui nėra specialių laikymo sąlygų.

Neleiskite vaistų į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Jie bus sunaikinti atsakingai ir nepateks į aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra dezogestrelis. Kiekvienoje tabletėje yra 75 mikrogramai dezogestrelio.

Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra laktozė, bulvių krakmolai, povidonas, all-rac- α -tokoferolis, bevandenis koloidinis silicio dioksidas ir stearino rūgštis (taip pat žiūrėkite "Desogestrel CF 0,075 mg sudėtyje yra laktozės" 2 skyriuje).

Kaip atrodo Desogestrel CF 0,075 mg ir kiek jo yra pakuotėje?

Tabletė yra apvali, balta arba beveik balta, nepadengta ir dvigubai išgaubta, su įrašu „152“ vienoje pusėje ir tuščia kitoje pusėje.

Kiekvienoje pakuotėje yra 1, 3, 6 arba 13 kalendorinių lizdinių plokštelių su 28 tabletėmis.

Kiekviena lizdinė pakuotė yra supakuota į tri-laminuotą aliuminio maišelį su arba be sausiklio.

Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra pateikiami į rinką.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas Rinkodaros teisės turėtojas Centrafarm B.V.

Van de Reijtstraat 31-E

4814 NE Breda

Nyderlandai

Gamintojas

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Vokietija

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Viena

Austrija

Įregistruota registre:

RVG 110353 Desogestrel CF 0,075 mg, tabletės

Šis vaistas yra registruotas EEE valstybėse narėse su šiais pavadinimais:

| | |
|--------------|--|
| Danija | Desogestrel STADA |
| Suomija | Desogestrel STADA |
| Italija | MIRZAM |
| Nyderlandai: | Desogestrel CF 0,075 mg, tabletės |
| Ispanija | Desogestrel STADA 75 mikrogramų tabletės EFG |
| Švedija | Desogestrel STADA |

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2021 m. gruodžio mėn.