

Ulotka: informacje dla użytkownika
Desogestrel CF 0,075 mg, tabletki
desogestrel

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed użyciem tego leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla Ciebie

Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna w przyszłości.

Masz pytania? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie przekazuj tego leku innym, ponieważ jest on przepisany wyłącznie Tobie. Może być szkodliwy dla innych, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.

Czy wystąpił u Ciebie któryś z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane niewymienione w tej ulotce? Skontaktuj się wtedy z lekarzem lub farmaceutą.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Desogestrel CF 0,075 mg i w jakim celu się go stosuje?
2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?
3. Jak stosować ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Desogestrel CF 0,075 mg i w jakim celu się go stosuje?

Desogestrel CF 0,075 mg stosuje się w celu zapobiegania ciąży. Desogestrel CF 0,075 mg zawiera niewielką ilość jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego, progestagenu desogestrelu. Dlatego Desogestrel CF 0,075 mg nazywany jest również pigułką zawierającą wyłącznie progestagen. Pigułki zawierające wyłącznie progestagen, w przeciwieństwie do pigułek złożonych, nie zawierają hormonu estrogenowego oprócz progestagenu.

Działanie większości tabletek zawierających tylko progestagen opiera się głównie na fakcie, że zapobiegają one przedostawaniu się plemników do macicy. Dojrzewanie komórki jajowej nie zawsze jest zahamowane. To ostatnie jest głównym działaniem pigułki złożonej. Desogestrel CF 0,075 mg różni się od większości tabletek zawierających tylko progestagen, ponieważ dawka jest wystarczająco wysoka, aby w większości przypadków zapobiec dojrzewaniu komórki jajowej. Desogestrel CF 0,075 mg jest zatem bardzo niezawodny.

W przeciwieństwie do pigułek złożonych, Desogestrel CF 0,075 mg może być stosowany przez kobiety, które nie tolerują estrogenów oraz przez kobiety karmiące piersią. Wadą Desogestrel CF 0,075 mg jest to, że miesięczne krwawienia z pochwy mogą występować w nieregularnych odstępach czasu. Istnieje również możliwość, że te krwawienia całkowicie zanikną.

2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?

Podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, Desogestrel CF 0,075 mg nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową (STD).

Kiedy nie należy stosować tego leku?

Jeśli jesteś uczulona na którykolwiek ze składników tego leku. Te składniki można znaleźć w punkcie 6.

Jeśli masz zakrzepicę. Zakrzepica to tworzenie się skrzepu krwi, który może zablokować naczynie krwionośne (na przykład w nogach [zakrzepica żył głębokich] lub w płucach [zatorowość płucna]).

Jeśli masz żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry) lub ciężką chorobę wątroby, lub miałeś ją w przeszłości, a funkcja wątroby nie wróciła jeszcze do normy.

Jeśli masz lub podejrzewa się, że masz nowotwór wrażliwy na hormony płciowe, taki jak niektóre formy raka piersi.

Jeśli masz niewyjaśnione krwawienie z pochwy.

Poinformuj swojego lekarza przed rozpoczęciem stosowania Desogestrel CF 0,075 mg, jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy Ciebie. Twój lekarz może wtedy zalecić niehormonalną metodę antykoncepcji.

Skontaktuj się natychmiast z lekarzem, jeśli którakolwiek z tych sytuacji wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania Desogestrel CF 0,075 mg.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?

Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku, jeśli:

kiedykolwiek miałeś raka piersi;

masz raka wątroby, ponieważ nie można wykluczyć możliwego wpływu Desogestrel CF 0,075 mg;

kiedykolwiek miałeś zakrzepicę;

masz cukrzycę;

masz padaczkę (zobacz sekcję „Czy używasz innych leków?”);

masz gruźlicę (zobacz sekcję „Czy używasz innych leków?”);

masz nadciśnienie;

masz chloasmę lub kiedykolwiek ją miałeś (żółto-brązowe plamy pigmentacyjne, tzw. „plamy ciążowe”, zwłaszcza na twarzy); w takim przypadku zaleca się unikanie bezpośredniego narażenia na światło słoneczne lub ultrafioletowe.

Jeśli Desogestrel CF 0,075 mg jest stosowany, gdy masz którąś z tych dolegliwości, może być konieczne, abyś pozostawał pod dodatkową kontrolą. Twój lekarz może wyjaśnić, co należy zrobić.

Rak piersi

Ważne jest, aby regularnie kontrolować piersi i skonsultować się z lekarzem, jeśli wyczujesz guzek w piersiach.

U kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne rak piersi jest diagnozowany nieco częściej niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Po zaprzestaniu stosowania pigułek ryzyko stopniowo maleje, tak że 10 lat po zaprzestaniu jest takie samo jak u kobiet, które nigdy nie stosowały pigułek. Rak piersi rzadko występuje poniżej 40 roku życia, ale ryzyko wzrasta wraz z wiekiem. Dlatego liczba dodatkowych przypadków raka piersi jest wyższa u kobiet, które stosują pigułki do starszego wieku. Czas stosowania pigułek jest mniej istotny.

Na każde 10 000 kobiet, które stosują pigułki przez 5 lat, ale przestają, gdy mają 20 lat, do 10 lat po zaprzestaniu stosowania można znaleźć mniej niż 1 dodatkowy przypadek raka piersi, oprócz 4 przypadków, które normalnie są diagnozowane w tej grupie wiekowej. Podobnie, na

każde 10 000 kobiet, które stosują pigułki przez 5 lat, ale przestają, gdy mają 30 lat, można znaleźć 5 dodatkowych przypadków raka piersi, oprócz 44 przypadków, które normalnie są diagnozowane. Na 10 000 kobiet, które stosują pigułki przez 5 lat, ale przestają, gdy mają 40 lat, można znaleźć 20 dodatkowych przypadków raka piersi, oprócz 160 przypadków, które normalnie są diagnozowane.

Uważa się, że ryzyko raka piersi u użytkowniczek pigułek zawierających tylko progestagen, takich jak Desogestrel CF 0,075 mg, jest porównywalne z ryzykiem u użytkowniczek pigułek złożonych, ale dowody na to są mniej przekonujące.

Przypadki raka piersi u użytkowniczek pigułek są częściej w mniej zaawansowanym stadium niż u kobiet, które ich nie stosują. Nie wiadomo, czy różnica w ryzyku raka piersi jest spowodowana przez pigułki. Może to być również spowodowane tym, że użytkowniczki pigułek są częściej badane, co prowadzi do wcześniejszego wykrycia raka piersi.

Zakrzepica

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli nagle wystąpią u Ciebie objawy, które mogą wskazywać na zakrzepicę (zobacz także „Regularna kontrola”).

Zakrzepica to tworzenie się skrzepu krwi, który może zablokować naczynie krwionośne. Zakrzepica czasami występuje w jednej z głębokich żył podudzia (zakrzepica żył głębokich). Jeśli skrzep się oderwie, może dostać się do tętnic płucnych i zablokować tam naczynie krwionośne (zatorowość płucna). Może to czasami prowadzić do śmierci. Zakrzepica żył głębokich rzadko występuje. Może wystąpić zarówno u użytkowniczek pigułek, jak i u kobiet, które ich nie stosują. Może również wystąpić w czasie ciąży.

Ryzyko zakrzepicy jest większe u użytkowniczek pigułek złożonych niż u kobiet, które ich nie stosują. Ryzyko związane z pigułkami zawierającymi tylko progestagen, takimi jak Desogestrel CF 0,075 mg, jest uważane za niższe niż u użytkowniczek pigułek złożonych zawierających również estrogeny.

Zaburzenia psychiczne:

Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym desogestrel, zgłaszały depresję lub przygnębienie. Depresja może być poważna i czasami prowadzić do myśli samobójczych. Jeśli doświadczasz wahań nastroju i objawów depresji, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia

Nie ma informacji badawczych na temat skuteczności i bezpieczeństwa u młodzieży poniżej 18 roku życia.

Czy używasz innych leków?

Czy używasz innych leków oprócz Desogestrel CF 0,075 mg, czy robiłeś to niedawno lub istnieje możliwość, że w najbliższej przyszłości będziesz używać innych leków? Powiedz o tym swojemu lekarzowi lub farmaceutce.

Niektóre leki mogą powodować, że Desogestrel CF 0,075 mg działa mniej skutecznie.

Do tej grupy należą między innymi leki stosowane w leczeniu:

padaczki (na przykład prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat i fenobarbital);

gruźlicy (na przykład ryfampicyna);
zakażeń HIV (na przykład rytonawir) lub innych chorób zakaźnych (na przykład gryzeofulwina);
dolegliwości żołądkowo-jelitowych (węgiel aktywowany);
depresyjnych nastrojów (zioło dziurawca).

Twój lekarz może ci powiedzieć, czy i jak długo musisz stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne.

Desogestrel CF 0,075 mg może również wpływać na działanie innych leków, wzmacniając (na przykład cyklosporyna) lub osłabiając ich efekt.

Ciąża i karmienie piersią

Czy jesteś w ciąży, myślisz, że możesz być w ciąży, chcesz zajść w ciążę lub karmisz piersią?
Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku.

Ciąża

Nie używaj Desogestrel CF 0,075 mg, jeśli jesteś w ciąży lub myślisz, że możesz być w ciąży.

Karmienie piersią

Desogestrel CF 0,075 mg może być stosowany podczas karmienia piersią. Desogestrel CF 0,075 mg nie wpływa na produkcję ani jakość mleka matki. Istnieje jednak kilka zgłoszeń o zmniejszeniu produkcji mleka podczas stosowania Desogestrel CF 0,075 mg. Niewielka ilość substancji czynnej Desogestrel CF 0,075 mg przenika do mleka matki.

Zdrowie dzieci, które były karmione piersią przez 7 miesięcy, a ich matki stosowały pigułkę zawierającą tylko dezogestrel, było badane do 2,5 roku życia. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na wzrost ani rozwój dzieci.

Jeśli karmisz piersią i chcesz zacząć stosować Desogestrel CF 0,075 mg, skontaktuj się z lekarzem.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Nie ma dowodów na to, że koncentracja i zdolność reakcji są wpływane przez stosowanie Desogestrel CF 0,075 mg.

Desogestrel CF 0,075 mg zawiera laktozę

Jeśli lekarz poinformował Cię, że nie tolerujesz niektórych cukrów, skontaktuj się z lekarzem przed zażyciem tego leku.

Regularna kontrola

Twój lekarz może zalecić regularne wizyty kontrolne, jeśli stosujesz Desogestrel CF 0,075 mg. Częstotliwość wizyt i rodzaj badań zależą od Twojej indywidualnej sytuacji.

Skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem w następujących przypadkach:

- w przypadku silnego bólu lub obrzęku jednej z nóg, niewyjaśnionego bólu w klatce piersiowej, duszności, nagłego nietypowego kaszlu, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu odkrztuszanie krwi (może to wskazywać na zakrzepicę);
- w przypadku nagłego, silnego bólu brzucha lub żółtaczk (może to wskazywać na problemy z wątrobą);
- w przypadku guzka w piersi (może to wskazywać na raka piersi);

w przypadku nagłego, silnego bólu w dolnej części brzucha lub w okolicy żołądka (może to wskazywać na ciążę pozamaciczną);
co najmniej cztery tygodnie przed planowaną operacją lub gdy jesteś unieruchomiony w łóżku lub nie możesz chodzić;
w przypadku niewyjaśnionego, silnego i utrzymującego się krwawienia z pochwy;
jeśli podejrzewasz, że możesz być w ciąży.

3. Jak stosować ten lek?

Kiedy i jak przyjmować tabletki?

Blistery Desogestrel CF 0,075 mg zawierają 28 tabletek. Na przedniej stronie blistra, pomiędzy tabletkami, znajdują się strzałki. Na folii z tyłu są dni tygodnia. Każdemu dniu odpowiada jedna tabletkę.

Rozpocznij każdy nowy blister od tabletki z górnego rzędu. Upewnij się, że zaczynasz od właściwej tabletki.

Na przykład, jeśli zaczynasz w środę, weź tabletkę z górnego rzędu, gdzie (z tyłu) jest oznaczenie Śr. Podążaj za kierunkiem strzałek i bierz codziennie jedną tabletkę, aż blister będzie pusty. Na tylnej stronie blistra łatwo sprawdzisz, czy już zażyłeś swoją dzienną tabletkę.

Przyjmuj tabletki codziennie o tej samej porze, popijając wodą, bez rozgryzania. Podczas stosowania Desogestrel CF 0,075 mg mogą wystąpić krwawienia przypominające miesiączkę, ale należy kontynuować przyjmowanie tabletek. Po zakończeniu opakowania należy natychmiast rozpocząć kolejne opakowanie Desogestrel CF 0,075 mg - bez przerwy i bez czekania na krwawienie.

Kiedy rozpocząć pierwsze opakowanie Desogestrel CF 0,075 mg?

Nie stosowałaś pigułki antykoncepcyjnej w ostatnim miesiącu
Poczekaj na miesiączkę. Weź pierwszą tabletkę Desogestrel CF 0,075 mg w pierwszym dniu miesiączki. Nie musisz wtedy stosować dodatkowego środka antykoncepcyjnego. Możesz również rozpocząć w dniach 2-5 miesiączki, ale w takim przypadku musisz stosować dodatkowy środek antykoncepcyjny (prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Przechodzisz z pigułki złożonej, pierścienia dopochwowego lub plastra transdermalnego.

Rozpocznij stosowanie Desogestrel CF 0,075 mg w dniu po przyjęciu ostatniej tabletki z obecnego opakowania pigułek, lub w dniu usunięcia pierścienia dopochwowego lub plastra (czyli bez okresu wolnego od tabletek, pierścienia lub plastra). Jeśli obecne opakowanie pigułek zawiera również tabletki placebo (czyli bez hormonów), należy rozpocząć Desogestrel CF 0,075 mg w dniu po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki (jeśli nie jesteś pewna, która to jest, zapytaj lekarza lub farmaceutę o radę). Nie musisz stosować dodatkowego środka antykoncepcyjnego, jeśli przestrzegasz tych wskazówek.

Możesz również rozpocząć najpóźniej w dniu po okresie wolnym od tabletek, pierścienia lub plastra, lub po okresie z tabletkami placebo obecnego środka antykoncepcyjnego. Jeśli przestrzegasz tych wskazówek, musisz jednak stosować

dodatkowy środek antykoncepcyjny (prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Przechodzisz z innej pigułki zawierającej tylko progestagen. Możesz przejść z dnia na dzień na Desogestrel CF 0,075 mg i nie musisz stosować dodatkowego środka antykoncepcyjnego.

Przechodzisz z preparatu do wstrzykiwań, implantu lub spirali hormonalnej. Możesz rozpocząć stosowanie Desogestrel CF 0,075 mg w dniu, w którym powinna być podana kolejna iniekcja, lub w dniu usunięcia implantu lub spirali hormonalnej. Nie musisz stosować dodatkowego środka antykoncepcyjnego.

Po porodzie

Rozpocznij stosowanie Desogestrel CF 0,075 mg między 21 a 28 dniem po porodzie. Jeśli zaczniesz później, musisz używać dodatkowego środka antykoncepcyjnego (prezerwatywy) do czasu zakończenia pierwszych 7 dni stosowania tabletek. Jeśli już odbyłaś stosunek płciowy, należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem stosowania Desogestrel CF 0,075 mg. Dodatkowe informacje dla kobiet karmiących piersią można znaleźć w paragrafie „Ciąża i karmienie piersią” w sekcji 2. Twój lekarz może również doradzić.

Po poronieniu lub aborcji

Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy zapomniałaś wziąć tego leku?

Jeśli spóźniłaś się z przyjęciem tabletki mniej niż 12 godzin, skuteczność tego leku nie jest zmniejszona. Weź tę tabletkę, gdy tylko sobie przypomnisz, a następne tabletki przyjmuj o zwykłej porze.

Jeśli spóźniłaś się z przyjęciem tabletki więcej niż 12 godzin, skuteczność tego leku może być zmniejszona. Im więcej tabletek zapomniałaś pod rząd, tym większe jest ryzyko, że działanie antykoncepcyjne jest zmniejszone. Weź ostatnią zapomnianą tabletkę, gdy tylko sobie przypomnisz, a następne tabletki przyjmuj o zwykłej porze. Przez następne 7 dni stosowania tabletek używaj dodatkowego środka antykoncepcyjnego, takiego jak prezerwatywa. Jeśli zapomniałaś jednej lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu opakowania i miałaś stosunek płciowy w ciągu 7 dni poprzedzających zapomnienie, musisz liczyć się z możliwością zajścia w ciążę. Zapytaj lekarza o radę.

Co zrobić, jeśli masz zaburzenia żołądkowo-jelitowe (na przykład wymioty, ciężka biegunka)? Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi powyżej dotyczącymi zapomnienia tabletek. Jeśli wymiotujesz w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, używasz węgla aktywowanego lub masz ciężką biegunkę, istnieje ryzyko, że substancja czynna nie zostanie w pełni wchłonięta przez organizm.

Czy przyjęłaś zbyt dużo tego leku?

Nie ma doniesień o poważnych szkodliwych skutkach po przyjęciu zbyt wielu tabletek Desogestrel CF 0,075 mg jednocześnie. Możesz odczuwać nudności i wymioty. U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy. W celu uzyskania dalszych informacji, zapytaj lekarza o radę.

Jeśli przestaniesz przyjmować ten lek

Możesz przestać stosować Desogestrel CF 0,075 mg, kiedy tylko chcesz. Od dnia, w którym przestaniesz, nie będziesz już chroniona przed ciążą.

Masz inne pytania dotyczące stosowania tego leku lub chcesz przerwać leczenie? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, również ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre poważne działania niepożądane przypisywane stosowaniu Desogestrel CF 0,075 mg opisano w paragrafach „Rak piersi” i „Zakrzepica” w punkcie 2. Możesz przeczytać tę część, aby uzyskać więcej informacji i skontaktować się z lekarzem, jeśli to konieczne.

Podczas stosowania Desogestrel CF 0,075 mg mogą wystąpić nieregularne krwawienia z pochwy. Może to być ograniczone do kilku kropli lub może wystąpić większe krwawienie, podobne do lekkiego miesięcznego krwawienia, które wymaga użycia podpaski. Istnieje również możliwość, że krwawienia całkowicie zanikną. Nieregularne krwawienia nie są oznaką zmniejszonej ochrony przed ciążą. Ogólnie nie musisz nic robić i możesz kontynuować przyjmowanie Desogestrel CF 0,075 mg. Jeśli jednak krwawienie jest poważne lub długotrwałe, skontaktuj się z lekarzem.

Użytkownicy tabletek Desogestrel 0,075 mg zgłaszali następujące działania niepożądane:

Często (występują u mniej niż 1 na 10 użytkowników):

zmiany nastroju, obniżony nastrój, zmniejszone libido, ból głowy, nudności, trądzik, bolesność piersi, nieregularne lub brak miesiączki, przyrost masy ciała.

Czasami (występują u mniej niż 1 na 100 użytkowników):

infekcja pochwy, podrażnienie oczu przy używaniu soczewek kontaktowych, wymioty, wypadanie włosów, bolesne miesiączki, torbiel jajnika, zmęczenie.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 użytkowników):

wysypka skórna, pokrzywka (urticaria), bolesne niebiesko-czerwone guzki na skórze (rumień guzowaty).

Oprócz tych działań niepożądanych może również wystąpić wydzielina z piersi.

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak (i) obrzęk twarzy, języka lub gardła; (ii) trudności w połykaniu; lub (iii) pokrzywka i problemy z oddychaniem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również możliwych działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio do Holenderskiego Centrum Działań Niepożądanych Lareb, strona internetowa: www.lareb.nl. Zgłaszając działania niepożądane, możesz pomóc nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

5. Jak przechowywać ten lek?

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności jest podany na pudełku lub blistrze po „Nie stosować po” lub „EXP”. Podana jest tam miesiąc i rok. Ostatni dzień tego miesiąca jest terminem ważności.

Dla tego leku nie ma specjalnych warunków przechowywania.

Nie wyrzucaj leków do kanalizacji ani do kosza na śmieci. Zapytaj farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Zostaną one zniszczone w odpowiedzialny sposób i nie trafią do środowiska.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jakie substancje znajdują się w tym leku?

Substancją czynną w tym leku jest dezogestrel. Każda tabletkę zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu.

Inne substancje w tym leku to laktoza, skrobia ziemniaczana, powidon, all-rac- α - tokoferol, bezwodny koloidalny dwutlenek krzemu i kwas stearynowy (patrz także „Desogestrel CF 0,075 mg zawiera laktozę” w punkcie 2). Jak wygląda Desogestrel CF 0,075 mg i ile znajduje się w opakowaniu?

Tabletka jest okrągła, biała do złamanej bieli, niepowlekana i dwuwypukła z napisem „152” po jednej stronie i pustą po drugiej stronie.

Każde opakowanie zawiera 1, 3, 6 lub 13 kalendarzowych blistrów po 28 tabletek.

Każde opakowanie blistrów jest zapakowane w trójwarstwową saszetkę aluminiową z lub bez środka osuszającego.

Nie wszystkie wymienione wielkości opakowań są wprowadzane do obrotu.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producent

Posiadacz pozwolenia Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E

4814 NE Breda

Holandia

Producent

Producent

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Niemcy

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wiedeń

Austria

Zarejestrowany pod numerem:
RVG 110353 Desogestrel CF 0,075 mg, tabletki

Ten lek jest zarejestrowany w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Dania	Desogestrel STADA
Finlandia	Desogestrel STADA
Włochy	MIRZAM
Holandia:	Desogestrel CF 0,075 mg, tabletki
Hiszpania	Desogestrel STADA 75 microgramos comprimidos EFG
Szwecja	Desogestrel STADA

Ta ulotka została zatwierdzona po raz ostatni w grudniu 2021 r.

Transtoyou