

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Diflucan 50 mg, kapsulė, kieta
Diflucan 100 mg, kapsulė, kieta
Diflucan 150 mg, kapsulė, kieta
Diflucan 200 mg, kapsulė, kieta

flukonazolas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.
- Jei pasireiškia bet koks šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje, arba jei pasireiškia šalutinis poveikis, nenurodytas šiame pakuotės lapelyje, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Diflucan ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. KAS YRA DIFLUCAN IR KAM JIS VARTOJAMAS?

Diflucan priklauso vaistų grupei, vadinamai 'priešgrybeliniais vaistais'. Veiklioji medžiaga yra flukonazolas.

Diflucan vartojamas grybelinėms infekcijoms gydyti ir taip pat gali būti naudojamas siekiant išvengti Candida infekcijos. Dažniausia grybelinių infekcijų priežastis yra mielės, vadinamos Candida.

Suaugusieji

- Jūsų gydytojas gali skirti šį vaistą šių rūšių grybelinėms infekcijoms gydyti:
- kriptokokinį meningitą – grybelinę infekciją smegenyse
- kokcidiodomikozę – plaučių ir kvėpavimo takų ligą
- infekcijas, kurias sukelia Candida ir kurios randamos kraujyje, organuose (pvz., širdyje, plaučiuose) arba šlapimo takuose
- gleivinės kandidozę (burnos pienligę) – burnos, gerklės gleivinės infekciją ir uždegimus, susijusius su dantų protezų nešiotojais
- genitalijų kandidozę – makšties arba varpos infekciją
- odos infekcijas – pvz., pėdų grybelį, žiedinį kirmėlę, kojų/šlaunų odos grybelį, nagų infekciją.

Jūs taip pat galite gauti Diflucan, kad:

- išvengtumėte kriptokokinio meningito pasikartojimo
- išvengtumėte gleivinės kandidozės (burnos pienligės) pasikartojimo
- sumažintumėte makšties grybelinių infekcijų pasikartojimą
- išvengtumėte Candida infekcijos (jei jūsų imuninė sistema yra susilpnėjusi ir neveikia tinkamai).

Vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų

Jūsų vaiko gydytojas gali skirti šį vaistą šių rūšių grybelinėms infekcijoms gydyti:

- gleivinės kandidozę (burnos pienligę) – burnos, gerklės gleivinės infekciją
- infekcijas, kurias sukelia Candida ir kurios randamos kraujyje, organuose (pvz., širdyje, plaučiuose) arba šlapimo takuose
- kriptokokinį meningitą – grybelinę infekciją smegenyse.

Jūsų vaikas taip pat gali gauti Diflucan, kad:

- išvengtų Candida infekcijos (jei jo/jos imuninė sistema yra susilpnėjusi ir neveikia tinkamai)
- išvengtų kriptokokinės meningito pasikartojimo.

2. KADA NEGALITE VARTOTI ŠIO VAISTO ARBA TURITE BŪTI YPAČ ATSARGŪS?

Kada negalite vartoti šio vaisto?

- Jūs arba jūsų vaikas yra alergiški kitiems vaistams, kuriuos jūs arba jūsų vaikas vartojo grybelinėms infekcijoms gydyti, arba bet kuriai iš šio vaisto sudedamųjų dalių. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje. Simptomai gali būti: niežulys, odos paraudimas arba kvėpavimo sunkumai.
- Jūs arba jūsų vaikas vartojate astemizolį, terfenadiną (antihistamininius vaistus nuo alergijų).
- Jūs arba jūsų vaikas vartojate cisapridą (naudojamas skrandžio sutrikimams gydyti).
- Jūs arba jūsų vaikas vartojate pimozidą (naudojamas psichikos sutrikimams gydyti).
- Jūs arba jūsų vaikas vartojate chinidiną (naudojamas nereguliariam širdies ritmui gydyti).
- Jūs arba jūsų vaikas vartojate eritromiciną (antibiotikas infekcijoms gydyti).

Kada turite būti ypač atsargūs su šiuo vaistu?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku:

- jei jūs arba jūsų vaikas turi kepenų ar inkstų problemų
- jei jūs arba jūsų vaikas turi širdies ligų, įskaitant širdies ritmo sutrikimus
- jei jūs arba jūsų vaikas turi nenormalius kalio, kalcio ar magnio kiekius jūsų ar jo/jos kraujyje
- jei jūs arba jūsų vaikas patiria rimtas odos reakcijas (niežulys, odos paraudimas ar kvėpavimo problemos)
- jei jums ar jūsų vaikui pasireiškia antinksčių nepakankamumo simptomai, kai antinksčiai gamina nepakankamą tam tikrų steroidinių hormonų, tokių kaip kortizolis, kiekį (lėtinis arba ilgai trunkantis nuovargis, raumenų silpnumas, apetito stoka, svorio netekimas, pilvo skausmas)
- jei jums ar jūsų vaikui kada nors pasireiškė sunkus odos bėrimas ar odos lupimasis, pūslių susidarymas ir/arba žaizdelės burnoje po flukonazolo vartojimo.

Sunkiios odos reakcijos, įskaitant vaistų reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (DRESS), buvo praneštos gydant flukonazolu. Nutraukite Diflucan vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pastebėsite bet kurį iš simptomų, susijusių su šiomis sunkiomis odos reakcijomis, aprašytomis 4 skyriuje.

Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką, jei grybelinė infekcija nepagerėja, nes gali prireikti kito gydymo nuo grybelių.

Ar vartojate kitų vaistų?

Ar jūs ar jūsų vaikas, be Diflucan, vartojate kitų vaistų, ar neseniai vartojote, ar yra galimybė, kad jūs ar jūsų vaikas artimiausiu metu vartosite kitų vaistų? Pasakykite tai savo gydytojui, gydytojai, kuris gydo jūsų vaiką, arba vaistininkui.

Nedelsdami informuokite savo gydytoją arba jūsų vaiko gydytoją, jei jūs ar jūsų vaikas vartojate bet kurį iš šių vaistų: astemizolą, terfenadiną (antihistaminą alergijoms gydyti), cisapridą (naudojamą skrandžio problemoms gydyti), pimozidą (naudojamą psichikos sutrikimams gydyti), chinidiną (naudojamą širdies ritmo sutrikimams gydyti) arba eritromiciną (antibiotiką infekcijoms gydyti), nes šių vaistų negalima vartoti kartu su Diflucan (žr. skyrių: „Kada negalima vartoti šio vaisto?“).

Kai kurie vaistai gali sąveikauti su Diflucan. Informuokite savo gydytoją arba gydytoją, kuris gydo jūsų vaiką, jei jūs ar jūsų vaikas vartojate bet kurį iš šių vaistų. Gali prireikti koreguoti dozę arba stebėti, ar vaistai vis dar turi norimą poveikį:

- rifampicinas arba rifabutinas (antibiotikai nuo infekcijų)
- abrocitinibas (naudojamas atopiniam dermatitui, dar vadinamam atopiniu egzema arba konstituciniu egzema, gydyti)
- alfentanilis, fentanilis (naudojami kaip anestetikai)
- amitriptilinas, nortriptilinas (naudojami kaip antidepresantai)
- amfotericinas B, vorikonazolas (priešgrybeliniai vaistai)
- kraujo skiedikliai, siekiant išvengti kraujo krešulių (varfarinas arba panašūs vaistai)
- benzodiazepinai (midazolamas, triazolamas arba panašūs vaistai) naudojami miegui pagerinti arba nerimui mažinti
- karbamazepinas, fenitoinas (naudojami priepuoliams gydyti)
- nifedipinas, isradipinas, amlodipinas, verapamilis, felodipinas ir losartanas (dėl hipertenzijos: aukšto kraujospūdžio)
- olaparibas (naudojamas kiaušidžių vėžiui gydyti)
- ciklosporinas, everolimuzas, sirolimuzas arba takrolimuzas (siekiant išvengti atmetimo po transplantacijos)
- ciklofosfamidai, vinkos alkaloidai (vinkristinas, vinblastinas arba panašūs vaistai) naudojami vėžiui gydyti
- halofantrinas (naudojamas maliarijos gydymui)
- statinai (atorvastatinas, simvastatinas ir fluvastatinas arba panašūs vaistai) naudojami aukšto cholesterolio kiekio mažinimui
- metadonas (naudojamas skausmo malšinimui)
- celecoxibas, flurbiprofenas, naproksenas, ibuprofenas, lornoksikamas, meloksikamas, diklofenakas (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo [NVNU])
- priemonės nėštumui išvengti, vartojamos per burną (geriamieji kontraceptikai)
- prednizonas (steroidas)

- zidovudinas, dar vadinamas AZT; sakvinaviras (naudojamas ŽIV infekuotiems pacientams)
- vaistai diabetui gydyti, tokie kaip chlorpropamidas, glibenklamidas, glipizidas arba tolbutamidas
- teofilinas (naudojamas astmos gydymui)
- tofacitinibas (naudojamas reumatoidinio artrito gydymui)
- tolvaptanas naudojamas hiponatremijos (sumažėjusio natrio kiekio kraujyje) gydymui arba inkstų funkcijos mažėjimo lėtėjimui
- vitaminas A (maisto papildas)
- ivakaftoras (vienas arba kartu su vaistais naudojamas cistinės fibrozės gydymui)
- amjodaronas (naudojamas širdies ritmo sutrikimui (aritmijai) gydyti)
- hidrochlortiazidas (priemonė geresniam šlapinimuisi (diuretikas)
- ibrutinibas (naudojamas kraujo vėžio gydymui)
- lurasidonas (naudojamas šizofrenijos gydymui)

Į ką turėtumėte atkreipti dėmesį su maistu?
Galite vartoti savo vaistą su maistu arba be jo.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, norite pastoti ar maitinate krūtimi? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Jei planuojate pastoti, rekomenduojama po vienkartinės flukonazolo dozės palaukti savaitę prieš pastojant.

Ar jums buvo paskirtas ilgesnis gydymo kursas flukonazolu? Tuomet būtina naudoti tinkamą kontracepciją gydymo metu ir vieną savaitę po paskutinės dozės. Pasitarkite su savo gydytoju.

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia ar norite pastoti? Tuomet šio vaisto vartoti negalima, nebent gydytojas nurodė kitaip. Jei pastojate vartodami šį vaistą arba per 1 savaitę po paskutinės dozės, pasitarkite su savo gydytoju.

Jei flukonazolą vartojate pirmuosius tris ar antrą nėštumo mėnesį, galite turėti didesnę persileidimo riziką. Jei flukonazolą vartojate pirmuosius tris nėštumo mėnesius, jūsų kūdikis gali turėti didesnę širdies, kaulų ir/ar raumenų anomalijų riziką.

Yra pranešimų apie kūdikius, gimusius su įgimtomis kaukolės, ausų ir šlaunies bei alkūnės kaulų anomalijomis. Tai buvo moterims, kurios tris mėnesius ar ilgiau vartojo dideles flukonazolo dozes (400–800 mg per dieną) dėl kokcidioidomikozės. Ryšys tarp flukonazolo ir šių atvejų nėra aiškus.

Galite tęsti žindymą po vienkartinės 150 mg Diflucan dozės.
Negalite žindyti, jei vartojate kelias Diflucan dozes.

Vairavimas ir mechanizmų naudojimas

Vairuojant transporto priemones ar naudojant mechanizmus, turite atsižvelgti į tai, kad gali atsirasti galvos svaigimas ar traukuliai.

Diflucan sudėtyje yra laktozės (pieno cukraus) ir natrio (druskos)

Šio vaisto sudėtyje yra nedidelis kiekis laktozės (pieno cukraus). Jei gydytojas jums sakė, kad netoleruojate tam tikrų cukrų, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

Diflucan kietosios kapsulės taip pat turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje kapsulėje, tai reiškia, kad iš esmės yra „be natrio“.

3. KAIP VARTOTI ŠĮ VAISTĄ?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas. Abejojate dėl tinkamo vartojimo? Pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Nurykite kapsulę visą, užgerdami stikline vandens. Geriausia kapsules vartoti kasdien tuo pačiu metu.

Rekomenduojamos šio vaisto dozės įvairioms infekcijoms yra nurodytos žemiau:

Vartojimas suaugusiesiems

Būklė	Dozavimas
Kriptokokinės meningito gydymui	400 mg pirmą dieną, o vėliau kartą per dieną 200–400 mg 6–8 savaites arba ilgiau, jei reikia. Dozė kartais gali būti padidinta iki 800 mg
Siekiant išvengti, kad kriptokokinis meningitas nepasikartotų	kartą per dieną 200 mg, kol jums bus pasakyta, kad turite nutraukti
Kokcidoidomikozės gydymui	kartą per dieną 200–400 mg 11 mėnesių iki daugiausiai 24 mėnesių arba, jei reikia, ilgiau. Dozė kartais gali būti padidinta iki 800 mg
Vidinių scgrybelinių infekcijų, kurias sukelia Candida	800 mg pirmą dieną, o vėliau kartą per dieną 400 mg, kol jums bus pasakyta, kad turite nutraukti
Gleivinės infekcijų gydymui	200 mg iki 400 mg pirmą dieną, tada kartą per dieną 100 mg
burnojed, gerklės ir uždegimai	iki 200 mg, kol jums bus pasakyta nutraukti
gleivinė protezų nešiotojams	kartą per dieną 50 iki 400 mg
Gleivinės kandidozės gydymui (monburnos pienligė) – dozė priklauso nuo infekcijos vieta	7 iki 30 dienų, kol jums bus pasakyta nutraukti
Siekiant išvengti kad gleivinės infekcijos burnoje ar gerklėje pasikartotų	kartą per dieną 100 iki 200 mg, arba 3 kartus per savaitę 200 mg, kol yra infekcijos rizika
Genitalinės kandidozės gydymui	150 mg kaip vienkartinė dozė
Siekiant išvengti makšties sumažinti grybelines infekcijas	150 mg kas trečią dieną su iš viso 3 dozėmis (1, 4 ir 7 dieną) ir tada kartą per savaitę 6 mėnesius, kol yra infekcijos rizika
Grybelinių infekcijų gydymui odos ir nagų	priklausomai nuo vietos infekcija kartą per dieną 50 mg, kartą per savaitę 150 mg, kartą per savaitę 300 iki 400 mg 1-4 savaites (iki 6 savaičių, jei pėdų grybelis; nagų infekcijos atveju gydymas trunka, kol užkrėstas nagas pakeičiamas)

Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę. Jei pamiršote išgerti dozę, padarykite tai, kai tik prisiminsite. Tačiau jei jau beveik laikas kitai dozei, praleistos dozės nebevartokite.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMOS ŠALUTINĖS REAKCIJOS

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinių reakcijų, nors ne kiekvienas jas patiria.

Nustokite vartoti Diflucan ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos, jei pastebite bet kurį iš šių simptomų:

- odos bėrimas didelėje kūno dalyje, aukšta kūno temperatūra ir padidėję limfmazgiai (DRESS sindromas arba vaistų padidėjusio jautrumo sindromas).

Kai kurie žmonės patiria alergines reakcijas, nors sunkios alerginės reakcijos pasitaiko retai. Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma galimam šalutiniam poveikiui, kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje. Nedelsdami praneškite savo gydytojui, jei pasireiškia kuris nors iš šių simptomų:

- staigus švokštimas, sunkumas kvėpuoti arba spaudimas krūtinėje
- patinę vokai, veidas ar lūpos
- niežulys visame kūne, odos paraudimas arba niežtinčios raudonos dėmės
- odos bėrimas
- sunkios odos reakcijos, tokios kaip bėrimas su pūslių susidarymu (tai gali pasireikšti burnoje ir ant liežuvio)

Diflucan gali paveikti jūsų kepenis. Kepenų problemų požymiai yra:

- nuovargis
- apetito stoka
- vėmimas
- odos arba akių baltymų pageltimas (gelta)

Jei pasireiškia kuris nors iš šių požymių, nutraukite Diflucan vartojimą ir nedelsdami praneškite savo gydytojui.

Kitas šalutinis poveikis:

Dažnai pasitaikantis šalutinis poveikis (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų) yra:

- galvos skausmas
- skrandžio sutrikimai, viduriavimas, pykinimas, vėmimas
- padidėjusios kraujo tyrimų vertės kepenų funkcijos tyrimuose
- odos bėrimas

Kartais pasitaikantis šalutinis poveikis (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų) yra:

- sumažėjęs raudonųjų kraujo kūnelių kiekis, dėl kurio gali atsirasti blyški oda ir silpnumas arba dusulys

- sumažėjęs apetitas
- nemiga, mieguistumo jausmas
- traukuliai, galvos svaigimas, sukimasis, dilgčiojimas, kutenimas ar nejautrumas, skonio pokyčiai
- vidurių užkietėjimas, sunkus virškinimas, pilvo pūtimas, burnos džiūvimas
- raumenų skausmas
- kepenų pažeidimas ir odos ar akių pageltimas (gelta)
- strijos, pūslių susidarymas (dilgėlinė), niežulys, padidėjęs prakaitavimas
- nuovargis, bendras negalavimas, karščiavimas

Retai pasitaikantys šalutiniai poveikiai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų) yra:

- per mažas baltųjų kraujo kūnelių kiekis, kurie padeda apsaugoti nuo infekcijų, ir per mažas kraujo kūnelių kiekis, kurie padeda sustabdyti kraujavimą
- raudonos arba violetinės odos spalvos pokyčiai, kuriuos gali sukelti per mažas trombocitų kiekis, kiti kraujo ląstelių pokyčiai
- kraujo chemijos pokyčiai (didelis cholesterolio ar riebalų kiekis kraujyje)
- per mažas kalio kiekis kraujyje
- drebulys
- nenormalus elektrokardiograma (EKG), pakitęs širdies ritmas ar kitas širdies ritmas
- kepenų nepakankamumas
- alerginės reakcijos (kartais sunkios), įskaitant plačiai paplitusią odos bėrimą su pūslių susidarymu, odos lupimąsi, sunkias odos reakcijas, patinusias lūpas ar veidą
- plaukų slinkimas

Šalutiniai poveikiai, kurių dažnis nežinomas, bet gali pasireikšti (dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis):

- padidėjusio jautrumo reakcija su odos bėrimu, karščiavimu, patinusiomis liaukomis, tam tikrų baltųjų kraujo kūnelių (eozinofilų) padidėjimu ir vidaus organų (kepenų, plaučių, širdies, inkstų ir storosios žarnos) uždegimu (vaistų reakcija arba bėrimas su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (DRESS sindromas))

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Tai taip pat taikoma galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite tiesiogiai pranešti apie šalutinį poveikį per Nyderlandų šalutinių poveikių centrą Lareb, svetainė www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. KAIP LAIKYTI ŠĮ VAISTĄ?

- Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
- Nenaudokite šio vaisto pasibaigus galiojimo laikui. Jis nurodytas ant pakuotės po EXP. Ten nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.
- Laikyti žemesnėje kaip 30°C temperatūroje.

Vaistų neišpilkite į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebenaudojate. Jie bus sunaikinti atsakingai ir nepateks į aplinką.

6. PAKUOTĖS TURINYS IR KITA INFORMACIJA

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra flukonazolas.
- Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 50 mg, 100 mg, 150 mg arba 200 mg flukonazolo.
- Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra:

Kapsulių turinys: laktozės monohidratas, kukurūzų krakmolai, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas ir natrio laurilsulfatas (žr. 2 skyrių, Diflucan sudėtyje yra laktozės (pieno cukraus) ir natrio (druskos)).

Kapsulių apvalkalo sudėtis:

Kietos kapsulės 50 mg: želatina (E441), titano dioksidas (E171) ir Patentblauw V (E131)

Kietos kapsulės 100 mg: želatina (E441), titano dioksidas (E171), eritrozinas (E127) ir Patentblauw V (E131)

Kietos kapsulės 150 mg: želatina (E441), titano dioksidas (E171) ir Patentblauw V (E131)

Kietos kapsulės 200 mg: želatina (E441), titano dioksidas (E171), eritrozinas (E127) ir indigokarminas (E132)

Spausdinimo rašalas: šelakas (glazūra), juodasis geležies oksidas (E172), N-butilo alkoholis, dehidratuotas alkoholis, išgrynintas vanduo, propilenglikolis (E1520), pramoninis metilintas alkoholis, izopropilo alkoholis, stiprus amoniako tirpalas, kalio hidroksidas (E525).

Kaip atrodo Diflucan ir kiek jo yra pakuotėje?

- Diflucan kietos kapsulės 50 mg turi baltą apatinę dalį ir turkio mėlynumo viršutinę dalį. Jos turi užrašą „Pfizer“ ir kodą „FLU-50“ juodu rašalu.
- Diflucan kietos kapsulės 100 mg turi baltą apatinę dalį ir mėlyną viršutinę dalį. Jos turi užrašą „Pfizer“ ir kodą „FLU-100“ juodu rašalu.
- Diflucan kietos kapsulės 150 mg turi turkio mėlynumo apatinę dalį ir turkio mėlynumo viršutinę dalį. Jos turi užrašą „Pfizer“ ir kodą „FLU-150“ juodu rašalu.
- Diflucan kietos kapsulės 200 mg turi baltą apatinę dalį ir violetinę viršutinę dalį. Jos turi užrašą „Pfizer“ ir kodą „FLU-200“ juodu rašalu.

Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg ir 200 mg yra prieinamas pakuotėse po 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 100 arba 500 kietų kapsulių. Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra pateikiami rinkoje.

Leidimo prekiauti turėtojas ir gamintojas

Leidimo prekiauti turėtojas

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d IJssel

Gamintojas

Fareva Amboise

Pramoninė zona

29 Route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Prancūzija

Diflucan 50 mg, kapsulė, kieta yra įregistruota registre su RVG 13038.
Diflucan 100 mg, kapsulė, kieta yra įregistruota registre su RVG 14767.
Diflucan 150 mg, kapsulė, kieta yra įregistruota registre su RVG 13039. Diflucan 200 mg, kapsulė, kieta yra įregistruota registre su RVG 14768.

Klausimams apie šį vaistą, skambinkite Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

Šis vaistas yra registruotas Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje (Šiaurės Airijoje) šiais pavadinimais:

Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Norvegija, Portugalija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija), Islandija, Švedija, Kipras, Graikija, Vokietija	Diflucan
	Fungustatin
	Diflucan 50mg
	Diflucan 100mg
	Fungata
	Diflucan 200mg
Estija, Prancūzija	Diflucan 150mg
	Triflucan 50 mg kapsulė
	Triflucan 100 mg, kapsulė
	Triflucan 200 mg, kapsulė
	Fluconazole Pfizer 150mg, kapsulė
Vengrija	Diflucan 50 mg kietos kapsulės
	Diflucan 100 mg kietos kapsulės
	Diflucan 150 mg kietos kapsulės
	Diflucan 200 mg kietos kapsulės
Latvija, Lietuva	Diflucan 150 mg kietos kapsulės
	Diflucan 50 mg kietos kapsulės
	Diflucan 150 mg kietos kapsulės
Nyderlandai	Diflucan 50 mg, kapsulė, kieta
	Diflucan 100 mg, kapsulė, kieta
	Diflucan 150 mg, kapsulė, kieta
	Diflucan 200 mg, kapsulė, kieta
Austrija	Diflucan 50 mg kapsulės
	Diflucan 100 mg kapsulės
	Diflucan 150 mg kapsulės
	Diflucan 200 mg kapsulės
Rumunija	Diflucan 50 mg kapsulė
	Diflucan 150 mg kapsulė
Slovėnija	Diflucan 50 mg kietos kapsulės
	Diflucan 100 mg kietos kapsulės
	Diflucan 150 mg kietos kapsulės
Slovakija	Diflucan 50mg
	Diflucan 100mg
	Diflucan 150mg
Ispanija	Diflucan 50 mg kietos kapsulės
	Diflucan 100 mg kietos kapsulės
	Diflucan 150 mg kietos kapsulės

Diflucan 200 mg kietos kapsulės

Ši pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2024 m. vasario mėn..
Daugiau informacijos apie šį vaistą galima rasti Vaistų vertinimo tarybos svetainėje
(www.cbg-meb.nl).

Transtoyou