

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Diflucan 50 mg, kapsel, hard
Diflucan 100 mg, kapsel, hard
Diflucan 150 mg, kapsel, hard
Diflucan 200 mg, kapsel, hard

flukonazol

Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke dette legemidlet, for det inneholder viktig informasjon for deg.

- Oppbevar dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Har du flere spørsmål? Ta kontakt med legen, apoteket eller sykepleieren din.
- Ikke gi dette legemidlet til andre, da det kun er foreskrevet til deg. Det kan være skadelig for andre, selv om de har de samme symptomene som deg.
- Får du bivirkninger som er nevnt i avsnitt 4? Eller får du bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget? Ta da kontakt med legen, apoteket eller sykepleieren din.

Innholdet i dette pakningsvedlegget

1. Hva er Diflucan og hva brukes det til?
2. Når skal du ikke bruke dette legemidlet, eller må du være ekstra forsiktig?
3. Hvordan bruker du dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. HVA ER DIFLUCAN OG HVA BRUKES DET TIL?

Diflucan tilhører en gruppe legemidler som kalles 'soppmidler'. Det aktive stoffet er flukonazol.

Diflucan brukes til å behandle soppinfeksjoner og kan også brukes for å forhindre at du får en Candida-infeksjon. Den vanligste årsaken til soppinfeksjoner er en gjær, kalt Candida.

Voksne

- Legen din kan gi deg dette legemidlet for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
- kryptokokk-meningitt – en soppinfeksjon i hjernen
- koksidioidomykose – en tilstand i lungene og luftveiene
- infeksjoner forårsaket av Candida som finnes i blodbanen, organer (f.eks. hjerte, lunger) eller urinveiene
- slimhinnecandidiasis (trøske) – infeksjon i slimhinnen i munnen, halsen og betennelser i slimhinnen hos protesebrukere
- genital candidiasis – infeksjon i vagina eller penis
- hudinfeksjoner – f.eks. fotsopp, ringorm, hudsopp på ben/lyske, negleinfeksjon.

Du kan også få Diflucan for å:

- forhindre at kryptokokk-meningitt kommer tilbake

- forhindre at slimhinnecandidiasis (trøske) kommer tilbake
- redusere tilbakefall av vaginale soppinfeksjoner
- forhindre at du får en Candida-infeksjon (hvis immunsystemet ditt er svekket og ikke fungerer godt).

Barn og ungdom opp til 18 år

Barnets lege kan gi ham/henne dette legemidlet for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:

- slimhinnecandidiasis (trøske) – infeksjon i slimhinnen i munnen, halsen
- infeksjoner forårsaket av Candida som finnes i blodbanen, organer (f.eks. hjerte, lunger) eller urinveiene
- kryptokokk-meningitt – en soppinfeksjon i hjernen.

Barnet ditt kan også få Diflucan for å:

- forhindre at han/hun får en Candida-infeksjon (hvis hans/hennes immunsystem er svekket og ikke fungerer godt)
- forhindre at kryptokokk-meningitt kommer tilbake.

2. NÅR SKAL DU IKKE BRUKE DETTE MIDDELET? MÅ DU VÆRE EKSTRA FORSIKTIG MED DET?

Når skal du ikke bruke dette middelet?

- Du eller barnet ditt er allergisk mot andre legemidler som du eller barnet ditt har tatt for å behandle soppinfeksjoner, eller mot en av stoffene i dette legemidlet. Disse stoffene finner du i avsnitt 6. Symptomene kan blant annet være: kløe, rødhet i huden eller pustevansker.
- Du eller barnet ditt tar astemizol, terfenadin (antihistaminer mot allergier).
- Du eller barnet ditt tar cisaprid (brukt ved mageproblemer).
- Du eller barnet ditt tar pimozid (brukt i behandlingen av mentale lidelser).
- Du eller barnet ditt tar kinidin (brukt ved uregelmessig hjerterytme).
- Du eller barnet ditt tar erytromycin (et antibiotikum for behandling av infeksjoner).

Når må du være ekstra forsiktig med dette middelet?

Kontakt legen din eller apoteket før du bruker dette middelet:

- hvis du eller barnet ditt har lever- eller nyreproblemer
- hvis du eller barnet ditt har hjertesykdommer, inkludert hjerterytmeforstyrrelser
- hvis du eller barnet ditt har unormale kaliumnivåer, kalsium- eller magnesiumnivåer i ditt eller hans/hennes blod
- hvis du eller barnet ditt utvikler alvorlige hudreaksjoner (kløe, rødhet i huden eller pustevansker)
- hvis du eller barnet ditt utvikler symptomer på 'binyrebarksvikt', hvor binyrene produserer utilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner som kortisol (kronisk eller langvarig tretthet, muskelsvakhet, mangel på appetitt, vekttap, magesmerter)
- hvis du eller barnet ditt noen gang har hatt et alvorlig hudutslett eller hudavskalling, blemmer og/eller sår i munnen etter å ha tatt flukonazol.

Alvorlige hudreaksjoner, inkludert legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), er rapportert ved behandling med flukonazol. Slutt å ta Diflucan og

søk umiddelbart medisinsk hjelp hvis du merker noen av symptomene knyttet til disse alvorlige hudreaksjonene som er beskrevet i avsnitt 4.

Kontakt legen din eller apoteket hvis soppinfeksjonen ikke blir bedre, da det kan være nødvendig med en annen behandling mot sopp.

Bruker du andre legemidler?

Bruker du eller barnet ditt andre legemidler i tillegg til Diflucan, eller har du eller han/hun nylig gjort det, eller er det en mulighet for at du eller barnet ditt vil bruke andre legemidler i nær fremtid? Fortell det da til legen din, legen som behandler barnet ditt eller apoteket ditt.

Informer legen din eller barnets lege umiddelbart hvis du eller barnet ditt tar noen av følgende legemidler: astemizol, terfenadin (et antihistamin for behandling av allergier), cisaprid (brukt ved mageproblemer), pimozid (brukt ved behandling av mentale lidelser), kinidin (brukt for behandling av hjerterytmeforstyrrelser) eller erytromycin (et antibiotikum for behandling av infeksjoner), da disse legemidlene ikke må tas sammen med Diflucan (se avsnitt: 'Når skal du ikke bruke dette legemidlet?').

For noen legemidler kan det oppstå en interaksjon med Diflucan. Informer legen din eller legen som behandler barnet ditt hvis du eller barnet ditt tar noen av følgende legemidler. En justering av dosen kan være nødvendig eller kontroll for å sikre at legemidlene fortsatt har ønsket effekt:

- rifampicin eller rifabutin (antibiotika mot infeksjoner)
- abrocitinib (brukt ved behandling av atopisk dermatitt, også kjent som atopisk eksem eller konstitusjonelt eksem)
- alfentanil, fentanyl (brukt som anestetikum)
- amitriptylin, nortriptylin (brukt som antidepressivum)
- amfotericin B, vorikonazol (antisoppmiddel)
- blodfortynnende for å forhindre blodpropper (warfarin eller lignende legemidler)
- benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende legemidler) brukt for å hjelpe deg å sove eller mot angst
- karbamazepin, fenytoin (brukt ved anfall)
- nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin og losartan (ved hypertensjon: høyt blodtrykk)
- olaparib (brukt ved behandling av eggstokkreft)
- ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (for å forhindre avstøtning ved transplantasjoner)
- cyklofosamid, vinka-alkaloider (vinkristin, vinblastin eller lignende legemidler) brukt ved behandling av kreft
- halofantrin (brukt i behandling av malaria)
- statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende legemidler) brukt for å senke høye kolesterolnivåer
- metadon (brukt ved smertebehandling)
- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak (ikke-steroid antiinflammatoriske legemidler [NSAID])
- midler for å forhindre graviditet som tas oralt (orale prevensjonsmidler)
- prednison (steroid)
- zidovudin, også kalt AZT; saquinavir (brukt hos hiv-infiserte pasienter)

- legemidler for diabetes, som klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid
- teofyllin (brukt i behandling av astma)
- tofacitinib (brukt i behandling av revmatoid artritt)
- tolvaptan brukt i behandling av hyponatremi (reduerte natriumnivåer i blodet ditt) eller for å bremse nedgangen i nyrefunksjonen
- vitamin A (kosttilskudd)
- ivakaftor (alene eller i kombinasjon med legemidler brukt i behandling av cystisk fibrose)
- amiodaron (brukt ved en forstyrrelse i hjerterytmen (arytmi))
- hydroklortiazid (middel for å bedre vannlatingen (vanndrivende middel, diuretikum)
- ibrutinib (brukt i behandling av blodkreft)
- lurasidon (brukt i behandling av schizofreni)

Hva bør du være oppmerksom på med mat?
Du kan ta medisinen din med eller uten mat.

Graviditet, amming og fruktbarhet

Er du gravid, tror du at du er gravid, ønsker du å bli gravid eller ammer du? Ta da kontakt med legen din eller apoteket før du bruker dette legemidlet.

Hvis du planlegger å bli gravid, anbefales det å vente en uke etter en enkeltdose fluconazol før du blir gravid.

Har du fått foreskrevet en lengre behandlingskur med fluconazol? Da er det nødvendig å bruke passende prevensjon under behandlingen og deretter i en uke etter siste dose. Kontakt legen din om dette.

Er du gravid, tror du at du er gravid eller ønsker du å bli gravid? Da skal du ikke bruke dette legemidlet, med mindre legen din har sagt at du skal bruke det. Hvis du blir gravid mens du tar dette legemidlet eller innen 1 uke etter siste dose, kontakt legen din.

Hvis du bruker fluconazol i de første tre eller andre månedene av svangerskapet, kan du ha en økt risiko for spontanabort. Hvis du tar fluconazol i de første tre månedene av svangerskapet, kan du ha en økt risiko for at barnet ditt blir født med hjerte-, bein- og/eller muskelavvik.

Det er rapporter om babyer født med medfødte avvik i skallen, ørene og beinene i låret og albuen. Dette var hos kvinner som har fått høye doser fluconazol (400 til 800 mg per dag) i tre måneder eller lenger for coccidioidomykose. Forbindelsen mellom fluconazol og disse tilfellene er ikke klar.

Du kan fortsette å amme etter å ha tatt en enkeltdose på 150 mg Diflucan.
Du skal ikke amme hvis du bruker flere doser Diflucan.

Kjøring og bruk av maskiner

Når du kjører bil eller bruker maskiner, må du være oppmerksom på at svimmelhet eller anfall kan oppstå.

Diflucan inneholder laktose (melkesukker) og natrium (salt)

Dette legemidlet inneholder en liten mengde laktose (melkesukker). Hvis legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkerarter, kontakt legen din før du tar dette legemidlet.

Diflucan harde kapsler inneholder også mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, det vil si at det i hovedsak er 'natriumfritt'.

3. HVORDAN BRUKER DU DETTE LEGEMIDLET?

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Er du i tvil om riktig bruk? Kontakt legen din eller apoteket.

Svelg kapselen hel med et glass vann. Du bør ta kapslene dine til samme tid hver dag.

De anbefalte dosene for dette legemidlet ved forskjellige infeksjoner er oppført nedenfor:

Bruk hos voksne

Tilstand	Dosering
For behandling av kryptokokkmeningitt	400 mg på den første dagen og deretter en gang daglig 200 til 400 mg i 6 til 8 uker, eller lenger om nødvendig. Dosen kan noen ganger økes til 800 mg
For å forhindre at kryptokokkmeningitt kommer tilbake	en gang daglig 200 mg til du blir fortalt at du skal stoppe
For behandling av koksidioidomykose	en gang daglig 200 til 400 mg i 11 måneder til maksimalt 24 måneder eller om nødvendig lenger. Dosen kan noen ganger økes til 800 mg
For behandling av indre schimmelfeksjoner som forårsakes forårsaket av Candida	800 mg på den første dagen og deretter en gang daglig 400 mg til du blir fortalt at du skal stoppe
For behandling av slimhinneinfeksjoner i munnend, hals og betennelser i slimhinne hos protesebrukere	200 mg til 400 mg på den første dagen, deretter én gang daglig 100 mg opptil 200 mg til du blir fortalt at du må stoppe
For behandling av slimhinnecandidiasis (mundtrøske) – dose avhenger av sted for infeksjon	én gang daglig 50 til 400 mg i løpet av 7 til 30 dager til du blir fortalt at du må stoppe
For å forhindre at slimhinneinfeksjoner i munn eller hals kommer tilbake	én gang daglig 100 til 200 mg, eller 3 ganger per uke 200 mg, så lenge du har risiko for infeksjon
For behandling av genital candidiasis	150 mg som enkeltdose
For å forhindre tilbakefall av vaginal for å redusere soppinfeksjoner	150 mg hver tredje dag med en totalt 3 doser (dag 1, 4 og 7) og deretter en gang per uke i 6 måneder så lenge du har risiko for infeksjon
For behandling av soppinfeksjoner på huden og neglene	avhengig av stedet for infeksjon en gang daglig 50 mg, en gang per uke 150 mg, en gang per uke 300 til 400 mg i 1 til 4 uker (opptil 6 uker ved fotsopp; ved negleinfeksjon varer behandlingen til den infiserte neglen er erstattet)

For å forhindre at du får en Candida-infeksjon (hvis ditt immunsystem er svekket og ikke fungerer ordentlig) en gang daglig 200 til 400 mg så lenge du har risiko for infeksjon

Bruk hos ungdom i alderen 12 til 18 år
Følg doseringen som er foreskrevet av legen din (dosering for voksne eller dosering for barn).

Bruk hos barn opp til og med 11 år Maksimal dose for barn er 400 mg per dag.

Dosen vil bli fastsatt basert på barnets vekt i kilogram.

Tilstand	Daglig dose
Slimhinne Candidiasis (trost i munnen) og halsinfeksjoner forårsaket av Candida – dose og varighet avhenger av alvorlighetsgrad og infeksjonssted	en gang daglig 3 mg/kg kroppsvekt (på den første dagen kan 6 mg/kg kroppsvekt gis)
Cryptokokk-meningitt eller indre soppinfeksjoner forårsaket av Candida	en gang daglig 6 mg til 12 mg/kg kroppsvekt
For å forhindre at cryptokokk-meningitt kommer tilbake	en gang daglig 6 mg/kg kroppsvekt
For å forhindre at barn får en Candida-infeksjon pådra seg (hvis deres immunsystem ikke fungerer godt)	en gang daglig 3 mg til 12 mg/kg kroppsvekt

Bruk hos barn fra 0 til 4 uker gamle Bruk hos barn fra 3 til 4 uker gamle:
Samme dose som ovenfor, men administrert en gang hver 2. dag. Maksimal dosering er 12 mg/kg kroppsvekt per 48 timer.

Bruk hos barn yngre enn 2 uker:
Samme dose som ovenfor, men administrert en gang hver 3. dag. Maksimal dosering er 12 mg/kg kroppsvekt per 72 timer.

Bruk hos eldre
Du bør få den vanlige dosen for voksne, med mindre du har nyreproblemer.

Bruk hos pasienter med nyreproblemer
Legen din kan justere dosen din, avhengig av nyrefunksjonen din.

Har du brukt for mye av dette legemidlet?
Hvis du tar for mange kapsler samtidig, kan du bli syk. Kontakt legen din eller legevakten på nærmeste sykehus umiddelbart. Symptomene på en mulig overdose kan være: høre, se, føle og tenke ting som ikke er der (hallusinasjoner og paranoid atferd). Behandling av symptomene som oppstår (med støttende tiltak og om nødvendig mageskylling) kan være tilstrekkelig.

Har du glemt å bruke dette legemidlet?

Ikke ta en dobbel dose for å kompensere for en glemt dose. Hvis du har glemt å ta en dose, bør du ta den så snart du husker det. Hvis det imidlertid nesten er tid for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen.

Har du flere spørsmål om bruken av dette legemidlet? Ta kontakt med legen din eller apoteket.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan også dette legemidlet ha bivirkninger, selv om ikke alle får dem.

Stopp å ta Diflucan og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp hvis du merker noen av følgende symptomer:

- hudutslett over en stor del av kroppen, høy kroppstemperatur og forstørrede lymfeknuter (DRESS-syndrom eller legemiddeloverfølsomhetssyndrom).

Noen mennesker utvikler allergiske reaksjoner, selv om alvorlige allergiske reaksjoner sjelden forekommer. Får du bivirkninger, kontakt legen din eller apoteket. Dette gjelder også mulige bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget. Fortell legen din umiddelbart hvis du får noen av følgende symptomer:

- plutselig piping i brystet, pustevansker eller trykk i brystet
- hovne øyelokk, ansikt eller lepper
- kløe over hele kroppen, rødhet i huden eller kløende røde flekker
- hudutslett
- alvorlige hudreaksjoner som hudutslett med blemmer (dette kan forekomme i munnen og på tungen)

Diflucan kan påvirke leveren din. Tegn på leverproblemer inkluderer:

- tretthet
- manglende appetitt
- oppkast
- gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott)

Hvis noen av disse symptomene oppstår, slutt å ta Diflucan og fortell legen din umiddelbart.

Andre bivirkninger:

Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 brukere) er:

- hodepine
- mageproblemer, diaré, kvalme, oppkast
- økte verdier i blodprøver ved leverfunksjonstester
- hudutslett

Noen ganger forekommende bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere) er:

- redusert antall røde blodceller, noe som kan føre til blek hud og svakhet eller kortpustethet

- nedsatt appetitt
- søvnløshet, føler seg søvnnig
- anfall, svimmelhet, følelse av å være ør, prikking, kribling eller nummenhet, smakforandringer
- forstoppelse, vanskelig fordøyelse, oppblåsthet, tørr munn
- muskelsmerter
- leverskade og gul misfarging av huden eller øynene (gulsott)
- utslett, blemmer (elveblest), kløe, økt svette
- tretthet, generell følelse av ubehag, feber

Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere) er:

- for lavt antall hvite blodceller som hjelper til med å beskytte mot infeksjoner og for lavt antall blodceller som hjelper til med å stoppe blødninger
- rød eller lilla misfarging av huden, som kan være forårsaket av for lavt antall blodplater, andre endringer i blodcellene
- endringer i blodkjemien (høye kolesterol- eller fettverdier i blodet)
- for lite kalium i blodet
- skjelving
- unormalt elektrokardiogram (EKG), endret hjerterytme eller annen hjerterytme
- leversvikt
- allergiske reaksjoner (noen ganger alvorlige), inkludert utbredt hudutslett med blemmer, avskalling av huden, alvorlige hudreaksjoner, hovne lepper eller ansikt
- hårtap

Bivirkninger med ukjent frekvens, men som kan oppstå (frekvensen kan ikke bestemmes ut fra tilgjengelige data):

- overfølsomhetsreaksjon med hudutslett, feber, hovne kjertler, økning av visse hvite blodceller (eosinofili) og betennelse i indre organer (lever, lunger, hjerte, nyrer og tykktarm) (legemiddelreaksjon eller utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS-syndrom))

Rapportering av bivirkninger

Får du bivirkninger, kontakt legen din, apoteket eller sykepleieren. Dette gjelder også for mulige bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via det norske bivirkningscenteret RELIS, nettside www.relis.no. Ved å rapportere bivirkninger kan du hjelpe oss med å få mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

5. HVORDAN OPPBEVARER DU DETTE MIDDELET?

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen. Den står på pakningen etter EXP. Der står en måned og et år. Den siste dagen i den måneden er utløpsdatoen.
- Oppbevares under 30°C.

Skyll ikke legemidler i vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtten. Spør apoteket hva du skal gjøre med legemidler du ikke lenger bruker. De vil da bli destruert på en ansvarlig måte og ikke komme ut i miljøet.

6. INNHOLD AV PAKNINGEN OG ØVRIG INFORMASJON

Hvilke stoffer inneholder dette middelet?

- Det aktive stoffet i dette middelet er flukonazol.
- Hver harde kapsel inneholder 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol.
- De andre stoffene i dette middelet er:

Innholdet i kapslene: laktosemonohydrat, maisstivelse, vannfri kolloidal silisiumdioksid, magnesiumstearat og natriumlaurylsulfat (se avsnitt 2, Diflucan inneholder laktose (melkesukker) og natrium (salt)).

Sammensetning av kapselskallet:

Harde kapsler 50 mg: gelatin (E441), titandioksid (E171) og Patentblått V (E131)

Harde kapsler 100 mg: gelatin (E441), titandioksid (E171), erytrosin (E127) og Patentblått V (E131)

Harde kapsler 150 mg: gelatin (E441), titandioksid (E171) og Patentblått V (E131)

Harde kapsler 200 mg: gelatin (E441), titandioksid (E171), erytrosin (E127) og indigokarmin (E132)

Trykkfarge: skjellakk (glasur), svart jernoksid (E172), N-butylalkohol, dehydrert alkohol, rensed vann, propylenglykol (E1520), industrielt metylert alkohol, isopropylalkohol, sterk ammoniakkløsning, kaliumhydroksid (E525).

Hvordan ser Diflucan ut og hvor mye er det i en pakke?

- Diflucan harde kapsler på 50 mg har en hvit nedre halvdel med en turkisblå øvre halvdel. De har påskriften "Pfizer" og koden "FLU-50" i svart blekk.
- Diflucan harde kapsler på 100 mg har en hvit nedre halvdel og en blå øvre halvdel. De har påskriften "Pfizer" og koden "FLU-100" i svart blekk.
- Diflucan harde kapsler på 150 mg har en turkisblå nedre halvdel og en turkisblå øvre halvdel. De har påskriften "Pfizer" og koden "FLU-150" i svart blekk.
- Diflucan harde kapsler på 200 mg har en hvit nedre halvdel og en lilla øvre halvdel. De har påskriften "Pfizer" og koden "FLU-200" i svart blekk.

Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg er tilgjengelig i pakninger med 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 100 eller 500 harde kapsler. Ikke alle nevnte pakningsstørrelser markedsføres.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og produsent

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d IJssel

Produsent

Fareva Amboise

Industriområde

29 Route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Frankrike

Diflucan 50 mg, kapsel, hard er registrert under RVG 13038.

Diflucan 100 mg, kapsel, hard er registrert under RVG 14767.

Diflucan 150 mg, kapsel, hard er registrert under RVG 13039. Diflucan 200 mg, kapsel, hard er registrert under RVG 14768.

For spørsmål om dette legemidlet, ring Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

Dette legemidlet er registrert i medlemslandene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og i Storbritannia (Nord-Irland) under følgende navn:

Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Finland, Irland, Italia, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannia (Nord-Irland), Island, Sverige Kypros, Hellas Tyskland	Diflucan
Estland	Fungustatin
Frankrike	Diflucan 50mg Diflucan 100mg Fungata Diflucan 200mg Diflucan 150mg
Ungarn	Triflucan 50 mg kapsel Triflucan 100 mg, kapsel Triflucan 200 mg, kapsel Fluconazole Pfizer 150mg, kapsel Diflucan 50 mg hard kapsel Diflucan 100 mg hard kapsel Diflucan 150 mg hard kapsel Diflucan 200 mg hard kapsel
Latvia	Diflucan 150 mg harde kapsler
Litauen	Diflucan 50 mg harde kapsler Diflucan 150 mg harde kapsler
Nederland	Diflucan 50 mg, kapsel, hard Diflucan 100 mg, kapsel, hard Diflucan 150 mg, kapsel, hard Diflucan 200 mg, kapsel, hard
Østerrike	Diflucan 50 mg kapsler Diflucan 100 mg kapsler Diflucan 150 mg kapsler Diflucan 200 mg kapsler
Romania	Diflucan 50 mg kapsel Diflucan 150 mg kapsel
Slovenia	Diflucan 50 mg harde kapsler Diflucan 100 mg harde kapsler Diflucan 150 mg harde kapsler
Slovakia	Diflucan 50 mg Diflucan 100 mg Diflucan 150 mg
Spania	Diflucan 50 mg harde kapsler Diflucan 100 mg harde kapsler Diflucan 150 mg harde kapsler Diflucan 200 mg harde kapsler

Denne pakningsvedlegget ble sist godkjent i februar 2024.
Mer informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk (www.cbg-meb.nl).

Transtoyou