

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Diflucan 50 mg, capsulă, tare
Diflucan 100 mg, capsulă, tare
Diflucan 150 mg, capsulă, tare
Diflucan 200 mg, capsulă, tare

fluconazol

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.
- Aveți întrebări suplimentare? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

Conținutul acestui prospect

1. Ce este Diflucan și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE DIFLUCAN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ ACEST MEDICAMENT?

Diflucan aparține unui grup de medicamente numite „antimicotice”. Substanța activă este fluconazol.

Diflucan este utilizat pentru a trata infecțiile fungice și poate fi, de asemenea, utilizat pentru a preveni apariția unei infecții cu Candida. Cea mai frecventă cauză a infecțiilor fungice este o drojdie numită Candida.

Adulți

- Medicul dumneavoastră vă poate prescrie acest medicament pentru a trata următoarele tipuri de infecții fungice:
- meningita criptococică – o infecție fungică a creierului
- coccidioidomicoză – o afecțiune a plămânilor și a căilor respiratorii
- infecții cauzate de Candida care se găsesc în fluxul sanguin, organe (de exemplu, inimă, plămâni) sau tractul urinar
- candidoză mucoasă (stomatită) – infecție a mucoasei gurii, gâtului și inflamații ale mucoasei la purtătorii de proteze dentare
- candidoză genitală – infecție a vaginului sau penisului

- infecții ale pielii – de exemplu, picior de atlet, pecingine, micoză a pielii picioarelor/inghinală, infecție a unghiilor.

Puteți primi Diflucan și pentru:

- a preveni reapariția meningitei criptococice
- a preveni reapariția candidozei mucoase (stomatită)
- a reduce reapariția infecțiilor vaginale fungice
- a preveni apariția unei infecții cu Candida (dacă sistemul dumneavoastră imunitar este slăbit și nu funcționează corect).

Copii și adolescenți până la 18 ani

Medicul copilului dumneavoastră îi poate prescrie acest medicament pentru a trata următoarele tipuri de infecții fungice:

- candidoză mucoasă (stomatită) – infecție a mucoasei gurii, gâtului
- infecții cauzate de Candida care se găsesc în fluxul sanguin, organe (de exemplu, inimă, plămâni) sau tractul urinar
- meningita criptococică – o infecție fungică a creierului.

Copilul dumneavoastră poate primi Diflucan pentru a:

- preveni o infecție cu Candida (dacă sistemul său imunitar este slăbit și nu funcționează corect)
- preveni reapariția meningitei criptococice.

2. CÂND NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI ACEST MEDICAMENT SAU TREBUIE SĂ FIȚI EXTRA ATENT?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

- Sunteți dumneavoastră sau copilul dumneavoastră alergic la alte medicamente pe care le-ați luat dumneavoastră sau copilul dumneavoastră pentru a trata infecțiile fungice, sau la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6. Simptomele pot include: mâncărime, roșeață a pielii sau dificultăți de respirație.
- Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră luați astemizol, terfenadină (antihistaminice pentru alergii).
- Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră luați cisapridă (utilizată pentru probleme de stomac).
- Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră luați pimozidă (utilizată în tratamentul afecțiunilor mentale).
- Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră luați chinidină (utilizată pentru un ritm cardiac neregulat).
- Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră luați eritromicină (un antibiotic pentru tratamentul infecțiilor).

Când trebuie să fiți extra atent cu acest medicament?

Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament:

- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți probleme hepatice sau renale
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți afecțiuni cardiace, inclusiv aritmii

- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți niveluri anormale de potasiu, calciu sau magneziu în sângele dumneavoastră sau al său
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră dezvoltați reacții cutanate severe (mâncărime, roșeață a pielii sau probleme de respirație)
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră dezvoltați simptome de 'insuficiență suprarenală', în care glandele suprarenale nu produc cantități suficiente de anumite hormoni steroizi, cum ar fi cortizolul (oboseală cronică sau de lungă durată, slăbiciune musculară, lipsa poftei de mâncare, pierdere în greutate, dureri abdominale)
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră ați avut vreodată o erupție cutanată severă sau descumare a pielii, formare de vezicule și/sau leziuni în gură după administrarea de fluconazol.

Reacții cutanate severe, inclusiv reacție medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemice (DRESS), au fost raportate în timpul tratamentului cu fluconazol. Oprți administrarea de Diflucan și solicitați imediat ajutor medical dacă observați oricare dintre simptomele asociate cu aceste reacții cutanate severe descrise în secțiunea 4.

Contactați medicul sau farmacistul dacă infecția fungică nu se ameliorează, deoarece poate fi necesar un alt tratament antifungic.

Utilizați alte medicamente?

Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră utilizați alte medicamente pe lângă Diflucan, sau ați făcut acest lucru recent sau există posibilitatea să utilizați alte medicamente în viitorul apropiat? Informați medicul dumneavoastră, medicul care tratează copilul dumneavoastră sau farmacistul.

Informați imediat medicul dumneavoastră sau medicul copilului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră luați oricare dintre următoarele medicamente: astemizol, terfenadină (un antihistaminic pentru tratamentul alergiilor), cisapridă (utilizată pentru probleme gastrice), pimozidă (utilizată în tratamentul afecțiunilor mentale), chinidină (utilizată pentru tratamentul aritmiilor cardiace) sau eritromicină (un antibiotic pentru tratamentul infecțiilor), deoarece aceste medicamente nu trebuie administrate împreună cu Diflucan (vezi secțiunea: 'Când nu trebuie să utilizați acest medicament?').

Unele medicamente pot interacționa cu Diflucan. Informați medicul dumneavoastră sau medicul care tratează copilul dumneavoastră dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră luați oricare dintre următoarele medicamente. Poate fi necesară ajustarea dozei sau monitorizarea pentru a verifica dacă medicamentele au în continuare efectul dorit:

- rifampicină sau rifabutină (antibiotice împotriva infecțiilor)
- abrocitinib (utilizat în tratamentul dermatitei atopice, cunoscută și sub numele de eczemă atopică sau eczemă constituțională)
- alfentanil, fentanil (utilizat ca anestezic)
- amitriptilină, nortriptilină (utilizate ca antidepresive)
- amfotericină B, voriconazol (antifungic)
- anticoagulante pentru prevenirea cheagurilor de sânge (warfarină sau medicamente similare)

- benzodiazepine (midazolam, triazolam sau medicamente similare) utilizate pentru a vă ajuta să dormiți sau împotriva anxietății
- carbamazepină, fenitoină (utilizate pentru convulsii)
- nifedipină, isradipină, amlodipină, verapamil, felodipină și losartan (pentru hipertensiune: tensiune arterială ridicată)
- olaparib (utilizat în tratamentul cancerului ovarian)
- ciclosporină, everolimus, sirolimus sau tacrolimus (pentru prevenirea respingerii la transplanturi)
- ciclofosamidă, alcaloizi din vinca (vincristină, vinblastină sau medicamente similare) utilizate în tratamentul cancerului
- halofantrină (utilizată în tratamentul malariei)
- statine (atorvastatină, simvastatină și fluvastatină sau medicamente similare) utilizate pentru scăderea nivelului ridicat de colesterol
- metadonă (utilizată pentru ameliorarea durerii)
- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (antiinflamatoare nesteroidiene [AINS])
- medicamente pentru prevenirea sarcinii administrate pe cale orală (contraceptive orale)
- prednison (steroid)
- zidovudină, cunoscută și sub numele de AZT; saquinavir (utilizate la pacienții infectați cu HIV)
- medicamente pentru diabet, cum ar fi clorpropamidă, glibenclamidă, glipizidă sau tolbutamidă
- teofilină (utilizată în tratamentul astmului)
- tofacitinib (utilizat în tratamentul artritei reumatoide)
- tolvaptan utilizat în tratamentul hiponatremiei (niveluri scăzute de sodiu în sânge) sau pentru a încetini declinul funcției renale
- vitamina A (supliment alimentar)
- ivacaftor (singur sau combinat cu medicamente utilizate în tratamentul fibrozei chistice)
- amiodaronă (utilizată în tulburări ale ritmului cardiac (aritmie))
- hidroclorotiazidă (medicament pentru a facilita urinarea (diuretic)
- ibrutinib (utilizat în tratamentul cancerului de sânge)
- lurasidonă (utilizată în tratamentul schizofreniei)

La ce trebuie să fiți atenți cu mâncarea?

Puteți lua medicamentul cu sau fără alimente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Atunci contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Dacă intenționați să rămâneți gravidă, se recomandă să așteptați o săptămână după o doză unică de fluconazol înainte de a rămâne gravidă.

Vi s-a prescris un tratament mai lung cu fluconazol? Atunci este necesar să utilizați contracepție adecvată în timpul tratamentului și apoi timp de o săptămână după ultima doză. Contactați medicul pentru mai multe informații.

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă sau doriți să rămâneți gravidă? Atunci nu trebuie să utilizați acest medicament, cu excepția cazului în care medicul v-a spus că trebuie să-l

utilizați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați acest medicament sau în decurs de 1 săptămână după ultima doză, contactați medicul.

Dacă utilizați fluconazol în primele trei sau în a doua lună de sarcină, puteți avea un risc mai mare de avort spontan. Dacă luați fluconazol în primele trei luni de sarcină, puteți avea un risc mai mare ca bebelușul să se nască cu malformații ale inimii, oaselor și/sau mușchilor.

Există rapoarte despre bebeluși născuți cu malformații congenitale ale craniului, urechilor și oaselor coapsei și cotului. Acest lucru a fost observat la femeile care au primit doze mari de fluconazol (400 până la 800 mg pe zi) timp de trei luni sau mai mult pentru coccidioomicoză. Legătura dintre fluconazol și aceste cazuri nu este clară.

Puteți continua să alăptați după ce ați luat o doză unică de 150 mg Diflucan. Nu trebuie să alăptați dacă utilizați mai multe doze de Diflucan.

Aptitudinea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje
La conducerea vehiculelor sau utilizarea utilajelor, trebuie să țineți cont de faptul că pot apărea amețeli sau convulsii.

Diflucan conține lactoză (zahăr din lapte) și sodiu (sare)
Acest medicament conține o cantitate mică de lactoză (zahăr din lapte). Dacă medicul v-a informat că nu tolerați anumite zaharuri, contactați medicul înainte de a lua acest medicament.

Capsulele tari Diflucan conțin, de asemenea, mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per capsulă, ceea ce înseamnă că este practic 'fără sodiu'.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ ACEST MEDICAMENT?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Atunci contactați medicul sau farmacistul.

Înghițiți capsula întreagă cu un pahar de apă. Cel mai bine este să luați capsulele la aceeași oră în fiecare zi.

Dozele recomandate pentru acest medicament în diferite infecții sunt prezentate mai jos:

Utilizare la adulți

Afecțiune	Dozare
Pentru tratamentul meningitei criptococice	400 mg în prima zi și apoi o dată pe zi 200 până la 400 mg timp de 6 până la 8 săptămâni, sau mai mult dacă este necesar. Doza poate fi uneori crescută până la 800 mg o dată pe zi 200 mg până când vi se spune să opriți
Pentru a preveni că meningita criptococică revine	o dată pe zi 200 până la 400 mg timp de 11 luni până la maximum 24 de luni sau mai mult
Pentru tratamentul coccidioomicozei	

	dacă este necesar. Doza poate fi uneori crescută până la 800 mg
Pentru tratamentul infecțiilor interne scinfecții fungice cauzate de Candida	800 mg în prima zi și apoi o dată pe zi 400 mg până când vi se spune să opriți
Pentru tratamentul infecțiilor mucoase în gură, gât și inflamații ale mucoasei la purtătorii de proteze dentare	200 mg până la 400 mg în prima zi, apoi o dată pe zi 100 mg până la 200 mg până când vi se spune să opriți
Pentru tratamentul candidozei mucoasei (moniliază orală) – doza depinde de locul infecției	o dată pe zi 50 până la 400 mg timp de 7 până la 30 de zile până când vi se spune să opriți
Pentru a preveni infecțiile mucoasei în gura sau gâtul să revină	o dată pe zi 100 până la 200 mg, sau de 3 ori pe săptămână 200 mg, atâta timp cât aveți risc de infecție
Pentru tratamentul candidozei genitale	150 mg ca doză unică
Pentru a preveni revenirea vaginală pentru a reduce infecțiile fungice	150 mg la fiecare a treia zi cu un total de 3 doze (ziua 1, 4 și 7) și apoi o dată pe săptămână timp de 6 luni atâta timp cât există risc de infecție
Pentru tratarea infecțiilor fungice de pe piele și unghii	în funcție de locul infecției o dată pe zi 50 mg, o dată pe săptămână 150 mg, o dată pe săptămână 300 până la 400 mg timp de 1 până la 4 săptămâni (până la 6 săptămâni în cazul ciupercii piciorului; în cazul infecției unghiilor, tratamentul durează până când unghia infectată este înlocuită)
Pentru a preveni să aveți o infecție cu Candida (dacă sistemul dumneavoastră imunitar este slăbit și nu funcționează bine)	o dată pe zi 200 până la 400 mg atâta timp cât există risc de infecție

Respectați doza prescrisă de medicul dumneavoastră (doza pentru adulți sau doza pentru copii).

Utilizare la copii până la vârsta de 11 ani Doza maximă pentru copii este de 400 mg pe zi.

Doza va fi stabilită pe baza greutății copilului în kilograme.

Afecțiuni

Afecțiune	Doza zilnică
Candidoză mucoasă (stomatită) și infecții ale gâtului cauzate de Candida – doza și durata depind de gravitatea și locul infecției	o dată pe zi 3 mg/kg greutatea corporală (în prima zi poate fi 6 mg/kg greutate corporală administrată)
Meningită criptococică sau infecții interne	o dată pe zi 6 mg până la 12 mg/kg
infecții fungice cauzate de de Candida	greutatea corporală
Pentru a preveni	o dată pe zi 6 mg/kg

recidiva meningitei criptococice
Pentru a preveni ca copiii să dezvolte
A contracta o infecție cu Candida (dacă
sistemul imunitar nu funcționează corect)

greutatea corporală
o dată pe zi 3 mg până la 12 mg/kg
greutatea corporală

Utilizare la copii cu vârsta de 0 până la 4 săptămâni Utilizare la copii cu vârsta de 3 până la 4 săptămâni:

Aceeași doză ca mai sus, dar administrată o dată la 2 zile. Doza maximă este de 12 mg/kg greutate corporală la fiecare 48 de ore.

Utilizare la copii mai mici de 2 săptămâni:

Aceeași doză ca mai sus, dar administrată o dată la 3 zile. Doza maximă este de 12 mg/kg greutate corporală la fiecare 72 de ore.

Utilizare la vârstnici

Trebuie să primiți doza obișnuită pentru adulți, cu excepția cazului în care aveți probleme renale.

Utilizare la pacienți cu probleme renale

Medicul dumneavoastră poate ajusta doza în funcție de funcția renală.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Dacă luați prea multe capsule deodată, puteți deveni bolnav. Contactați imediat medicul dumneavoastră sau departamentul de urgență al celui mai apropiat spital. Simptomele unei posibile supradoze pot include: auzirea, vederea, simțirea și gândirea lucrurilor care nu sunt reale (halucinații și comportament paranoic). Tratamentul simptomelor care apar (cu măsuri de susținere și, dacă este necesar, spălături gastrice) poate fi suficient.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. Dacă ați uitat să luați o doză, faceți acest lucru imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, nu mai luați doza uitată.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

4. POSIBILE REACȚII ADVERSE

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea le experimentează.

Opriti administrarea Diflucan și solicitați imediat ajutor medical dacă observați oricare dintre următoarele simptome:

- erupție cutanată pe o mare parte a corpului, temperatură corporală ridicată și ganglioni limfatici măriți (sindrom DRESS sau sindrom de hipersensibilitate la medicamente).

Câteva persoane dezvoltă reacții alergice, deși reacțiile alergice severe apar rar. Dacă aveți efecte secundare, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru se aplică și pentru posibilele efecte secundare care nu sunt menționate în acest prospect. Informați imediat medicul dacă aveți oricare dintre următoarele simptome:

- respirație șuierătoare bruscă, dificultăți de respirație sau presiune în piept
- pleoape, față sau buze umflate
- mâncărime pe tot corpul, roșeață a pielii sau pete roșii care provoacă mâncărime
- erupție cutanată
- reacții severe ale pielii, cum ar fi erupții cutanate cu formare de vezicule (acestea pot apărea în gură și pe limbă)

Diflucan poate afecta ficatul dumneavoastră. Simptomele problemelor hepatice includ:

- oboseală
- lipsa poftei de mâncare
- vărsături
- îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter)

Dacă apare oricare dintre aceste simptome, opriți administrarea Diflucan și informați imediat medicul.

Alte efecte secundare:

Efecte secundare frecvente (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori) sunt:

- dureri de cap
- probleme stomacale, diaree, greață, vărsături
- valori crescute ale testelor de sânge la examinarea funcției hepatice
- erupție cutanată

Efecte secundare mai puțin frecvente (apar la mai puțin de 1 din 100 utilizatori) sunt:

- scăderea numărului de globule roșii, ceea ce poate duce la piele palidă și slăbiciune sau dificultăți de respirație
- scăderea apetitului
- insomnie, senzație de somnolență
- convulsii, amețeli, senzație de vertij, furnicături, înțepături sau amorțeală, modificări ale gustului
- constipație, indigestie, flatulență, gură uscată
- dureri musculare
- afectare hepatică și îngălbenirea pielii sau a ochilor (icter)
- erupții cutanate, vezicule (urticarie), mâncărime, transpirație crescută
- oboseală, senzație generală de rău, febră

Reacții adverse rare (apar la mai puțin de 1 din 1000 de utilizatori) sunt:

- număr scăzut de globule albe care ajută la protejarea împotriva infecțiilor și număr scăzut de celule sanguine care ajută la oprirea sângerărilor
- decolorare roșie sau purpurie a pielii, care poate fi cauzată de un număr scăzut de trombocite, alte modificări ale celulelor sanguine
- modificări ale chimiei sângelui (niveluri ridicate de colesterol sau grăsimi în sânge)
- nivel scăzut de potasiu în sânge
- tremurături

- electrocardiogramă (ECG) anormală, ritm cardiac modificat sau alt ritm cardiac
- insuficiență hepatică
- reacții alergice (uneori severe), inclusiv erupții cutanate extinse cu vezicule, descumarea pielii, reacții severe ale pielii, buze sau față umflate
- căderea părului

Reacții adverse a căror frecvență nu este cunoscută, dar care pot apărea (frecvența nu poate fi determinată cu datele disponibile):

- reacție de hipersensibilitate cu erupție cutanată, febră, ganglioni limfatici umflați, creșterea anumitor globule albe (eozinofilie) și inflamația organelor interne (ficat, plămâni, inimă, rinichi și colon) (reacție medicamentoasă sau erupție cu eozinofilie și simptome sistemice (sindromul DRESS))

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală. Acest lucru se aplică și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin Centrul Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse Lareb, site-ul www.lareb.nl. Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ACEST MEDICAMENT?

- A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
- Nu utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este indicată pe ambalaj după EXP. Este indicată o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.
- A se păstra la temperaturi sub 30°C.

Nu aruncați medicamentele pe calea apei sau a deșeurilor menajere. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Acestea vor fi distruse în mod responsabil și nu vor ajunge în mediu.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce substanțe conține acest medicament?

- Substanța activă din acest medicament este fluconazol.
- Fiecare capsulă tare conține 50 mg, 100 mg, 150 mg sau 200 mg fluconazol.
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt:

Conținutul capsulelor: lactoză monohidrat, amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu și laurilsulfat de sodiu (vezi secțiunea 2, Diflucan conține lactoză (zahăr din lapte) și sodiu (sare)).

Compoziția învelișului capsulelor:

Capsule tari 50 mg: gelatină (E441), dioxid de titan (E171) și Albastru Patent V (E131)

Capsule tari 100 mg: gelatină (E441), dioxid de titan (E171), eritrozină (E127) și Patentblauw V (E131)

Capsule tari 150 mg: gelatină (E441), dioxid de titan (E171) și Patentblauw V (E131)

Capsule tari 200 mg: gelatină (E441), dioxid de titan (E171), eritrozină (E127) și indigocarmine (E132)

Cerneală de imprimare: șelac (glazură), oxid de fier negru (E172), N-butilalcool, alcool deshidratat, apă purificată, propilenglicol (E1520), alcool metilat industrial, izopropanol, soluție concentrată de amoniac, hidroxid de potasiu (E525).

Cum arată Diflucan și ce conține un ambalaj?

- Capsulele tari Diflucan de 50 mg au jumătatea inferioară albă și jumătatea superioară albastru turcoaz. Poartă inscripția „Pfizer” și codul „FLU-50” cu cerneală neagră.
- Capsulele tari Diflucan de 100 mg au jumătatea inferioară albă și jumătatea superioară albastră. Poartă inscripția „Pfizer” și codul „FLU-100” cu cerneală neagră.
- Capsulele tari Diflucan de 150 mg au jumătatea inferioară albastru turcoaz și jumătatea superioară albastru turcoaz. Poartă inscripția „Pfizer” și codul „FLU-150” cu cerneală neagră.
- Capsulele tari Diflucan de 200 mg au jumătatea inferioară albă și jumătatea superioară mov. Poartă inscripția „Pfizer” și codul „FLU-200” cu cerneală neagră.

Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg și 200 mg este disponibil în ambalaje de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 100 sau 500 capsule tari. Nu toate mărimile de ambalaj menționate sunt comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producător

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d IJssel

Producător

Fareva Amboise

Zona Industrială

29 Route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Franța

Diflucan 50 mg, capsule, tare este înregistrat în registru sub RVG 13038.

Diflucan 100 mg, capsule, tare este înregistrat în registru sub RVG 14767.

Diflucan 150 mg, capsule, tare este înregistrat în registru sub RVG 13039. Diflucan 200 mg, capsule, tare este înregistrat în registru sub RVG 14768.

Pentru întrebări despre acest medicament, sunați la Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale Spațiului Economic European și în Regatul Unit (Irlanda de Nord) sub următoarele denumiri:

Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca,
Finlanda, Irlanda, Italia, Luxemburg,
Norvegia, Portugalia, Regatul Unit
(Irlanda de Nord), Islanda, Suedia
Cipru, Grecia
Germania

Diflucan

Fungustatin

Diflucan 50mg

	Diflucan 100mg
	Fungata
Estonia	Diflucan 200mg
Franța	Diflucan 150mg
	Triflucan 50 mg capsulă
	Triflucan 100 mg, capsulă
	Triflucan 200 mg, capsulă
	Fluconazole Pfizer 150mg, capsulă
Ungaria	Diflucan 50 mg capsulă tare
	Diflucan 100 mg capsulă tare
	Diflucan 150 mg capsulă tare
	Diflucan 200 mg capsulă tare
Letonia	Diflucan 150 mg capsule tari
Lituania	Diflucan 50 mg tare capsule
	Diflucan 150 mg capsule tari
Olanda	Diflucan 50 mg, capsulă, tare
	Diflucan 100 mg, capsule, tare
	Diflucan 150 mg, capsule, tare
	Diflucan 200 mg, capsule, tare
Austria	Diflucan 50 mg capsule
	Diflucan 100 mg capsule
	Diflucan 150 mg capsule
	Diflucan 200 mg capsule
România	Diflucan 50 mg capsulă
	Diflucan 150 mg capsulă
Slovenia	Diflucan 50 mg capsule tari
	Diflucan 100 mg capsule tari
	Diflucan 150 mg capsule tari
Slovacia	Diflucan 50mg
	Diflucan 100mg
	Diflucan 150mg
Spania	Diflucan 50 mg capsule tari
	Diflucan 100 mg capsule tari
	Diflucan 150 mg capsule tari
	Diflucan 200 mg capsule tari

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în februarie 2024.

Mai multe informații despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (www.cbg-meb.nl).