

## BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Diflucan 50 mg, kapsel, hård  
Diflucan 100 mg, kapsel, hård  
Diflucan 150 mg, kapsel, hård  
Diflucan 200 mg, kapsel, hård

flukonazol

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kanske behöver läsa den igen.
- Har du fler frågor? Kontakta då din läkare, apotekare eller sjuksköterska.
- Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det är förskrivet endast till dig. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du biverkningar som nämns i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte nämns i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare, apotekare eller sjuksköterska.

Innehåll i denna bipacksedel

1. Vad är Diflucan och vad används det för?
2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

### 1. VAD ÄR DIFLUCAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Diflucan tillhör en grupp läkemedel som kallas 'antimykotika'. Den aktiva substansen är flukonazol.

Diflucan används för att behandla svampinfektioner och kan också användas för att förhindra att du får en Candida-infektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp som kallas Candida.

Vuxna

- Din läkare kan ge dig detta läkemedel för att behandla följande typer av svampinfektioner:
- kryptokockmeningit – en svampinfektion i hjärnan
- koccidioidomykos – en sjukdom i lungorna och luftvägarna
- infektioner orsakade av Candida som finns i blodomloppet, organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna
- slemhinne Candidiasis (munsvamp) – infektion i munnens slemhinna, hals och inflammationer i slemhinnan hos protesbärare
- genital candidiasis – infektion i vagina eller penis
- hudinfektioner – t.ex. fotsvamp, ringorm, hudsvamp på ben/lår, nagelinfektion.

Du kan också få Diflucan för att:

- förhindra att kryptokockmeningit återkommer

- förhindra att slemhinne Candidiasis (munsvamp) återkommer
- minska återkomsten av vaginala svampinfektioner
- förhindra att du får en Candida-infektion (om ditt immunsystem är försvagat och inte fungerar bra).

Barn och ungdomar upp till 18 år

Ditt barns läkare kan ge honom/henne detta läkemedel för att behandla följande typer av svampinfektioner:

- slemhinne Candidiasis (munsvamp) – infektion i munnens slemhinna, hals
- infektioner orsakade av Candida som finns i blodomloppet, organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna
- kryptokockmeningit – en svampinfektion i hjärnan.

Ditt barn kan också få Diflucan för att:

- förhindra att han/hon får en Candida-infektion (om hans/hennes immunsystem är försvagat och inte fungerar bra)
- förhindra att kryptokockmeningit återkommer.

## 2. NÄR FÅR DU INTE ANVÄNDA DETTA LÄKEMEDELELLER MÅSTE DU VARA EXTRA FÖRSIKTIG MED DET?

När får du inte använda detta läkemedel?

- Du eller ditt barn är allergisk mot andra läkemedel som du eller ditt barn har tagit för att behandla svampinfektioner, eller mot någon av ingredienserna i detta läkemedel. Dessa ingredienser finns i avsnitt 6. Symtomen kan inkludera: klåda, rodnad i huden eller andningssvårigheter.
- Du eller ditt barn tar astemizol, terfenadin (antihistaminer mot allergier).
- Du eller ditt barn tar cisaprid (används vid magbesvär).
- Du eller ditt barn tar pimozid (används vid behandling av mentala störningar).
- Du eller ditt barn tar kinidin (används vid oregelbunden hjärtrytm).
- Du eller ditt barn tar erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner).

När måste du vara extra försiktig med detta läkemedel?

Kontakta din läkare eller apotekare innan du använder detta läkemedel:

- om du eller ditt barn har lever- eller njurproblem
- om du eller ditt barn har hjärtsjukdomar, inklusive hjärtrytmrubbningar
- om du eller ditt barn har onormala kaliumnivåer, kalciumnivåer eller magnesiumnivåer i ditt eller hans/hennes blod
- om du eller ditt barn utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad i huden eller andningsproblem)
- om du eller ditt barn utvecklar symptom på 'binjureinsufficiens', där binjurarna inte producerar tillräckliga mängder av vissa steroidhormoner som kortisol (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, aptitlöshet, viktminskning, buksmärta)
- om du eller ditt barn någonsin har haft ett allvarligt hudutslag eller hudavflagning, blåsor och/eller sår i munnen efter att ha tagit flukonazol.

Allvarliga hudreaktioner, inklusive läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symptom (DRESS), har rapporterats vid behandling med flukonazol. Sluta ta Diflucan och

sök omedelbart medicinsk hjälp om du märker något av de symtom som är relaterade till dessa allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Kontakta din läkare eller apotekare om svampinfektionen inte förbättras, eftersom en annan behandling mot svamp kan behövas.

Använder du andra läkemedel?

Använder du eller ditt barn andra läkemedel utöver Diflucan, eller har du eller han/hon nyligen gjort det eller finns det möjlighet att du eller ditt barn kommer att använda andra läkemedel i den närmaste framtiden? Berätta det då för din läkare, läkaren som behandlar ditt barn eller din apotekare.

Informera din läkare eller ditt barns läkare omedelbart om du eller ditt barn tar något av följande läkemedel: astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergier), cisaprid (används vid magproblem), pimozid (används vid behandling av mentala störningar), kinidin (används för behandling av hjärtrytmrubbningar) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner), eftersom dessa läkemedel inte får tas tillsammans med Diflucan (se avsnitt: 'När ska du inte använda detta läkemedel?').

För vissa läkemedel kan en interaktion med Diflucan uppstå. Informera din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn om du eller ditt barn tar något av följande läkemedel. En dosjustering kan behövas eller kontroll för att säkerställa att läkemedlen fortfarande har önskad effekt:

- rifampicin eller rifabutin (antibiotika mot infektioner)
- abrocitinib (används vid behandling av atopisk dermatit, även kallad atopiskt eksem eller konstitutionellt eksem)
- alfentanil, fentanyl (används som anestetikum)
- amitriptylin, nortriptylin (används som antidepressivum)
- amfotericin B, vorikonazol (antimykotikum)
- blodförtunnande medel för att förhindra blodproppar (warfarin eller liknande läkemedel)
- bensodiazepiner (midazolam, triazolam eller liknande läkemedel) används för att hjälpa dig sova eller mot ångest
- karbamazepin, fenytoin (används vid anfall)
- nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin och losartan (vid hypertoni: högt blodtryck)
- olaparib (används vid behandling av äggstockscancer)
- ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (för att förhindra avstötning vid transplantationer)
- cyklofosamid, vinka-alkaloider (vinkristin, vinblastin eller liknande läkemedel) används vid behandling av cancer
- halofantrin (används vid behandling av malaria)
- statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin eller liknande läkemedel) används för att sänka höga kolesterolnivåer
- metadon (används vid smärtlindring)
- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel [NSAID])
- medel för att förhindra graviditet som tas oralt (orala preventivmedel)
- prednison (steroid)

- zidovudin, även kallad AZT; saquinavir (används hos hiv-infekterade patienter)
- läkemedel för diabetes, såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid
- teofyllin (används vid behandling av astma)
- tofacitinib (används vid behandling av reumatoid artrit)
- tolvaptan används vid behandling av hyponatremi (sänkta natriumnivåer i ditt blod) eller för att bromsa försämringen av njurfunktionen
- vitamin A (kosttillskott)
- ivakaftor (ensamt eller i kombination med läkemedel som används vid behandling av cystisk fibros)
- amiodaron (används vid hjärtrytmrubbningar (arytmi))
- hydroklortiazid (medel för att underlätta urinering (diuretikum))
- ibrutinib (används vid behandling av blodcancer)
- lurasidon (används vid behandling av schizofreni)

Vad ska du tänka på med mat?

Du kan ta ditt läkemedel med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Är du gravid, tror du att du är gravid, vill du bli gravid eller ammar du? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du planerar att bli gravid rekommenderas det att vänta en vecka efter en engångsdos fluconazol innan du blir gravid.

Har du fått en längre behandlingskur med fluconazol? Då är det nödvändigt att använda lämplig preventivmedel under behandlingen och sedan under en vecka efter den sista dosen. Kontakta din läkare om detta.

Är du gravid, tror du att du är gravid eller vill du bli gravid? Då får du inte använda detta läkemedel, förutom om din läkare har sagt att du ska använda det. Om du blir gravid medan du tar detta läkemedel eller inom en vecka efter den sista dosen, kontakta din läkare.

Om du använder fluconazol under de första tre eller andra månaderna av graviditeten kan du ha en ökad risk för missfall. Om du tar fluconazol under de första tre månaderna av graviditeten kan du ha en ökad risk att ditt barn föds med hjärt-, ben- och/eller muskelavvikelse.

Det finns rapporter om barn som fötts med medfödda avvikelser i skallen, öronen och benen i lår och armbåge. Detta var hos kvinnor som fått höga doser fluconazol (400 till 800 mg per dag) i tre månader eller längre för koccidioidomykos. Sambandet mellan fluconazol och dessa fall är inte klart.

Du kan fortsätta att amma efter att ha tagit en engångsdos på 150 mg Diflucan. Du bör inte amma om du använder flera doser Diflucan.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid körning av fordon eller användning av maskiner bör du vara medveten om att yrsel eller anfall kan uppstå.

Diflucan innehåller laktos (mjölksocker) och natrium (salt)

Detta läkemedel innehåller en liten mängd laktos (mjölksocker). Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Diflucan hårda kapslar innehåller också mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, vilket innebär att det i huvudsak är 'natriumfritt'.

### 3. HUR ANVÄNDER DU DETTA LÄKEMEDEL?

Använd alltid detta läkemedel exakt som din läkare har sagt. Är du osäker på rätt användning? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Det är bäst att ta dina kapslar vid samma tidpunkt varje dag.

De rekommenderade doserna för detta läkemedel vid olika infektioner anges nedan:

#### Användning hos vuxna

Tillstånd	Dosering
För behandling av kryptokockmeningit	400 mg första dagen och därefter en gång dagligen 200 till 400 mg under 6 till 8 veckor, eller längre vid behov. Dosen kan ibland ökas till 800 mg
För att förhindra att kryptokockmeningit återkommer	en gång dagligen 200 mg tills du blir sagd att du ska sluta
För behandling av koccidiodomykos	en gång dagligen 200 till 400 mg under 11 månader till maximalt 24 månader eller längre vid behov. Dosen kan ibland ökas till 800 mg
För behandling av inre schimmelsinfektioner som orsakas av Candida	800 mg första dagen och därefter en gång dagligen 400 mg tills du blir sagd att du ska sluta
För behandling av slemhinneinfektioner i munnend, hals och inflammationer i slemhinna hos protesbärare	200 mg till 400 mg första dagen, därefter en gång dagligen 100 mg upp till 200 mg tills du får besked att du ska sluta
För behandling av slemhinne candidiasis (muntorsk) – dosen beror på infektionsställe	en gång dagligen 50 till 400 mg under 7 till 30 dagar tills du får besked att du ska sluta
För att förhindra att slemhinneinfektioner i munnen eller halsen återkommer	en gång dagligen 100 till 200 mg, eller 3 gånger per vecka 200 mg, så länge du löper risk för infektion
För behandling av genital candidiasis	150 mg som engångsdos
För att förhindra återkomst av vaginal för att minska svampinfektioner	150 mg var tredje dag med en totalt 3 doser (dag 1, 4 och 7) och sedan en gång i veckan under 6 månader så länge du löper risk för infektion
För behandling av svampinfektioner	beroende på platsen för

på huden och naglarna infektion en gång dagligen 50 mg, en gång i veckan 150 mg, en gång i veckan 300 till 400 mg under 1 till 4 veckor (upp till 6 veckor vid fotsvamp; vid nagelinfektion varar behandlingen tills den infekterade nageln har ersatts)

För att förhindra att du får en Candida-infektion (om ditt immunsystem är försvagat och inte fungerar ordentligt) en gång dagligen 200 till 400 mg så länge du löper risk för infektion

Användning hos ungdomar i åldern 12 till 18 år  
Följ den dosering som din läkare har ordinerat (dosering för vuxna eller dosering för barn).

Användning hos barn upp till och med 11 års ålder Den maximala dosen för barn är 400 mg per dag.

Dosen kommer att fastställas baserat på barnets vikt i kilogram.

Sjukdom	Daglig dos
Slemhinne Candidiasis (munsvamp) och halsinfektioner som orsakas av Candida – dos och varaktighet beror på allvarlighetsgrad och plats för infektion	en gång dagligen 3 mg/kg kroppsvikt (på den första dagen kan 6 mg/kg kroppsvikt ges)
Cryptokockmeningit eller inre svampinfektioner som orsakas av Candida	en gång dagligen 6 mg till 12 mg/kg kroppsvikt
För att förhindra att cryptokockmeningit återkommer	en gång dagligen 6 mg/kg kroppsvikt
För att förhindra att barn får en Candida-infektion få (om deras immunsystem inte fungerar bra)	en gång dagligen 3 mg till 12 mg/kg kroppsvikt

Användning hos barn från 0 till 4 veckor gamla Användning hos barn från 3 till 4 veckor gamla:

Samma dos som ovan, men administreras en gång varannan dag. Den maximala dosen är 12 mg/kg kroppsvikt per 48 timmar.

Användning hos barn yngre än 2 veckor:

Samma dos som ovan, men administreras en gång var tredje dag. Den maximala dosen är 12 mg/kg kroppsvikt per 72 timmar.

Användning hos äldre

Du bör få den vanliga vuxendosen, om du inte har njurproblem.

Användning hos patienter med njurproblem

Din läkare kan justera din dos beroende på din njurfunktion.

Har du använt för mycket av detta läkemedel?

Om du tar för många kapslar samtidigt kan du bli sjuk. Kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagningen på närmaste sjukhus. Symtomen på en möjlig överdos kan vara: höra, se, känna och tänka saker som inte finns (hallucinationer och paranoida beteenden). Behandling av symtomen som uppstår (med stödjande åtgärder och vid behov en magsköljning) kan vara tillräcklig.

Har du glömt att använda detta läkemedel?

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det dock nästan är dags för din nästa dos, ta inte den dos du glömde.

Har du fler frågor om användningen av detta läkemedel? Kontakta då din läkare eller apotekare.

#### 4. MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel ha biverkningar, även om inte alla får dem.

Sluta ta Diflucan och sök omedelbart medicinsk hjälp om du märker något av följande symtom:

- hudutslag över en stor del av kroppen, hög kroppstemperatur och förstörade lymfkörtlar (DRESS-syndrom eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner sällan förekommer. Om du får biverkningar, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Berätta omedelbart för din läkare om du får något av följande symtom:

- plötslig väsande andning, andningssvårigheter eller tryck över bröstet
- svullna ögonlock, ansikte eller läppar
- klåda över hela kroppen, rodnad i huden eller kliande röda fläckar
- hudutslag
- allvarliga hudreaktioner såsom hudutslag med blåsbildning (detta kan förekomma i munnen och på tungan)

Diflucan kan påverka din lever. Tecken på leverproblem inkluderar:

- trötthet
- aptitlöshet
- kräkningar
- gulnande av din hud eller ögonvitor (gulsot)

Om något av dessa symtom uppträder, sluta ta Diflucan och berätta omedelbart för din läkare.

Andra biverkningar:

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare) är:

- huvudvärk

- magbesvär, diarré, illamående, kräkningar
- förhöjda värden i blodprover vid leverfunktionstest
- hudutslag

Ibland förekommande biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är:

- minskad mängd röda blodkroppar, vilket kan leda till blek hud och svaghet eller andfåddhet
- minskad aptit
- sömnlöshet, känna sig sömnig
- anfall, yrsel, svindel, stickningar, pirningar eller domningar, smakförändringar
- förstoppning, svår matsmältning, gasbildning, torr mun
- muskelvärk
- leverskada och gul missfärgning av huden eller ögonen (gulsot)
- utslag, blåsbildning (nässelutslag), klåda, ökad svettning
- trötthet, allmän sjukdomskänsla, feber

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är:

- för lågt antal vita blodkroppar som hjälper till att skydda mot infektioner och för lågt antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar
- röd eller lila missfärgning av huden, som kan orsakas av för lågt antal blodplättar, andra förändringar av blodceller
- förändringar i blodkemin (höga kolesterol- eller fettvärden i blodet)
- för lite kalium i blodet
- darrningar
- onormalt elektrokardiogram (EKG), förändrad hjärtfrekvens eller annan hjärtrytm
- leversvikt
- allergiska reaktioner (ibland allvarliga), inklusive utbrett hudutslag med blåsbildning, hudavflagning, allvarliga hudreaktioner, svullna läppar eller ansikte
- håravfall

Biverkningar vars frekvens inte är känd, men som kan uppstå (frekvensen kan inte bestämmas med tillgängliga data):

- överkänslighetsreaktion med hudutslag, feber, svullna körtlar, ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili) och inflammation i inre organ (lever, lungor, hjärta, njurar och tjocktarm) (läkemedelsreaktion eller utslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS-syndrom))

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta din läkare, apotekare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det svenska Läkemedelsverket, webbplats [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

## 5. HUR FÖRVARAR DU DETTA LÄKEMEDEL?

- Förvara utom syn- och räckhåll för barn.
- Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet. Det finns på förpackningen efter EXP. Det står en månad och ett år. Den sista dagen i den månaden är utgångsdatumet.

- Förvara under 30°C.

Spola inte ner läkemedel i avloppet eller toaletten och kasta dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel som du inte längre använder. De förstörs då på ett ansvarsfullt sätt och hamnar inte i miljön.

## 6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIG INFORMATION

Vilka ämnen finns i detta läkemedel?

- Den aktiva substansen i detta läkemedel är flukonazol.
- Varje hård kapsel innehåller 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol.
- De andra ämnena i detta läkemedel är:

Innehåll i kapslarna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat och natriumlaurylsulfat (se avsnitt 2, Diflucan innehåller laktos (mjölksocker) och natrium (salt)).

Sammansättning av kapslarnas hölje:

Hårda kapslar 50 mg: gelatin (E441), titandioxid (E171) och Patentblått V (E131)

Hårda kapslar 100 mg: gelatin (E441), titandioxid (E171), erytrosin (E127) och Patentblått V (E131)

Hårda kapslar 150 mg: gelatin (E441), titandioxid (E171) och Patentblått V (E131)

Hårda kapslar 200 mg: gelatin (E441), titandioxid (E171), erytrosin (E127) och indigokarmin (E132)

Tryckfärg: schellack (glasyr), svart järnoxid (E172), N-butylalkohol, dehydrerad alkohol, renat vatten, propylenglykol (E1520), industriellt metylalkohol, isopropylalkohol, stark ammoniaklösning, kaliumhydroxid (E525).

Hur ser Diflucan ut och hur mycket finns det i en förpackning?

- Diflucan hårda kapslar på 50 mg har en vit nedre halva med en turkosblå övre halva. De har trycket "Pfizer" och koden "FLU-50" i svart bläck.
- Diflucan hårda kapslar på 100 mg har en vit nedre halva och en blå övre halva. De har trycket "Pfizer" och koden "FLU-100" i svart bläck.
- Diflucan hårda kapslar på 150 mg har en turkosblå nedre halva och en turkosblå övre halva. De har trycket "Pfizer" och koden "FLU-150" i svart bläck.
- Diflucan hårda kapslar på 200 mg har en vit nedre halva och en lila övre halva. De har trycket "Pfizer" och koden "FLU-200" i svart bläck.

Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg finns tillgängliga i förpackningar om 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 100 eller 500 hårda kapslar. Inte alla nämnda förpackningsstorlekar marknadsförs.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d IJssel

Tillverkare

Fareva Amboise

Zone Industrielle  
29 Route des Industries  
37530 Pocé-sur-Cisse  
Frankrike

Diflucan 50 mg, kapsel, hård är registrerad under RVG 13038.  
Diflucan 100 mg, kapsel, hård är registrerad under RVG 14767.  
Diflucan 150 mg, kapsel, hård är registrerad under RVG 13039. Diflucan 200 mg, kapsel, hård är registrerad under RVG 14768.

För frågor om detta läkemedel, ring Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

Detta läkemedel är registrerat i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Storbritannien (Nordirland) under följande namn:

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Portugal, Storbritannien (Nordirland), Island, Sverige, Cypern, Grekland, Tyskland	Diflucan
Estland, Frankrike	Fungustatin Diflucan 50mg Diflucan 100mg Fungata Diflucan 200mg Diflucan 150mg Triflucan 50 mg kapsel Triflucan 100 mg, kapsel Triflucan 200 mg, kapsel Fluconazole Pfizer 150mg, kapsel
Ungern	Diflucan 50 mg hård kapsel Diflucan 100 mg hård kapsel Diflucan 150 mg hård kapsel Diflucan 200 mg hård kapsel
Lettland, Litauen	Diflucan 150 mg hårda kapslar Diflucan 50 mg hård kapslar Diflucan 150 mg hårda kapslar
Nederländerna	Diflucan 50 mg, kapsel, hård Diflucan 100 mg, kapsel, hård Diflucan 150 mg, kapsel, hård Diflucan 200 mg, kapsel, hård
Österrike	Diflucan 50 mg kapslar Diflucan 100 mg kapslar Diflucan 150 mg kapslar Diflucan 200 mg kapslar
Rumänien	Diflucan 50 mg kapsel Diflucan 150 mg kapsel
Slovenien	Diflucan 50 mg hårda kapslar Diflucan 100 mg hårda kapslar Diflucan 150 mg hårda kapslar
Slovakien	Diflucan 50 mg

Spanien

Diflucan 100 mg  
Diflucan 150 mg  
Diflucan 50 mg hårda kapslar  
Diflucan 100 mg hårda kapslar  
Diflucan 150 mg hårda kapslar  
Diflucan 200 mg hårda kapslar

Denna bipacksedel godkändes senast i februari 2024.

Mer information om detta läkemedel finns tillgänglig på webbplatsen för Läkemedelsverket ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)).

Transtoyou