

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Dovobet 50 Mikrogramm/0,5 mg/g Gel

Calcipotriol/Betamethason

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.
- Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an andere weiter, da es nur Ihnen verschrieben wurde. Es kann anderen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Bekommen Sie eine der Nebenwirkungen, die in Abschnitt 4 aufgeführt sind? Oder bekommen Sie eine Nebenwirkung, die nicht in dieser Packungsbeilage steht? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt dieser Packungsbeilage .

1. Was ist Dovobet und wofür wird dieses Mittel angewendet?
2. Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht anwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig sein?
3. Wie verwenden Sie dieses Mittel?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren Sie dieses Mittel auf?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST DOVOBET UND WOFÜR WIRD DIESES MITTEL ANGEWENDET?

Dieses Mittel wird zur lokalen Behandlung von Psoriasis auf der Kopfhaut bei Erwachsenen und zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Plaque-Psoriasis (Psoriasis vulgaris) an anderen Stellen des Körpers bei Erwachsenen angewendet. Psoriasis wird durch eine zu schnelle Produktion Ihrer Hautzellen verursacht. Dies führt zu Rötung, Schuppung und Verdickung der Haut.

Dieses Mittel enthält Calcipotriol und Betamethason. Calcipotriol hilft, die Wachstumsrate der Hautzellen zu normalisieren, und Betamethason wirkt entzündungshemmend.

2. WANN DÜRFEN SIE DIESES MITTEL NICHT ANWENDEN ODER MÜSSEN SIE BESONDERS VORSICHTIG SEIN?

Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden?

- Sie sind allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe dieses Arzneimittels. Diese Stoffe finden Sie in Abschnitt 6.
- als Sie Probleme mit den Kalziumspiegeln in Ihrem Körper haben (konsultieren Sie Ihren Arzt)
- als Sie bestimmte Formen von Psoriasis haben, wie Psoriasis erythrodermie, exfoliative Psoriasis und Psoriasis pustulosa (konsultieren Sie Ihren Arzt).

Dieses Mittel enthält ein stark wirksames Kortikosteroid (Nebennierenrindenhormon), verwenden Sie es daher NICHT auf Haut, die betroffen ist von:

- Hautinfektionen verursacht durch Viren (zum Beispiel Herpes oder Windpocken)
- Hautinfektionen verursacht durch Pilze (zum Beispiel Fußpilz oder Ringelflechte)
- Hautinfektionen verursacht durch Bakterien
- Hautinfektionen verursacht durch Parasiten (zum Beispiel Krätze)
- Tuberkulose (TB)
- peri-oral dermatitis (roter Ausschlag um den Mund)
- dünne Haut, empfindliche Venen, Hautstreifen
- Ichthyose (trockene Haut mit Fischeschuppen)
- Akne (Akne)
- Rosacea (starkes Erröten oder Rötung der Gesichtshaut)
- Geschwüre oder Hautwunden.

Wann sollten Sie bei der Anwendung dieses Mittels besonders vorsichtig sein?

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Krankenschwester oder Ihren Apotheker, bevor Sie dieses Mittel anwenden und während der Anwendung, wenn:

- Sie andere Arzneimittel verwenden, die Nebennierenrindenhormone (Kortikosteroide) enthalten, da Sie Nebenwirkungen davon bekommen können
- Sie dieses Arzneimittel längere Zeit verwendet haben und planen, damit aufzuhören (da das Risiko besteht, dass sich die Psoriasis verschlimmert oder zurückkehrt, wenn die Anwendung von Steroiden plötzlich gestoppt wird)
- Sie Diabetes mellitus haben (Zuckerkrankheit), da Ihr Blutzucker-/Glukosespiegel durch das Steroide
- eine Hautinfektion auftritt, da es notwendig sein kann, die Behandlung zu stoppen
- Sie eine bestimmte Form von Psoriasis haben, die Psoriasis guttata genannt wird
- Sie unter verschwommenem Sehen oder anderen Sehproblemen leiden.

Besondere Warnhinweise

- Vermeiden Sie die Anwendung auf mehr als 30% Ihres Körpers und verwenden Sie nicht mehr als 15 Gramm pro Tag
- Vermeiden Sie die Anwendung unter einer Badekappe, Bandagen oder Verbänden, da dies die Absorption des Steroids fördert
- Vermeiden Sie die Anwendung auf großen betroffenen Stellen, auf Schleimhäuten oder in Hautfalten (Leisten, Achselhöhlen, unter den Brüsten), da dies die Absorption des Steroids fördert.
- Vermeiden Sie die Anwendung im Gesicht oder an den Genitalien (Geschlechtsorganen), da diese sehr empfindlich auf Steroide reagieren
- Vermeiden Sie übermäßige Sonnenexposition, übermäßige Nutzung von Solarien oder andere Formen der Lichttherapie.

Kinder

Dieses Mittel wird nicht zur Anwendung bei Kindern unter 18 Jahren empfohlen.

Nehmen Sie noch andere Medikamente ein?

Nehmen Sie neben Dovobet noch andere Arzneimittel, haben Sie das vor kurzem getan oder besteht die Möglichkeit, dass Sie in naher Zukunft andere Arzneimittel verwenden werden? Informieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker.

Schwangerschaft und Stillzeit

Sind Sie schwanger, denken Sie schwanger zu sein, möchten Sie schwanger werden oder stillen Sie? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel verwenden. Wenn Ihr Arzt zugestimmt hat, dass Sie stillen, seien Sie vorsichtig und tragen Sie dieses Mittel nicht auf die Brüste auf.

Fahrtüchtigkeit und Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel hat keinen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.

Dovobet enthält Butylhydroxytoluol (E321)

Dovobet enthält Butylhydroxytoluol (E321). Dies kann lokale Hautreaktionen verursachen (z.B. Kontaktdermatitis) oder Reizungen der Augen und Schleimhäute.

3. WIE WIRD DIESES MITTEL ANGEWENDET?

Wenden Sie dieses Mittel immer genau so an, wie Ihr Arzt es Ihnen gesagt hat. Sind Sie sich über die richtige Anwendung unsicher? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wo dieses Mittel angewendet werden soll: zur Anwendung auf der Haut (kutan).

Anweisungen für korrekte Anwendung

- Nur auf den Psoriasisstellen anwenden und nicht auf anderen Hautbereichen, die nicht von Psoriasis betroffen sind.
- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch und entfernen Sie die Kappe.
- Drücken Sie etwas Gel auf einen sauberen Finger oder direkt auf die Psoriasisstelle.
- Tragen Sie dieses Mittel auf die betroffene Haut mit den Fingerspitzen auf und reiben Sie es sanft ein, bis die Psoriasisstelle vollständig mit einer dünnen Schicht Gel bedeckt ist.
- Den behandelten Bereich nicht verbinden, nicht straff abdecken oder umwickeln.
- Waschen Sie nach dem Auftragen dieses Mittels sorgfältig Ihre Hände. Dadurch wird vermieden, dass das Gel versehentlich auf andere Körperteile (insbesondere Gesicht, Mund und Augen) gelangt.
- Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wenn etwas Gel versehentlich auf die unbetreffene Haut neben den Psoriasisstellen gelangt, aber wischen Sie es ab, wenn das Gel zu weit verteilt wird.
- Um eine optimale Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, nicht sofort nach dem Auftragen dieses Mittels zu baden oder zu duschen.
- Vermeiden Sie nach dem Auftragen des Gels den Kontakt mit Stoffen, die empfindlich auf Fettflecken reagieren (zum Beispiel Seide).

Wenn Sie Psoriasis auf der Kopfhaut haben

- Bevor Sie dieses Mittel auf die Kopfhaut auftragen, sollten Sie zuerst Ihr Haar kämmen, um eventuelle lose Schuppen zu entfernen. Neigen Sie Ihren Kopf, um sicher zu sein, dass dieses Mittel nicht in Ihr Gesicht läuft. Es ist einfacher, wenn Sie vor dem Auftragen dieses Mittels einen Scheitel in Ihr Haar ziehen. Tragen Sie dieses Mittel mit Ihren Fingerspitzen auf die betroffene Stelle auf und reiben Sie das Gel sanft ein.

Es ist nicht notwendig, vor dem Auftragen dieses Mittels die Haare zu waschen.

1. Schütteln Sie Fläschchen für Gebrauch
2. Tragen Sie einen Tropfen dieses Mittels auf Ihre Fingerspitze auf
3. Tragen Sie es auf die Bereiche Ihrer Kopfhaut auf, wo Sie die erhabene Psoriasisstelle spüren, und reiben Sie das Gel in die Haut ein. Abhängig von der Größe der betroffenen Fläche sind 1-4 g (etwa ein Teelöffel) normalerweise ausreichend.

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, das Haar nicht sofort nach dem Auftragen dieses Mittels zu waschen. Lassen Sie dieses Mittel tagsüber oder über Nacht einwirken. Wenn Sie das Haar nach dem Auftragen des Gels waschen, können Sie die folgenden Hinweise beachten:

4. Tragen Sie ein mildes Shampoo auf das trockene Haar auf, insbesondere auf die Stellen, an denen das Gel aufgetragen wurde.
5. Lassen Sie das Shampoo ein paar Minuten auf der Kopfhaut einwirken, bevor Sie es auswaschen.
6. Waschen Sie Ihr Haar wie gewohnt.

Bei Bedarf können Sie die Schritte 4-6 einmal oder zweimal wiederholen.

Dauer der Behandlung

- Verwenden Sie das Gel einmal täglich. Es kann angenehmer sein, das Gel abends zu verwenden.
- Die übliche anfängliche Behandlungsdauer beträgt 4 Wochen für die Behandlung der Kopfhaut und 8 Wochen für die Behandlung von Psoriasis an anderen Stellen des Körpers.
- Ihr Arzt kann entscheiden, die Behandlungsdauer zu ändern.
- Ihr Arzt kann sich für eine Anschlussbehandlung entscheiden.
- Verwenden Sie nicht mehr als 15 g pro Tag.

Indien wenn Sie auch andere calcipotriolhaltige Produkte verwenden, darf die Gesamtmenge der calcipotriolhaltigen Produkte 15 Gramm pro Tag nicht überschreiten. Der behandelte Bereich darf nicht größer als 30 % der gesamten Körperoberfläche sein.

Was kann ich erwarten, wenn ich dieses Mittel verwende?

Die meisten Patienten sehen nach 2 Wochen deutliche Ergebnisse, auch wenn die Psoriasis zu diesem Zeitpunkt noch nicht verschwunden ist.

Haben Sie zu viel von diesem Mittel verwendet?

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie mehr als 15 Gramm pro Tag verwendet haben. Übermäßiger Gebrauch dieses Mittels kann auch Probleme mit dem Kalzium in Ihrem Blut verursachen, was sich normalerweise normalisiert, wenn die Behandlung gestoppt wird. Es kann notwendig sein, dass Ihr Arzt eine Blutuntersuchung durchführt, um festzustellen, ob die Verwendung von zu viel Gel keine Probleme mit dem Kalzium in Ihrem Blut verursacht hat.

Übermäßiger, langanhaltender Gebrauch kann auch dazu führen, dass Ihre Nebennieren nicht mehr richtig funktionieren (die Nebennieren befinden sich in der Nähe der Nieren und produzieren Hormone).

Haben Sie vergessen, dieses Mittel zu verwenden?

Nehmen Sie keine doppelte Dosis, um eine vergessene Dosis nachzuholen.

Wenn Sie die Anwendung dieses Mittels beenden

Die Anwendung dieses Mittels muss auf Anweisung Ihres Arztes beendet werden. Es kann notwendig sein, dass Sie die Anwendung dieses Arzneimittels schrittweise beenden, insbesondere wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwendet haben.

Haben Sie noch weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Wie jedes Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, auch wenn nicht jeder davon betroffen ist.

Schwere Nebenwirkungen

Nehmen Sie sofort oder so schnell wie möglich Kontakt mit Ihrem Arzt oder Ihrer Pflegekraft auf wenn eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt. Es kann notwendig sein, die Behandlung zu beenden. Die folgenden schweren Nebenwirkungen wurden für dieses Mittel berichtet: Gelegentlich (treten bei weniger als 1 von 100 Anwendern auf):

- Die Verschlimmerung der Psoriasis. Informieren Sie sofort Ihren Arzt wenn die Psoriasis sich verschlimmert.

Einige schwere Nebenwirkungen werden durch Betamethason (ein stark wirksames Steroid), und einer der Bestandteile dieses Mittels. Sie sollten Ihren Arzt so schnell wie möglich informieren wenn eine dieser schwerwiegenden Nebenwirkungen auftritt. Diese Nebenwirkungen treten hauptsächlich nach längerem Gebrauch, bei Anwendung in Hautfalten (Leisten, Achselhöhlen, unter den Brüsten), bei Anwendung unter einem Okklusivverband oder bei Anwendung auf großen Hautflächen auf.

Es betrifft die folgenden Nebenwirkungen:

- Die Nebennieren funktionieren nicht richtig. Symptome sind Müdigkeit, Depression und Angst.
- Grauer Star (Symptome sind verschwommenes Sehen, Nachtblindheit und Lichtempfindlichkeit) oder ein erhöhter Augeninnendruck (Symptome sind Augenschmerzen, rotes Auge, vermindertes oder verschwommenes Sehen).
- Infektionen (weil das Immunsystem, das Infektionen bekämpft, unterdrückt oder geschwächt ist).
- Pustulöse Psoriasis (rote Hautoberfläche mit gelblichen Pusteln, tritt gewöhnlich an Händen oder Füßen auf). Wenn Sie diese Nebenwirkung bemerken, beenden Sie die Anwendung dieses Mittels und informieren Sie Ihren Arzt so schnell wie möglich.
- Einfluss auf die Kontrolle von Diabetes mellitus (wenn Sie Diabetes haben, können Sie Schwankungen in Ihren Blutzuckerspiegeln erleben).

Schwere Nebenwirkungen verursacht durch Calcipotriol

- Allergische Reaktionen mit auffälliger Schwellung des Gesichts oder anderer Körperteile wie Hände oder Füße. Schwellung des Mundes/Halses und Atembeschwerden können auftreten. Wenn Sie eine allergische Reaktion haben, beenden Sie die Anwendung dieses Mittels, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder gehen Sie zur Notaufnahme der nächstgelegenen Klinik.
- Während der Behandlung mit diesem Gel kann der Kalziumspiegel in Ihrem Blut oder Urin ansteigen (meistens, wenn zu viel Gel verwendet wurde). Symptome eines erhöhten Kalziumspiegels sind übermäßige Urinproduktion, Verstopfung (Obstipation), Muskelschwäche, Verwirrtheit und Koma. Dies kann ernst sein und Sie sollten sofort Ihren Arzt informieren. Wenn die Behandlung beendet wird normalisiert sich der Kalziumspiegel ..

schwere Reaktionen Nebenwirkungen

Die folgenden weniger schwerwiegenden Nebenwirkungen wurden für dieses Mittel berichtet. Häufig (treten auf bei weniger als 1 von 10 Anwendern):

- Juckreiz.

Gelegentlich (treten auf bei weniger als 1 von 100 Anwendern):

- Reizung der Augen
- Brennendes Gefühl der Haut
- Gereizte oder schmerzhaft Haut
- Entzündung oder Schwellung der Haarfollikel (Folikulitis)
- Hautausschlag mit Hautentzündung (Dermatitis)
- Rötung der Haut verursacht durch Gefäßerweiterung (Erythem)
- Akne (Jugendpickel)
- Trockene Haut
- Hautausschlag
- Pustulöser Hautausschlag
- Hautinfektion.

Selten (treten bei weniger als 1 von 1000 Anwendern auf):

- Allergische Reaktionen
- Hautstreifen (Striae)
- Hautschuppung
- Verschlechterung der Psoriasis nach Absetzen der Behandlung (Rebound-Effekt).

Nicht bekannt (kann mit den verfügbaren Daten nicht bestimmt werden)

- Vorübergehende Verfärbung von weißem oder grauem Haar zu einer gelblichen Farbe an der Stelle der

Anwendung wenn das Mittel auf der Kopfhaut verwendet wird.

- Verschwommenes Sehen

Weniger schwerwiegende Nebenwirkungen, die vor allem durch langfristige Anwendung von Betamethason verursacht werden, sind die folgenden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Krankenschwester so schnell wie möglich falls diese auftreten.

- Dünn werden der Haut
- Erscheinen von erweiterten Blutgefäßen oder Hautstreifen
- Veränderung im Haarwuchs
- Roter Ausschlag um den Mund (periorale Dermatitis)
- Hautausschlag mit Entzündung oder Schwellung (allergische Kontaktdermatitis)

- Goldfarbene, mit Gel gefüllte Knötchen (kolloidale Milia)
- Aufhellung der Haut (Depigmentierung)
- Entzündung oder Schwellung des Haarfollikels (Follikulitis).

Weniger schwerwiegende Nebenwirkungen verursacht durch Calcipotriol sind die folgenden.

- Trockene Haut
- Empfindlichkeit der Haut gegenüber Licht, was zu Hautausschlag führt.
- Ekzem
- Juckreiz
- Hautreizung
- Brennend und stechend Gefühl
- Rötung der Haut durch Erweiterung kleiner Blutgefäße (Erythem)
- Hautausschlag
- Hautausschlag mit Entzündung der Haut (Dermatitis)
- Verschlimmerung von Psoriasis.

Das Melden von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für mögliche Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Niederländische Nebenwirkungszentrum Lareb, Website www.lareb.nl. Durch das Melden von Nebenwirkungen können Sie uns helfen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zu erhalten.

5. WIE BEWAHREN SIE DIESES MITTEL AUF?

- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie dieses Mittel nicht mehr nach dem Verfallsdatum. Dieses ist auf dem Fläschchen nach EXP angegeben. Dort steht ein Monat und ein Jahr. Der letzte Tag dieses Monats ist das Verfallsdatum.
- Nicht im Kühlschrank aufbewahren. Das Fläschchen in der Außenverpackung aufbewahren, um es vor Licht zu schützen.
- Das Fläschchen muss 6 Monate nach dem ersten Öffnen entsorgt werden.

Spülen Sie Arzneimittel nicht in der Spüle oder der Toilette hinunter und werfen Sie sie nicht in den Müll. Fragen Sie Ihren Apotheker, was Sie mit Arzneimitteln tun sollen, die Sie nicht mehr verwenden. Sie werden dann auf verantwortungsvolle Weise entsorgt und gelangen nicht in die Umwelt.

6. INHALT DER VERPACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Welche Stoffe sind in diesem Mittel enthalten?

Die Wirkstoffe in diesem Mittel sind: Calcipotriol und Betamethason.

Ein Gramm Gel enthält 50 Mikrogramm Calcipotriol (als Monohydrat) und 0,5 mg Betamethason (als Dipropionat).

Die anderen Stoffe in diesem Mittel sind:

- flüssiges Parafin
- Polyoxypropylenstearylether

- hydriertes Rizinusöl
- Butylhydroxytoluol (E321)
- all-rac- α -Tocopherol.

Wie sieht Dovobet aus und wie viel ist in einer Packung enthalten?

Dovobet ist ein nahezu transparenter, farbloser bis leicht cremefarbener Gel in hochdichten Polyethylenflaschen mit einer niedrigdichten Polyethylentülle und einem hochdichten Polyethylenschraubverschluss. Die Flaschen befinden sich in einem Karton. Packungsgrößen: 15 g, 30 g, 60 g, 80 g, 2 x 60 g, 2 x 80 g und 3 x 60 g.

Nicht alle genannten Packungsgrößen werden in den Handel gebracht.

Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen und Hersteller

Der Genehmigungsinhaber ist:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Dänemark.

Die Hersteller sind:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Dänemark

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
Irland.

Für weitere Informationen über dieses Arzneimittel können Sie sich an den örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers wenden.

LEO Pharma B.V.
Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam
Tel: (020) 510 41 41
Fax: (020) 510 41 42
E-Mail: leo-pharma.nl@leo-pharma.com

Zulassungsnummer für das Inverkehrbringen: RVG 100401

Dieses Arzneimittel ist in den EWR-Mitgliedstaaten unter den folgenden Namen registriert:

Daivobet®: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Ungarn, Kroatien, Lettland, Litauen, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Island, Schweden
Dovobet®: Belgien, Zypern, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Vereinigtes Königreich

Dieser Beipackzettel wurde zuletzt im August 2022 genehmigt.

Detaillierte Informationen über dieses Arzneimittel sind auf der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte verfügbar.

Transtoyou

BEIPACKZETTEL: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Dovobet 50 Mikrogramm/0,5 mg/g Gel

Calcipotriol/Betamethason

Applikator

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie

Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.

Haben Sie noch Fragen? Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an andere weiter, da es nur Ihnen verschrieben wurde. Es kann für andere schädlich sein, auch wenn sie die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

Haben Sie eine der in Abschnitt 4 aufgeführten Nebenwirkungen? Oder haben Sie eine Nebenwirkung, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt ist? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt dieser Packungsbeilage Was ist

1. Dovobet Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht anwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig sein?
2. Wie verwenden Sie dieses Mittel?
3. Mögliche
4. Nebenwirkungen Wie bewahren Sie dieses Mittel auf?
5. Inhalt der Packung und weitere Informationen
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST DOVOBET UND WOFÜR WIRD DIESES MITTEL ANGEWENDET?

Dieses Mittel wird zur lokalen Behandlung von Psoriasis auf der Kopfhaut bei Erwachsenen und zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Plaque-Psoriasis (Psoriasis vulgaris) an anderen Stellen des Körpers bei Erwachsenen angewendet. Psoriasis wird verursacht, weil Ihre Hautzellen zu schnell produziert werden. Dies verursacht Rötung, Schuppung und Verdickung der Haut.

Dieses Mittel enthält Calcipotriol und Betamethason. Calcipotriol hilft, die Wachstumsrate der Hautzellen zu normalisieren und Betamethason wirkt entzündungshemmend.

2. WANN DÜRFEN SIE DIESES MITTEL NICHT ANWENDEN ODER MÜSSEN SIE BESONDERS VORSICHTIG SEIN?

Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht anwenden?

Sie sind allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe dieses Arzneimittels. Diese Stoffe finden Sie in Abschnitt 6.

wenn Sie Probleme mit den Kalziumspiegeln in Ihrem Körper haben (konsultieren Sie Ihren Arzt)

wenn Sie bestimmte Formen von Psoriasis haben, wie Psoriasis Erythrodermie, exfoliative Psoriasis und Psoriasis pustulosa (konsultieren Sie Ihren Arzt).

Dieses Mittel enthält ein stark wirksames Kortikosteroid (Nebennierenrindenhormon), verwenden Sie es daher NICHT auf Haut, die betroffen ist von:

Hautinfektionen verursacht durch Viren (zum Beispiel Herpes oder Windpocken)

Hautinfektionen verursacht durch Pilze (zum Beispiel Fußpilz oder Ringelflechte)

Hautinfektionen verursacht durch Bakterien

Hautinfektionen verursacht durch Parasiten (zum Beispiel Krätze)

Tuberkulose (TB)

peri-orale dünne

dünn Haut, empfindliche Adern, Dehnungsstreifen
Ichthyose (trockene Haut mit Fischeschuppen)
Akne (Jugendpickel)
Rosacea (starkes Erröten oder Rötung der Gesichtshaut)
Geschwüre oder Hautwunden.

Wann sollten Sie bei der Anwendung dieses Mittels besonders vorsichtig sein?
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Krankenschwester oder Ihren Apotheker, bevor Sie dieses Mittel anwenden und während der Anwendung, wenn:

Sie andere Arzneimittel verwenden, die Nebennierenrindenhormone (Kortikosteroide) enthalten, da Sie davon Nebenwirkungen bekommen können
Sie dieses Arzneimittel längere Zeit verwendet haben und planen, damit aufzuhören (da das Risiko besteht, dass die Psoriasis sich verschlimmert oder zurückkehrt, wenn plötzlich die Anwendung von Steroiden gestoppt wird)
Sie Diabetes mellitus haben (Zuckerkrankheit), da Ihr Blutzucker-/Glukosespiegel durch das Steroide
es eine Hautinfektion auftritt, da es notwendig sein kann, die Behandlung zu stoppen • wenn Sie eine bestimmte Form der Psoriasis haben, genannt Psoriasis guttata
Sie unter verschwommenem Sehen oder anderen Sehproblemen leiden.

Besondere Warnungen

Vermeiden Sie die Anwendung auf mehr als 30% Ihres Körpers und verwenden Sie nicht mehr als 15 Gramm pro Tag
Vermeiden Sie die Anwendung unter einer Badekappe, Bandagen oder Verbänden, da dies die Absorption des Steroide fördert
Vermeiden Sie die Anwendung auf großen betroffenen Stellen, auf Schleimhäuten oder in Hautfalten (Leisten, Achseln, unter den Brüsten), da dies die Absorption des Steroide fördert.
Vermeiden Sie die Anwendung im Gesicht oder an den Genitalien (Geschlechtsorganen), da diese sehr empfindlich auf Steroide reagieren
Vermeiden Sie übermäßige Sonnenexposition, übermäßige Nutzung von Solarien oder andere Formen der Lichttherapie.

Kinder

Dieses Mittel wird nicht zur Anwendung bei Kindern unter 18 Jahren empfohlen.

Verwenden Sie noch andere Arzneimittel?

Verwenden Sie neben Dovobet noch andere Arzneimittel, haben Sie das kürzlich getan oder besteht die Möglichkeit, dass Sie in naher Zukunft andere Arzneimittel verwenden werden? Informieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker.

Schwangerschaft und Stillzeit

Sind Sie schwanger, denken Sie schwanger zu sein, möchten Sie schwanger werden oder stillen Sie? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel verwenden. Wenn Ihr Arzt zugestimmt hat, dass Sie stillen, seien Sie vorsichtig und tragen Sie dieses Mittel nicht auf die Brüste auf.

Fahrtüchtigkeit und Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel hat keinen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.

Dovobet enthält Butylhydroxytoluol (E321)

Dovobet enthält Butylhydroxytoluol (E321). Dies kann lokale Hautreaktionen verursachen (zum Beispiel Kontaktdermatitis) oder Reizungen an den Augen und Schleimhäuten.

3. WIE VERWENDEN SIE DIESES MEDIKAMENT?

Verwenden Sie dieses Medikament immer genau so, wie es Ihnen Ihr Arzt gesagt hat. Haben Sie Zweifel an der richtigen Anwendung? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wo dieses Mittel angewendet werden soll: zur Anwendung auf der Haut (kutan).

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Dovobet Gel-Applikators am Ende dieser Packungsbeilage sorgfältig durch.

In der Gebrauchsanweisung finden Sie Informationen über den Zusammenbau, die Anwendung, die Reinigung und die Aufbewahrung des Dovobet Gel-Applikators.

Der Dovobet Gel-Applikator wird im Rest dieser Packungsbeilage als 'der Applikator' bezeichnet.

Anweisungen zur korrekten Anwendung dieses Mittels

Nur auf den Psoriasisstellen anwenden und nicht auf anderen Hautbereichen, die nicht von Psoriasis betroffen sind.

Tragen Sie dieses Mittel mit dem Applikator auf die betroffene Haut auf und reiben Sie es sanft ein, bis die Psoriasisstelle vollständig mit einer dünnen Schicht Gel bedeckt ist.

Den behandelten Bereich nicht verbinden, nicht fest abdecken oder umwickeln. Waschen Sie nach dem Auftragen dieses Mittels sorgfältig Ihre Hände, wenn Sie Gel auf Ihre Finger bekommen haben. Dadurch wird vermieden, dass das Gel versehentlich auf andere Körperteile (insbesondere Gesicht, Mund und Augen) gelangt.

Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn etwas Gel versehentlich neben die Psoriasisstellen auf die unbetroffene Haut gelangt, aber wischen Sie es ab, wenn das Gel zu weit verteilt wird.

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, nicht sofort nach dem Auftragen dieses Mittels zu baden oder zu duschen.

Vermeiden Sie nach dem Auftragen des Gels den Kontakt mit Stoffen, die empfindlich auf Fettflecken reagieren (zum Beispiel Seide).

Es ist nicht notwendig, das Haar vor dem Auftragen dieses Mittels zu waschen.

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, das Haar nicht unmittelbar nach dem Auftragen dieses Mittels zu waschen. Lassen Sie dieses Mittel tagsüber oder über Nacht einwirken. Wenn Sie das Haar nach dem Auftragen des Gels waschen, können Sie die folgenden Hinweise beachten:

1. Tragen Sie ein mildes Shampoo auf das trockene Haar auf, insbesondere an den Stellen, an denen das Gel aufgetragen wurde.
2. Lassen Sie das Shampoo ein paar Minuten auf der Kopfhaut einwirken, bevor Sie es auswaschen.
3. Waschen Sie Ihr Haar wie gewohnt.

Bei Bedarf können Sie die Schritte 1-3 ein- oder zweimal wiederholen.

Dauer der Behandlung

Verwenden Sie das Gel einmal täglich. Es kann angenehmer sein, das Gel abends zu verwenden.

Die übliche anfängliche Behandlungsdauer beträgt 4 Wochen für die Behandlung der Kopfhaut und 8 Wochen für die Behandlung von Psoriasis an anderen Körperstellen.

Ihr Arzt kann entscheiden, die Behandlungsdauer zu ändern.

Ihr Arzt kann sich für eine Anschlussbehandlung entscheiden.

Verwenden Sie nicht mehr als 15 g pro Tag. Das bedeutet, dass Sie mindestens 4 Tage mit einem Applikator mit 60 Gramm Gel auskommen müssen.

Eine Menge von 1 g bis 4 g pro Tag ist in der Regel ausreichend für die Behandlung der Kopfhaut.

Wenn Sie auch andere calcipotriolhaltige Produkte verwenden, darf die Gesamtmenge der calcipotriolhaltigen Produkte nicht mehr als 15 Gramm pro Tag betragen. Der behandelte Bereich darf nicht größer als 30 % der gesamten Körperoberfläche sein. Ein Pumpstoß liefert 0,05 g dieses Mittels.

Was kann ich erwarten, wenn ich dieses Mittel verwende?

Die meisten Patienten sehen nach 2 Wochen deutliche Ergebnisse, auch wenn die Psoriasis zu diesem Zeitpunkt noch nicht verschwunden ist.

Haben Sie zu viel von diesem Mittel verwendet?

Konsultieren Sie Ihren Arzt wenn Sie mehr als 15 Gramm pro Tag verwendet haben.

Übermäßiger Gebrauch dieses Mittels kann auch Probleme mit dem Kalzium in Ihrem Blut verursachen, was sich normalerweise normalisiert, wenn die Behandlung gestoppt wird.

Es kann notwendig sein, dass Ihr Arzt eine Blutuntersuchung durchführt, um festzustellen, ob die Verwendung von zu viel Gel keine Probleme mit dem Kalzium in Ihrem Blut verursacht hat.

Übermäßiger langfristiger Gebrauch kann auch dazu führen, dass Ihre Nebennieren nicht mehr richtig funktionieren (die Nebennieren befinden sich in der Nähe der Nieren und produzieren Hormone).

Haben Sie vergessen, dieses Mittel zu verwenden?

Nehmen Sie keine doppelte Dosis, um eine vergessene Dosis nachzuholen.

Wenn Sie die Anwendung dieses Mittels beenden

Mit der Anwendung dieses Mittels muss auf Anweisung Ihres Arztes gestoppt werden. Es kann notwendig sein, dass Sie die Anwendung dieses Arzneimittels schrittweise beenden, insbesondere wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwendet haben.

Haben Sie noch weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Wie jedes Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, auch wenn nicht jeder davon betroffen ist.

Schwere Nebenwirkungen

Nehmen Sie sofort oder so schnell wie möglich Kontakt mit Ihrem Arzt oder Ihrer Pflegekraft auf wenn eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt. Es kann notwendig sein, die Behandlung zu beenden.

Die folgenden schweren Nebenwirkungen wurden für dieses Mittel berichtet Gelegentlich (treten bei weniger als 1 von 100 Anwendern auf):

Die Verschlechterung der Psoriasis. Informieren Sie sofort Ihren Arzt wenn die Psoriasis sich verschlechtert.

Einige schwere Nebenwirkungen werden durch Betamethason (ein stark wirksames Steroid) verursacht, und einer der Bestandteile dieses Mittels. Sie müssen Ihren Arzt so schnell wie möglich informieren wenn eine dieser schwerwiegenden Nebenwirkungen auftritt. Diese Nebenwirkungen treten hauptsächlich nach längerer Anwendung, bei Anwendung in Hautfalten (Leisten, Achselhöhlen, unter den Brüsten), bei Anwendung unter einem Okklusivverband oder bei Anwendung auf großen Hautflächen auf.

Es handelt sich um folgende Nebenwirkungen:

Funktionsstörung der Nebennieren. Symptome sind Müdigkeit, Depression und Angst.

Grauer Star (Symptome sind verschwommenes Sehen, Nachtblindheit und Lichtempfindlichkeit) oder ein erhöhter Augeninnendruck (Symptome sind Augenschmerzen, rotes Auge, vermindertes oder verschwommenes Sehen).

Infektionen (da das Immunsystem, das Infektionen bekämpft, unterdrückt oder geschwächt ist).

- Pustulöse Psoriasis (rote Hautoberfläche mit gelblichen Pusteln, tritt gewöhnlich an Händen oder Füßen auf). Wenn Sie diese Nebenwirkung bemerken, beenden Sie die Anwendung dieses Mittels und informieren Sie so schnell wie möglich Ihren Arzt. Einfluss auf die Kontrolle von Diabetes mellitus (wenn Sie Diabetes haben, können Schwankungen Ihres Blutzuckerspiegels auftreten).

Schwerwiegende Nebenwirkungen verursacht durch Calcipotriol

Allergische Reaktionen mit auffälliger Schwellung des Gesichts oder anderer Körperteile wie Hände oder Füße. Schwellung von Mund/Rachen und Atembeschwerden können auftreten. Wenn Sie eine allergische Reaktion haben, beenden Sie die Anwendung dieses Mittels, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder gehen Sie zur Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses. Während der Behandlung mit diesem Gel kann der Kalziumgehalt in Ihrem Blut oder Urin ansteigen (meistens, wenn zu viel Gel verwendet wurde). Symptome eines erhöhten Kalziumgehalts sind übermäßige Urinproduktion, Verstopfung, Muskelschwäche, Verwirrung und Koma. Dies kann ernst sein und Sie sollten sofort Ihren Arzt informieren. Wann die Behandlung wird gestoppt normalisiert der Kalziumspiegel sich.

Weniger schwere Nebenwirkungen

Die folgenden weniger schweren Nebenwirkungen wurden für dieses Mittel berichtet. Häufig (treten bei weniger als 1 von 10 Anwendern auf):

Juckreiz.

Manchmal (treten bei weniger als 1 von 100 Anwendern auf):

Reizung der Augen
Brennend Gefühl der Haut
Gereizte oder schmerzhafte Haut
Entzündung oder Schwellung der Haarfollikel (Follikulitis)
Hautausschlag mit Hautentzündung (Dermatitis)
Rötung der Haut verursacht durch Gefäßerweiterung (Erythem)
Akne (Jugendpickel)
Trockene Haut
Hautausschlag
Pustulös Hautausschlag
Hautinfektion.

Selten (treten bei weniger als 1 von 1000 Anwendern auf):

Allergische Reaktionen
Hautstreifen (Striae)
Hautschuppung
Verschlechterung der Psoriasis nach Absetzen der Behandlung (Rebound-Effekt).

Nicht bekannt (kann anhand der verfügbaren Daten nicht bestimmt werden)

Vorübergehende Verfärbung von weißem oder grauem Haar zu einer gelblichen Farbe an der Applikationsstelle, wenn das Mittel auf der Kopfhaut verwendet wird.
Verschwommenes Sehen

Weniger schwerwiegende Nebenwirkungen, die vor allem durch langfristige Anwendung von Betamethason verursacht werden, sind die folgenden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Pflegekraft so schnell wie möglich falls diese auftreten.

- Dünnen werden der Haut
- Erscheinen von erweiterten Blutgefäßen oder Hautstreifen
- Veränderung im Haarwuchs
- Roter Ausschlag um den Mund (periorale Dermatitis)
- Hautausschlag mit Entzündung oder Schwellung (allergische Kontaktdermatitis)
- Goldfarbene, mit Gel gefüllte Knötchen (kolloidale Milia)
- Aufhellung der Haut (Depigmentierung)
- Entzündung oder Schwellung des Haarfollikels (Follikulitis).

Weniger schwerwiegende Nebenwirkungen, die durch Calcipotriol verursacht werden, sind die folgenden

- Trockene Haut
- Lichtempfindlichkeit der Haut, die zu Hautausschlag führt.
- Ekzem
- Juckreiz
- Hautreizung
- Brennend und stechend Gefühl
- Rötung der Haut durch Erweiterung kleiner Blutgefäße (Erythem)
- Hautausschlag
- Hautausschlag mit Entzündung der Haut (Dermatitis)
- Verschlimmerung von Psoriasis.

Das Melden von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für mögliche Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Niederländische Nebenwirkungszentrum melden Lareb, Website www.lareb.nl. Durch das Melden von Nebenwirkungen können Sie uns helfen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zu erhalten.

5. WIE IST DIESES MITTEL AUFZUBEWAHREN?

- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie dieses Mittel nicht mehr nach dem Verfallsdatum. Dieses ist auf der Packung nach EXP angegeben. Dort steht ein Monat und ein Jahr. Der letzte Tag dieses Monats ist das Verfallsdatum.
- Nicht im Kühlschrank aufbewahren.
- Der Applikator ist einweg. Der Applikator muss 6 Monate nach dem ersten Öffnen mit eventuell verbleibendem Gel entsorgt werden.

Spülen Sie Arzneimittel nicht in die Spüle oder die Toilette und werfen Sie sie nicht in den Müll. Fragen Sie Ihren Apotheker, was Sie mit Arzneimitteln tun sollen, die Sie nicht mehr verwenden. Sie werden dann auf verantwortungsvolle Weise vernichtet und gelangen nicht in die Umwelt.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

•
Welche Stoffe sind in diesem Mittel enthalten?

Die Wirkstoffe in diesem Mittel sind: Calcipotriol und Betamethason.

Ein Gramm Gel enthält 50 Mikrogramm Calcipotriol (als Monohydrat) und 0,5 mg Betamethason (als Dipropionat).

Die anderen Stoffe in diesem Mittel sind:

flüssiges Parafin
Polyoxypropylenstearylether
gehärtetes Rizinusöl
Butylhydroxytoluol (E321)
all-rac- α -Tocopherol.

Wie sieht Dovobet aus und wie viel ist in einer Packung enthalten?

Dovobet ist ein nahezu transparenter, farbloser bis leicht cremefarbener Gel in einer Polypropylen-Füllung (mit einem hochdichten Polyethylen-Kolben und Schraubverschluss). Die Füllung und der Kopf des Applikators (Polypropylen-Außenseite, Polyoxy-methylen Griff und thermoplastische Elastomer-Tülle) werden vor der ersten Verwendung zusammengebaut. Die Polypropylen-Schutzkappe ist zum Aufbewahren des Applikators gedacht.

Die Füllung(en), Kopf(köpfe) des Applikators und Schutzkappe(n) sind in einer Schachtel verpackt. Packungsgrößen: 60 g (entsprechend 68 ml) und 2 x 60 g (entsprechend 2 x 68 ml)

Nicht alle genannten Packungsgrößen werden in den Handel gebracht.

Inhaber der Zulassung für das Inverkehrbringen und Hersteller

Der Zulassungsinhaber ist:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Dänemark.

Die Hersteller sind:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Dänemark

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
Irland.

Die Gebrauchsanweisung für den Applikator finden Sie am Ende dieser Packungsbeilage.

Für weitere Informationen über dieses Arzneimittel können Sie sich an den örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers wenden.

LEO Pharma B.V.
Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam
Tel: (020) 510 41 41
Fax: (020) 510 41 42
e-mail: leo-pharma.nl@leo-pharma.com

Zulassungsnummer für das Inverkehrbringen: RVG 100401

Dieses Arzneimittel ist in den EWR-Mitgliedstaaten unter den folgenden Namen registriert:

Daivobet[®]: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Ungarn, Kroatien, Lettland, Litauen, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Island, Schweden

Dovobet[®]: Belgien, Zypern, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Vereinigtes Königreich

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im August 2022 genehmigt.

Detaillierte Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte verfügbar.

Gebrauchsanweisung Dovobet Gel-Applikator

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage und diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, auch wenn Sie Dovobet Gel bereits verwendet haben.

Die Dovobet Gel-Applikator ist dafür konzipiert, Dovobet Gel auf Ihre von Psoriasis betroffene Haut und/oder Kopfhaut aufzutragen. Durch die Verwendung des Dovobet Gel-Applikators können Sie Dovobet Gel auftragen, ohne dass Sie Gel auf Ihre Finger bekommen.

Halten Sie sich an die Anweisungen Ihres Arztes bezüglich Ihrer Psoriasis-Behandlung. Teilen Sie den Dovobet Gel-Applikator nicht mit anderen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern auf.

Ihr Dovobet Gel-Applikator besteht aus den folgenden Teilen

Bereiten Sie Ihren Dovobet Gel-Applikator vor

A) Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf der Füllung Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett der Füllung.

Nicht verwenden, wenn abgelaufen.

Das Verfallsdatum auf der Füllung bezieht sich auf den letzten Tag dieses Monats.

Schreiben Sie das Datum, an dem Sie den Applikator zusammengebaut haben, auf das Etikett der Füllung.t auf das Etikett der Füllung.

Verwenden Sie den Applikator nicht mehr nach 6 Monaten nach diesem Datum.

B) Entfernen Sie die Schraubkappe der Füllung Halten Sie die Füllung aufrecht, drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu öffnen.

Vermeiden Sie das Kippen der Füllung, um ein Verschütten des Gels zu verhindern.

Werfen Sie die Schraubkappe weg.

C) Bestätigen Sie dHalten Sie die Füllung aufrecht und setzen Sie den Kopf des Applikators gerade darauf. Drehen Sie den Kopf des

Applikators im Uhrzeigersinn, bis der Kopf des Applikators fest

Applikator im Uhrzeigersinn bis zum Kopf des Applikators gut ..

Sie hören ein Klickgeräusch, wenn es fest versiegelt ist.

Hinweis:

Nach diesem Schritt ist es nicht mehr möglich,

die Applikator auseinanderzunehmen. Wenn Sie versuchen, dies zu tun, kann der Applikator brechen.

D) Vorbereitungen für die erste Anwendung treffen

Zur Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Kopf des Applikators und die Füllung richtig zusammengesetzt sind.

Drücken Sie vorsichtig auf die Mitte des Kolbens, während Sie den Griff drücken, bis Sie Gel an der Spitze sehen.

Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen und Ihren zusammengesetzten Dovobet Gel-Applikator mitnehmen, kann es notwendig sein, nach der Landung mehrmals den Griff zu betätigen, bevor das Gel aus der Spitze kommt.

Dovobet Gel auf die betroffene Haut auftragen

E) Auf die betroffene Haut auftragen

Halten Sie die Spitze des Applikators nahe Ihrer Haut und drücken Sie je nach benötigter Menge ein- oder mehrmals auf den Hebel. Lassen Sie den Hebel zwischen jedem Pumpstoß vollständig los. Dadurch verhindern Sie, dass zu wenig Gel herauskommt.

Ein Pumpstoß liefert 0,05 g Dovobet Gel.

F) Verwendung der Verteilflächen

Falls Sie möchten, können Sie die verschiedenen Verteilflächen verwenden, um Dovobet Gel sanft in die Haut einzumassieren.

Achten Sie darauf, während des Verteilens nicht auf den Hebel zu drücken.

G) Anwendung auf der Kopfhaut und Haarlinie

Zum Auftragen von Dovobet Gel auf die Kopfhaut, müssen Sie das Haar kämmen, um eventuelle lose Schuppen zu entfernen. Neigen Sie Ihren Kopf, um zu verhindern, dass Dovobet Gel in Ihr Gesicht läuft. Es kann helfen, einen Scheitel in Ihrem Haar zu ziehen, bevor Sie Dovobet Gel auftragen. Suchen Sie den zu behandelnden Bereich mit Ihren Fingern und spreizen Sie Ihr Haar.

Setzen Sie die Tülle direkt auf die Kopfhaut, tragen Sie das Gel auf und massieren Sie das Dovobet Gel in die Haut ein.

H) Nach dem Auftragen

Überprüfen Sie, ob alle betroffenen Stellen eingecremt sind.

Falls nötig, bitten Sie jemanden, Ihnen beim Auftragen von Dovobet Gel an Stellen zu helfen, die Sie nicht erreichen oder sehen können.

Hände waschen nach Gebrauch, wenn Sie oder jemand, der Ihnen hilft, Dovobet Gel auf die Finger bekommen hat. Dadurch wird verhindert, dass das Gel versehentlich auf andere Körperteile (insbesondere Gesicht, Mund und Augen) übertragen wird.

Nach Gebrauch

I) Reinigen Sie Ihren Dovobet Gel-Applikator nach jedem Gebrauch

Wischen Sie den Kopf des Applikators nach Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Drücken Sie den Griff beim Reinigen nicht zusammen.

Hinweis:

Den Applikator nicht mit Wasser, Spülmittel oder anderen Substanzen reinigen.

Verwenden Sie keine feuchten oder nassen Materialien, um den Applikator abzuwischen.

J) Schließen Sie den Applikator

Setzen Sie nach jedem Gebrauch die Schutzkappe auf den Applikator, um den Kopf des Applikators sauber zu halten.

Überprüfen Sie immer, ob die Schutzkappe einrastet, um zu verhindern, dass Dovobet Gel während der Lagerung und des Transports austritt.

K) Schätzung der verbleibenden Menge Dovobet gel

Um die verbleibende Menge Dovobet Gel abzuschätzen, schauen Sie auf die Unterseite der Kartusche, um die Position des Kolbens zu sehen. Der Kolben bewegt sich nach oben, wenn das Gel verwendet wird.

Bevor Sie erneut verwenden

L) Verfallsdatum überprüfen

Überprüfen Sie vor der Verwendung immer das Verfallsdatum auf dem Etikett der Kartusche. Nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum überschritten ist oder 6 Monate nach dem Öffnen der Kartusche.

Das Verfallsdatum auf der Kartusche bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

M) Schutzkappe entfernen

Entfernen Sie die Schutzkappe, indem Sie die Lasche auf der Rückseite nach oben drücken.

Aufbewahrung

Überprüfen Sie immer, ob die Schutzkappe einrastet, um zu verhindern, dass Dovobet Gel während der Lagerung und des Transports austritt.

Weitere Informationen zur Aufbewahrung finden Sie in Abschnitt 5, „Wie bewahren Sie dieses Arzneimittel auf“.

Entsorgung

Siehe die Informationen zur Entsorgung in Abschnitt 5, „Wie bewahren Sie dieses Arzneimittel auf“.