

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Dovobet 50 mikrogrammaa/0,5 mg/g geeli

kalsipotrioli/betametasoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Sisältö tässä pakkausselosteessa pakkausseloste

1. Mikä on Dovobet ja mihin tätä lääkettä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen sen kanssa?
3. Kuinka käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ DOVOBET ON JA MIHIN TÄTÄ LÄÄKETTÄ KÄYTETÄÄN?

Tämä lääke käytetään aikuisten päänahan psoriaasin paikalliseen hoitoon ja lievän tai keskivaikean läiskäpsoriaasin (psoriasis vulgaris) hoitoon muualla kehossa aikuisilla. Psoriaasi johtuu siitä, että ihosolusi tuotetaan liian nopeasti. Tämä aiheuttaa ihon punoitusta, hilseilyä ja paksuuntumista.

Tämä lääke sisältää kalsipotriolia ja betametasoni. Calcipotrioli auttaa normalisoimaan ihosolujen kasvunopeutta ja betametasoni toimii tulehdusta ehkäisevästi.

2. MILLOIN ET SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ LÄÄKETTÄ TAI PITÄÄKÖ SINUN OLLA ERITYISEN VAROVAINEN?

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

- Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6.
- jos sinulla on ongelmia kalsiumtasojen kanssa kehossasi (kysy lääkäriltäsi)
- jos sinulla on tiettyjä psoriaasin muotoja, kuten psoriaasi erythrodermia, eksfoliatiivinen psoriaasi ja psoriaasi pustuloosa (kysy lääkäriltäsi).

Tämä lääke sisältää voimakkaasti vaikuttavaa kortikosteroidia (lisämunuaishormonia), joten ÄLÄ käytä sitä iholla, joka on vaurioitunut:

- ihotulehdukset virusten aiheuttamat (esimerkiksi herpes tai vesirokko)
- ihotulehdukset sienten aiheuttamat (esimerkiksi jalkasieni tai silsa)

- ihotulehdukset aiheuttamat kautta bakteerit
- ihoinfektiot aiheuttamat loiset (esimerkiksi syyhy)
- tuberkuloosi (TB)
- peri-oraalinen dermatiitti (punainen ihottuma suun ympärillä)
- ohut iho, hauraat suonet, ihon venytys
- iktyoosi (kuiva iho, jossa kalansuomuja)
- akne (nuoruusiän akne)
- ruusufinni (vakava punastuminen tai kasvojen ihon punoitus)
- haavaumat tai ihovauriot.

Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi, sairaanhoitajaasi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä ja käytön aikana, kun:

- sinä käytät muita lääkkeitä, jotka sisältävät lisämunuaiskuoren hormoneja (kortikosteroideja), koska voit saada niistä sivuvaikutuksia
- sinä olet käyttänyt tätä lääkettä pitkään ja aiot lopettaa sen käytön (koska on olemassa riski, että psoriasis pahenee tai palaa, kun steroidien käyttö lopetetaan äkillisesti)
- sinä sinulla on diabetes mellitus (sokeritauti), koska verensokeri/glukoositasosi voi vaikuttaa steroidi
- en jos ilmenee ihotulehdus, koska hoito voi olla tarpeen lopettaa
- sinä sinulla on tietynlainen psoriaasi, jota kutsutaan guttata-psoriaasiksi
- sinä kärsit näön hämärtymisestä tai muista näköongelmista.

Erityiset varoitukset

- Vältä käyttöä yli 30 %:lla kehostasi ja älä käytä yli 15 grammaa päivässä
- Vältä käyttöä uimalakin, siteiden tai sidosten alla, koska tämä voi lisätä steroidin imeytymistä
- Vältä käyttöä laajoilla vaurioituneilla alueilla, limakalvoilla tai ihopoimuissa (nivuset, kainalot, rintojen alla), koska tämä voi lisätä steroidin imeytymistä.
- Vältä käyttöä kasvoilla tai sukuelimissä, koska ne ovat erittäin herkkiä steroideille
- Vältä liiallista altistumista auringolle, liiallista solariumin käyttöä tai muita valohoitomuotoja.

Lapset

Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaalle lapsille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö lisäksi Dovobet vielä muita lääkkeitä, onko sinulla äskettäin tehnyt tai onko mahdollista, että aiot käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, luuletko olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä. Jos lääkärisi on hyväksynyt imetyksen, ole varovainen ja älä levitä tätä lääkettä rintoihin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Dovobet sisältää butyylihydroksitolueenia (E321)

Dovobet sisältää butyylihydroksitolueenia (E321). Tämä voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esimerkiksi kosketushottumaa) tai ärsytystä silmissä ja limakalvoilla.

3. KUINKA KÄYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

Käytä tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Missä tätä lääkettä tulee käyttää: käytä iholla (kutaaneisesti).

Ohjeet oikeaan käyttöön käyttö

- Käytä vain psoriaasialäiskille eikä muille ihoalueille, joita psoriasis ei ole vaurioittanut.
- Ravista pulloa ennen käyttöä ja poista korkki.
- Paina hieman geeliä puhtaalle sormelle tai suoraan psoriaasikohdalle.
- Levitä tätä lääkettä vaurioituneelle iholle sormenpäillä ja hiero se varovasti, kunnes psoriaasikohta on kokonaan peitetty ohuella geelikerroksella.
- Älä peitä käsiteltyä aluetta, äläkä kääri sitä tiukasti.
- Pese kätesi huolellisesti tämän lääkkeen levittämisen jälkeen. Näin vältetään, että geeli joutuu vahingossa muille kehon osille (erityisesti kasvoille, suuhun ja silmiin).
- Ei tarvitse huolestua, jos hieman geeliä joutuu vahingossa psoriaasikohtien ulkopuolelle terveelle iholle, mutta pyyhi se pois, jos geeli leviää liian laajalle.
- Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi on suositeltavaa olla menemättä kylpyyn tai suihkuun heti tämän lääkkeen levittämisen jälkeen.
- Vältä geelin levittämisen jälkeen kosketusta aineiden kanssa, jotka ovat herkkiä rasvatahoille (esimerkiksi silkki).

Jos sinulla on psoriaasi päänahassa

- Ennen kuin levität tätä lääkettä päänahaan, kampaa hiuksesi poistaaksesi mahdolliset irtonaiset hilseet. Pidä pääsi kallellaan varmistaaksesi että tämä lääke ei valu kasvoillesi. On helpompaa, kun ennen tämän lääkkeen levittämistä tee jakaus hiuksiisi. Levitä tätä valmistetta sormenpäilläsi vaurioituneelle alueelle ja hiero geeliä varovasti.

jakauksen hiuksiisi. Levitä tätä lääkettä sormenpäilläsi vaurioituneelle alueelle ja hiero geeli varovasti. Ei ole tarpeen pestä hiuksia ennen tämän lääkkeen levittämistä.

1. Ravista pulloa pullo varten käyttö
2. Levitä tippa tätä lääkettä sormenpäähän
3. Levitä päänahan alueille, joissa tunnet kohonneen psoriaasikohdan, ja hiero geeli ihoon. Riippuen vaurioituneen alueen laajuudesta, 1-4 g (noin teelusikallinen) on yleensä riittävä.

Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi on suositeltavaa olla pesemättä hiuksia heti tämän lääkkeen levittämisen jälkeen. Anna tämän lääkkeen vaikuttaa päivän tai yön ajan. Kun peset hiukset geelin levittämisen jälkeen, voit ottaa huomioon seuraavatohjeet:

4. Levitä mietoa shampooa kuiviin hiuksiin, erityisesti niille alueille, joille geeli levitettiin.

5. Anna shampoon vaikuttaa päänahassa muutaman minuutin ajan ennen kuin huuhtelet sen pois.
6. Pese hiuksesi kuten tavallisesti.

Tarvittaessa voit toistaa vaiheet 4-6 yksi tai kahdesti.

Hoidon kesto

- Käytä geeliä kerran päivässä. Saattaa olla miellyttävämpää käyttää geeliä illalla.
- Tavallinen aloitushoitajakso on 4 viikkoa päänahan hoitoon ja 8 viikkoa psoriasiksen hoitoon muualla kehossa.
- Lääkärisi voi päättää muuttaa hoitajaksoa
- Lääkärisi voi päättää jatkohoidosta
- Älä käytä enempää kuin 15 g päivässä

Indien jos käytät myös muita kalsipotriolia sisältäviä tuotteita, niiden kokonaiskäyttö ei saa ylittää 15 grammaa päivässä. Hoidettava alue ei saa olla suurempi kuin 30 % kehon kokonaispinta-alasta.

Mitä voin odottaa, kun käytän tätä lääkettä?

Useimmat potilaat näkevät selviä tuloksia 2 viikon jälkeen, vaikka psoriasis ei olisikaan vielä hävinnyt.

Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Ota yhteys lääkäriisi indien jos olet käyttänyt yli 15 grammaa päivässä.

Liiallinen käyttö tätä lääkettä voi aiheuttaa myös ongelmia veren kalsiumin kanssa, mikä yleensä normalisoituu, kun hoito lopetetaan.

Lääkärisi saattaa joutua tekemään verikokeen tarkistaakseen, onko liiallinen geelin käyttö aiheuttanut ongelmia veren kalsiumin kanssa.

Ylenmääräinen pitkäaikainen käyttö voi myös aiheuttaa, että lisämunuaiset eivät enää toimi kunnolla (lisämunuaiset sijaitsevat munuaisten lähellä ja ne tuottavat hormoneja).

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Älä ota kaksinkertaista annosta unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Tämän lääkkeen käyttö tulee lopettaa lääkärin ohjeiden mukaan. Saattaa olla tarpeen lopettaa tämän lääkkeen käyttö vähitellen, erityisesti jos olet käyttänyt sitä pitkän aikaa.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia , vaikka kaikki eivät niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Ota välittömästi tai mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi tai hoitajaasi jos jokin seuraavista haittavaikutuksista ilmenee. Saattaa olla tarpeen lopettaa hoito. Seuraavat

vakavat haittavaikutukset on raportoitu tälle lääkkeelle Joskus (esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta):

- Psoriaasin paheneminen. Ilmoita lääkäriillesi välittömästi jos psoriaasi pahenee.

Jotkut vakavat haittavaikutukset johtuvat betametasoni (voimakkaasti vaikuttava steroidi), ja yksi tämän lääkkeen ainesosista. Sinun tulee ilmoittaa lääkäriillesi mahdollisimman pian jos jokin näistä vakavista haittavaikutuksista ilmenee. Nämä haittavaikutukset esiintyvät pääasiassa pitkäaikaisen käytön jälkeen, käytettäessä ihopoimuissa (nivuset, kainalot, rintojen alla), käytettäessä peittävän sidoksen alla tai käytettäessä laajoilla ihoalueilla.

SeLisämunaisten toimintahäiriö. Oireita ovat väsymys, masennus ja ahdistus.

- Harmaakaihi (oireita ovat näön hämärtyminen, hämäräsokeus ja valonarkuus) tai kohonnut silmänpaine (oireita ovat silmäkipu, punainen silmä, heikentynyt tai hämärtynyt näkö).
- Infektiot (koska immuunijärjestelmä, joka taistelee infektioita vastaan, on tukahdutettu tai heikentynyt).
- Pustulaarinen
- Pustulaarinen psoriaasi (punainen ihon pinta, jossa on kellertäviä näppyliitä, esiintyy tavallisesti käsissä tai jaloissa). Jos Vaikutus diabetes mellituksen hallintaan (jos sinulla on diabetes, verensokeritasosi voivat vaihdella).
- Vaikutus diabetes mellituksen hallintaan (jos sinulla on diabetes, verensokeritasosi voivat vaihdella).

haittavaikutuk setn aiheuttama calcipotriolin

- Allergiset reaktiot, joihin liittyy huomattavaa kasvojen tai muiden kehon osien, kuten käsien tai jalkojen, turvotusta. Suun/kurkun turvotus ja hengitysvaikeudet voivat ilmetä. Jos sinulla on allerginen reaktio, lopeta tämän lääkkeen käyttö, ilmoita välittömästi lääkäriillesi tai mene lähimmän sairaalan päivystysosastolle.
- Tämän geelin käytön aikana veren tai virtsan kalsiumpitoisuus voi nousta (yleensä jos liikaa geeliä on käytetty). Korkean kalsiumpitoisuuden oireita ovat liiallinen virtsaneritys, ummetus, lihassheikkous, sekavuus ja kooma. Tämä voi olla vakavaa ja sinun tulee ilmoittaa asiasta välittömästi lääkäriillesi. Kun hoito lopetetaan , normalisoituu kalsiumpitoisuus itsestään kalsiumpitoisuus Vähemmän.

Vähemmän vakava sivuvaikutukset

Seuraavat vähemmän vakavat sivuvaikutukset on raportoitu tästä lääkkeestä. Yleinen (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä):

- Kutina.

Joskus (esiintyy alle 1:llä 100:sta käyttäjästä):Ärsytys

- silmissä Polttava tunne
- iholla tunne ei voida kääntää ilman kontekstia iho
- Ärtynyt tai kivulias iho
- Karvatuppien tulehdus tai turvotus (follikuliitti)
- Ihottuma ja ihotulehdus (dermatiitti)
- Ihon punoitus, joka johtuu verisuonten laajenemisesta (eryteema)
- Akne (nuoruusiän finnit)
- Kuiva iho
- Ihottuma
- Pustulaarinen ihottuma
- Ihotulehdus.

Harvoin (esiintyy alle 1 käyttäjällä 1000:sta):

- Allergiset reaktiot
- Ihonsisäiset venytysjuovat (striat)
- Ihon hilseily
- Psoriaasin paheneminen hoidon lopettamisen jälkeen (rebound-ilmiö).

Tuntematon (ei voida määrittää saatavilla olevien tietojen perusteella)

- Valkoisten tai harmaiden hiusten tilapäinen värjäytyminen kellertäväksi antoaminen Sumea
- näkö Vähemmän vakavia haittavaikutuksia, jotka johtuvat erityisesti pitkäaikaisesta käytöstä

betametasoni ilmoita lääkärillesi tai sairaanhoitajallesi mahdollisimman pian jos nämä ilmenevät. Oheneminen

- tapahtuu tulla ihon iho
- Laajentuneiden verisuonten tai ihon venymääripien esiintyminen
- Muutos hiusten kasvussa
- Punainen ihottuma suun ympärillä (perioraalinen dermatiitti)
- Ihottuma, johon liittyy tulehdus tai turvotus (allerginen kosketusihottuma)
- Kultaisen väriset, geelillä täytetyt näppylät (kolloidinen milia)
- Ihon vaaleneminen (depigmentaatio)
- Karvatupen tulehdus tai turvotus (follikuliitti).

Vähemmän vakavia haittavaikutuksia, jotka johtuvat kalsipotrioli ovat seuraavat.

- Kuiva iho
- Ihon herkkyys valolle, mikä johtaa ihottumaan.
- Ekseema
- Kutina
- Ihoärsytys
- Polttava ja pistävä tunne
- Ihon punoitus pienten verisuonten laajenemisen vuoksi (eryteema)
- Ihottuma
- Ihottuma ihon tulehduksen kanssa (dermatiitti)
- Psoriaasin paheneminen.

Haittavaikutusten ilmoittaminen haittavaikutuksista sivuvaikutukset

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Alankomaiden Haittavaikutuskeskukseen , verkkosivustowww.fimea.fi www.lareb.nl. Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. MITEN SÄILYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

- Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvissä.
- Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy pullosta EXP-kohdan jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.
- Älä säilytä jääkaapissa. Säilytä pullo ulkopakkauksessa valolta suojattuna.

- Pullo on hävitettävä 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä avaamisesta.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekkariltasi, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti eivätkä päädy ympäristöön.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

Tämän lääkkeen vaikuttavat aineet ovat: kalsipotrioli ja betametasoni.

Yksi gramma geeliä sisältää 50 mikrogrammaa kalsipotriolia (kuten monohydraatti) ja 0,5 mg betametasonia (kuten dipropionaatti).

De andere stoffen in dit middel zijn:

- vloeibare paraffine
- polyoxypropyleenstearylether
- gehydrogeneerde ricinusolie
- butylhydroxytolueen (E321)
- all-rac- α -tokoferoli.

Miltä Dovobet näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

Dovobet on lähes läpinäkyvä, väritön tai vaalean kermanvärinen geeli, joka on pakattu suuritiheysisiin polyeteenipulloihin, joissa on matalatiheyksinen polyeteenikärki ja suuritiheysinen polyeteenikierrekorkki. Pullot ovat pahvipakkauksessa.

Pakkauskoot: 15 g, 30 g, 60 g, 80 g, 2 x 60 g, 2 x 80 g ja 3 x 60 g.

Kaikkia mainittuja pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija on:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Tanska.

Valmistajat ovat:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Tanska

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)

285 Cashel Road
Dublin 12
Irlanti.

Lisätietoja tästä lääkkeestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntiluvan haltijan edustajaan.

LEO Pharma B.V.

Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam
Puh: (020) 510 41 41
Faksi: (020) 510 41 42
sähköposti: leo-pharma.nl@leo-pharma.com

Myyntiluvan numero: RVG 100401

Tämä lääke on rekisteröity EEA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Daivobet®: Bulgaria, Tanska, Saksa, Viro, Suomi, Ranska, Unkari, Kroatia, Latvia, Liettua, Norja, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Espanja, Tšekki, Islanti, Ruotsi
Dovobet®: Belgia, Kypros, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty elokuussa 2022.

Yksityiskohtaiset tiedot tästä lääkkeestä ovat saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivustolla.

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Dovobet 50 mikrogrammaa/0,5 mg/g geeli

kalsipotrioli/betametasoni

Applikaattori

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samat oireet kuin sinulla.

Onko sinulla jokin kohta 4 mainituista haittavaikutuksista? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Sisältö tästä pakkausselosteesta Mitä

1. Dovobet on ja mihin sitä käytetään? Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?
2. Kuinka käytät tätä lääkettä?
3. Mahdolliset
4. haittavaikutukset Miten säilytät tätä lääkettä?
5. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ DOVOBET ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Tätä lääkettä käytetään aikuisten päänahan psoriaasin paikalliseen hoitoon ja lievän tai keskivaikean läiskäpsoriaasin (psoriasis vulgaris) hoitoon muualla kehossa aikuisilla. Psoriaasi johtuu siitä, että ihosolut lisääntyvät liian nopeasti. Tämä aiheuttaa ihon punoitusta, hilseilyä ja paksuuntumista.

Tämä lääke sisältää kalsipotriolia ja betametasonia. Kalsipotrioli auttaa normalisoimaan ihosolujen kasvunopeutta ja betametasoni toimii tulehdusta ehkäisevästi.

2. MILLOIN ET SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ LÄÄKETTÄ TAI MILLOIN SINUN TULEE OLLA ERITYISEN VAROVAINEN?

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löydät kohdasta 6. jos sinulla on ongelmia kalsiumtasojen kanssa kehossasi (kysy lääkäriltäsi)
jos sinulla on tiettyjä psoriaasin muotoja, kuten psoriaasi erythrodermia, eksfoliatiivinen psoriaasi ja psoriaasi pustulosa (kysy lääkäriltäsi).

Tämä lääke sisältää voimakkaasti vaikuttavaa kortikosteroidia (lisämunuaishormonia), joten ÄLÄ käytä sitä iholla, joka on vaurioitunut:

- ihoinfektiot aiheuttamat virukset (esimerkiksi herpes tai vesirokko)
- ihoinfektiot aiheuttamat sienet (esimerkiksi jalkasieni tai silsa)
- ihoinfektiot aiheuttamat bakteerit ihoinfektiot
- aiheuttamat loiset (esimerkiksi syyhy) tuberkuloosi (TB) peri
- oraalinen-oraalinen ohut
- ohut iho, hauraat suonet, ihon venytysmerkit
- iktiyoosi (kuiva iho, jossa on kalansuomuja)
- akne (nuoruusiän finnit)
- ruusufinni (vakava punoitus tai kasvojen ihon punoitus)
- haavaumat tai ihovauriot.

Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi, sairaanhoitajaasi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä ja käytön aikana, kun:

- sinä muita lääkkeitä, jotka sisältävät lisämunuaiskuoren hormoneja (kortikosteroideja), koska niistä voi aiheutua sivuvaikutuksia
- sinä olet käyttänyt tätä lääkettä pitkään ja suunnittelet lopettamista (koska on olemassa riski, että psoriasis pahenee tai palaa, kun steroidien käyttö lopetetaan äkillisesti)
- sinä sinulla on diabetes mellitus (sokeritauti), koska verensokeri/glukoositasosi voi vaikuttaa steroidi
- tulee ihotulehdus ilmenee, koska hoito voi olla tarpeen keskeyttää • jos sinulla on tietynlainen psoriasis, nimeltään psoriasis guttata
- sinä kärsit näön hämärtymisestä tai muista näköongelmista.

Erityiset varoitukset

- Vältä käyttöä yli 30 %:ssa kehostasi ja älä käytä yli 15 grammaa päivässä
- Vältä käyttöä uimalakin, siteiden tai sidosten alla, koska tämä edistää steroidi imeytymistä
- Vältä käyttöä suurilla vaurioituneilla alueilla, limakalvoilla tai ihopoimuissa (nivuset, kainalot, rintojen alla), koska tämä edistää steroidi edistää.
- Vältä käyttöä kasvoilla tai sukuelimissä, koska ne ovat erittäin herkkiä steroideille.
- Vältä liiallista altistumista auringolle, liiallista solariumin käyttöä tai muita valoterapiahoitoja.

•

Lapset

Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö lisäksi Dovobet muita lääkkeitä, oletko tehnyt niin äskettäin tai onko mahdollista, että käytät lähitulevaisuudessa muita lääkkeitä? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä. Jos lääkärisi on hyväksynyt imetyksen, ole varovainen ja älä levitä tätä lääkettä rintoihin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Dovobet sisältää butyylihydroksitolueenia (E321)

Dovobet sisältää butyylihydroksitolueenia (E321). Tämä voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esimerkiksi kosketushottumaa) tai ärsytystä silmissä ja limakalvoilla.

3. KUINKA KÄYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen lääkärisi ohjeiden mukaisesti. Epäiletkö oikeaa käyttöä?

Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Mihin tätä lääkettä tulee levittää: käytä iholle (kutaaneisesti).

Lue käyttöohjeet Dovobet geeliapplikaattorista huolellisesti tämän pakkausselosteen lopusta.

Käyttöohjeista löydät tietoa kokoamisesta, käytöstä, puhdistamisesta ja säilyttämisestä Dovobet geeliapplikaattorin.

Dovobet Dovobet Ohjeet tämän lääkkeen oikeaan käyttöön

Käytä vain psoriaasialueilla, äläkä muilla ihoalueilla, joita psoriaasi ei ole vaurioittanut.

Levitä tämä lääke vaurioituneelle iholle Applikaattorilla ja hiero sitä varovasti, kunnes psoriaasialue on kokonaan peitetty ohuella geelikerroksella.

Älä sido, peitä tiukasti tai kääri käsiteltyä aluetta.

Pese kätesi huolellisesti lääkkeen levittämisen jälkeen, jos geeliä on joutunut sormillesi. Tämä estää geelin joutumisen vahingossa muille kehon osille (erityisesti kasvoille, suuhun ja silmiin).

Sinun ei tarvitse olla huolissasi, jos hieman geeliä joutuu vahingossa psoriaasialueiden ulkopuolelle terveelle iholle, mutta pyyhi se pois, jos geeli leviää liian laajalle.

Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi suositellaan, ettei kylvetä tai suihkussa käydä heti lääkkeen levittämisen jälkeen.

Vältä geelin levittämisen jälkeen kosketusta aineiden kanssa, jotka ovat herkkiä rasvatahoille (esimerkiksi silkki).

Vältä geelin levittämisen jälkeen kosketusta aineiden kanssa, jotka ovat herkkiä rasvatahoille (esimerkiksi silkki).

Ei ole tarpeen pestä hiuksia ennen tämän valmisteen levittämistä. hiuksia.

Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi on suositeltavaa olla pesemättä hiuksia heti tämän valmisteen levittämisen jälkeen. Anna valmisteen vaikuttaa päivän tai yön ajan. Kun peset hiukset geelin levittämisen jälkeen, voit ottaa huomioon seuraavat ohjeet:

1. Levitä mietoa shampooa kuiviin hiuksiin, erityisesti niille alueille, joille geeliä on levitetty.
2. Anna shampooon vaikuttaa muutaman minuutin ajan päänahassa ennen huuhtelua.
3. Pese hiukset kuten tavallisesti.

Tarvittaessa voit toistaa vaiheet 1-3 yksi tai kaksi kertaa.

Hoidon kesto

Käytä geeliä kerran päivässä. Saattaa olla mukavampaa käyttää geeliä illalla.

Tavallinen alkuhoitajakso on 4 viikkoa päänahan hoitoon ja 8 viikkoa psoriasiksen hoitoon muualla kehossa.

Lääkärisi voi päättää muuttaa hoitajaksoa.

Lääkärisi voi päättää jatkohoidosta.

Älä käytä enempää kuin 15 g päivässä. Tämä tarkoittaa, että yhden 60 gramman geeliapplikaattorin tulisi riittää vähintään 4 päiväksi.

1 g - 4 g päivässä on yleensä riittävä määrä päänahan hoitoon.

Jos käytät myös muita kalsipotriolia sisältäviä tuotteita, ei kalsipotriolia sisältävien tuotteiden kokonaiskäyttö saa ylittää 15 grammaa päivässä. Hoidettava alue ei saa olla suurempi kuin 30 % kehon kokonaispinta-alasta. Yksi pumppaus annostelee 0,05 g tätä valmistetta.

Mitä voin odottaa, kun käytän tätä valmistetta?

Useimmat potilaat näkevät selkeän tuloksen 2 viikon jälkeen, vaikka psoriasis ei olisikaan vielä hävinnyt.

Oletko käyttänyt liikaa tätä valmistetta?

Kysy neuvoa lääkäritäsi jos olet käyttänyt yli 15 grammaa päivässä.

Liiallinen käyttö tätä valmistetta voi aiheuttaa myös ongelmia veren kalsiumin kanssa, mikä yleensä normalisoituu, kun hoito lopetetaan.

Lääkärisi saattaa joutua tekemään verikokeen tarkistaakseen, onko liiallinen geelin käyttö aiheuttanut ongelmia veren kalsiumin kanssa.

Liiallinen pitkäaikainen käyttö voi myös aiheuttaa, että lisämunuaiset eivät enää toimi kunnolla (lisämunuaiset sijaitsevat munuaisten lähellä ja ne tuottavat hormoneja).

Oletko unohtanut käyttää tätä valmistetta?

Älä ota kaksinkertaista annosta unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Jos lopetat tämän valmisteen käytön

Tämän lääkkeen käyttö on lopetettava lääkärisi ohjeiden mukaan. Saattaa olla tarpeen lopettaa tämän lääkkeen käyttö vähitellen, erityisesti jos olet käyttänyt sitä pitkän aikaa.

•
Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia , vaikka kaikki eivät niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Ota välittömästi tai mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriisi tai hoitajaasi jos jokin seuraavista haittavaikutuksista ilmenee. Saattaa olla tarpeen lopettaa hoito. Seuraavat vakavat haittavaikutukset on raportoitu tälle lääkkeelle Joskus (esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta):

Psoriaasin paheneminen. Ilmoita lääkärillesi välittömästi jos psoriaasi pahenee.

Jotkut vakavat haittavaikutukset johtuvat betametasonista (voimakas steroidi), ja yksi tämän lääkkeen ainesosista. Sinun on ilmoitettava lääkärillesi mahdollisimman pian jos yksi näistä vakavista haittavaikutuksista ilmenee. Nämä haittavaikutukset esiintyvät pääasiassa pitkäaikaisen käytön jälkeen, käytettäessä ihopoimuissa (nivuset, kainalot, rintojen alla), käytettäessä sulkevan sidoksen alla tai käytettäessä laajoilla ihoalueilla.

Seuraavat haittavaikutukset:

Lisämunuaisten toimintahäiriö. Oireita ovat väsymys, masennus ja ahdistus.

Harmaakaihi (oireita ovat näön hämärtyminen, hämäräsokeus ja valonarkuus) tai kohonnut silmänpaine (oireita ovat silmäkipu, punainen silmä, heikentynyt tai hämärtynyt näkö).

Infektiot (koska immuunijärjestelmä, joka taistelee infektioita vastaan, on tukahdutettu tai heikentynyt).

- Pustulaarinen psoriasis (punainen ihoalue, jossa on kellertäviä näppyliöitä, esiintyy yleensä käsissä tai jaloissa). Jos huomaat tämän haittavaikutuksen, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ilmoita asiasta lääkärillesi mahdollisimman pian.
Vaikutus diabetes mellituksen hallintaan (jos sinulla on diabetes, verensokeritasosi voivat vaihdella).

Vakavat haittavaikutukset aiheutettu kalsipotriolilla

Allergiset reaktiot, joihin liittyy huomattavaa kasvojen tai muiden kehon osien, kuten käsien tai jalkojen, turvotusta. Suun/kurkun turvotus ja hengitysvaikeudet voivat esiintyä. Jos sinulla on allerginen reaktio, lopeta tämän lääkkeen käyttö, ilmoita asiasta välittömästi lääkärillesi tai mene lähimmän sairaalan ensiapuosastolle. Tämän geelin käytön aikana veren tai virtsan kalsiumpitoisuus voi nousta (yleensä jos liikaa geeliä on käytetty). Korkean kalsiumpitoisuuden oireita ovat liiallinen virtsaneritys, ummetus, lihasheikkous, sekavuus ja kooma. Tämä voi olla vakavaa ja sinun tulee ilmoittaa asiasta välittömästi lääkärillesi. Kun hoito lopetetaan normalisoituu kalsiumtaso normalisoi Vähemmän vakavat sivuvaikutukset.

Vähemmän Kutina sivuvaikutukset

Joskus (esiintyy alle 1:llä 100:sta käyttäjästä):

Ärsytys

Kutina.

Joskus (esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta):

Ärsytys ei voida kääntää ilman kontekstia silmät

Polttava tunne iholla iho

Ärtynyt tai kivulias iho

Karvatuppien tulehdus tai turvotus (follikuliitti)

Ihottuma ja ihotulehdus (dermatiitti)

Ihon punoitus, joka johtuu verisuonten laajenemisesta (eryteema)

Akne (nuoruusiän finnit)

Kuiva iho

Ihottuma

Pustulaarinen ihottuma

Ihoinfektio.

Harvoin (esiintyy alle 1:llä 1000 käyttäjästä):

Allergiset reaktiot

Ihonsisäiset venytysjuovat (striat)

Ihon hilseily

Psoriaasin paheneminen hoidon lopettamisen jälkeen (rebound-ilmiö).

Tuntematon (ei voida määrittää saatavilla olevien tietojen perusteella)

Valkoisten tai harmaiden hiusten tilapäinen värjäytyminen kellertäväksi levityskohdassa, kun lääkettä käytetään päänahassa.

Sumea näkö

Vähemmän vakavat haittavaikutukset, jotka johtuvat erityisesti pitkäaikaisesta käytöstä betametasoni ovat seuraavat. Ilmoita lääkärillesi tai hoitajallesi mahdollisimman pian jos nämä ilmenevät.

Oheneminen ihon kohdalla iho

- Laajentuneiden verisuonten tai ihon venymisjälkien esiintyminen
Muutos karvankasvussa Karvankasvussa
Punainen ihottuma suun ympärillä (peri-oraalinen dermatiitti)
Ihottuma, johon liittyy tulehdus tai turvotus (allerginen kosketusihottuma)
Kultaist, geelillä täytetyt näppylät (kolloidinen milialhon vaaleneminen (depigmentaatio)
Karvatupen tulehdus tai turvotus (follikuliitti).
Vähemmän vakavat kalsipotriolin aiheuttamat haittavaikutukset ovat seuraavat

Vähemmän vakavia calcipotriolin aiheuttamia sivuvaikutuksia ovat seuraavat

- Kuiva iho
- Ihon herkkyys valolle, mikä johtaa ihottumaan.
- Ekseema
- Kutina
- Ihon ärsytys
- Polttava ja pistävä tunne
- Ihon punoitus pienten verisuonten laajenemisen vuoksi (eryteema)
- Ihottuma
- Ihottuma ihon tulehduksen kanssa (dermatiitti)
- Psoriaasin paheneminen.

Haittavaikutusten ilmoittaminen haittavaikutuksista sivuvaikutukset

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Alankomaiden Haittavaikutuskeskukseen Lareb, verkkosivusto www.lareb.nl. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. MITEN SÄILYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Se löytyy täytteestä EXP:n jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä.

Älä säilytä jääkaapissa.

Applikaattori on kertakäyttöinen. Applikaattori on hävitettävä 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä avaamisesta mahdollisesti jäljellä olevan geelin kanssa.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti eivätkä päädy ympäristöön.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUT TIEDOT

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

Tämän lääkkeen vaikuttavat aineet ovat: kalsipotrioli ja betametasoni.

Yksi gramma geeliä sisältää 50 mikrogrammaa kalsipotriolia (monohydraattina) en 0,5 mg betametasoni (als dipropionaatti).

De andere stoffen in dit middel zijn:
nestemäinen parafiini
polyoksi-propyylistearyylieetteri
hydrogeenattu risiiniöljy
butyylihydroksitolueeni (E321)
all-rac- α - tokoferoli.

Miltä näyttää Dovobet ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?
Dovobet on lähes läpinäkyvä, väritön tai vaalean kermanvärinen geeli polypropeenitäytteessä (korkeatiheyksinen polyeteenimäntä ja kierrekorkki). Täyte ja Applikaattorin pää (polypropeenikuori, polyoksimeteeni kahva ja termoplastinen elastomeerisuutin) kootaan ennen ensimmäistä käyttöä. Polypropeenisuojakorkki on tarkoitettu Applikaattorin säilyttämiseen. Täyte(t), Applikaattorin pää(t) ja suojakorkki(t) on pakattu laatikkoon.

Pakkauskoot: 60 g (vastaa 68 ml) ja 2 x 60 g (vastaa 2 x 68 ml) Kaikkia mainittuja pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija on:

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Pharma
A/S Industriparken 55
Teollisuuspuisto 55
DK-2750 Ballerup
Tanska.

Valmistajat ovat:
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Tanska

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
Irlanti.

Sovelluksen käyttöohjeet löytyvät tämän pakkausselosteen lopusta.

Lisätietoja tästä lääkkeestä saat ottamalla yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan.

LEO Pharma B.V.
Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam
Tel: (020) 510 41 41
Fax: (020) 510 41 42
sähköposti: leo-pharma.nl@leo-pharma.com

•

Myyntiluvan numero: RVG 100401

Tämä lääke on rekisteröity EEA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Daivobet®: Bulgaria, Tanska, Saksa, Viro, Suomi, Ranska, Unkari, Kroatia, Latvia, Liettua, Norja, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Espanja, Tšekki, Islanti, Ruotsi

Dovobet®: Belgia, Kypros, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty elokuussa 2022.

Yksityiskohtaiset tiedot tästä lääkkeestä ovat saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivustolla.

Transtoyou

Käyttöohje Dovobet geeliapplikaattori

Lue pakkausseloste ja tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, vaikka olisit käyttänyt Dovobet geeliä aiemmin.

De Dovobet geeliapplikaattori on suunniteltu levittämään Dovobet geeliä iholle ja/tai päänahkaan, jota psoriasis on vaurioittanut. Käyttämällä Dovobet geeliapplikaattoria voit levittää Dovobet geeliä ilman, että geeliä joutuu sormillesi.

Noudata lääkärin ohjeita psoriasisin hoidossa.

Älä jaa Dovobet geeliapplikaattoria muiden kanssa.

Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa ja näkyviltä.

Sinun Dovobet geeliapplikaattorisi koostuu seuraavista osista

Valmistele Dovobet geeliapplikaattorisi käyttövalmiiksi

A) Tarkista täytteen viimeinen käyttöpäivä Tarkista täytteen etikettiin merkitty viimeinen käyttöpäivä.

Älä käytä, jos vanhentunut.

Täytteen viimeinen käyttöpäivä viittaa kuukauden viimeiseen päivään. Kirjoita päivämäärä, jolloin kokoat applikaattorin, täytteen etikettiin. täytteen etiketissä.

Älä käytä applikaattoria enää 6 kuukauden kuluttua tästä päivämäärästä.

B) Poista täytteen kierrekorkki Pidä täyte pystyasennossa, kierrä korkkia vastapäivään avataksesi.

Vältä täytteen kallistamista, jotta geeli ei läiky.

Hävitä kierrekorkki.

C) Kiinnitä applikaattorin pää tiukasti kiinnitä applikaattorin pää tiukasti kiinni

Applikaattori pystysuoraan. Käännä päätä

Kiertäjä myötäpäivään, kunnes kiertäjän pää on hyvin kiinnittynyt ummetus.

Kuuluu napsahdus, kun se on tiukasti sinetöity.

Huomautus:

Tämän vaiheen jälkeen ei ole enää mahdollista

purkaa Applikaattoria. Jos yrität tehdä niin, Applikaattori voi rikkoutua.

D) Valmistelut ensimmäistä käyttöä varten

Valmistautuminen: varmista, että Applikaattorin pää ja täyte ovat kunnolla kiinnitetty.

Paina varovasti männän keskeltä samalla kun puristat kahvaa, kunnes näet geeliä suuttimessa.

Jos matkustat lentokoneella ja otat kootun

Dovobet Dovobet Jos otat geeliapplikaattorin mukaan, voi olla tarpeen pumpata kahvasta useita kertoja laskeutumisen jälkeen, ennen kuin geeli tulee ulos suuttimesta.

Dovobet levitä geeliä vaurioituneelle iholle

)A Alevitä vaurioituneelle iholle

Pidä applikaattorin kärki lähellä ihoasi ja paina kahvaa kerran tai useammin, riippuen tarvitsemastasi määrästä. Vapauta kahva täysin jokaisen pumppauksen välillä. Näin estät, ettei geeliä tule liian vähän.

Yksi pumppaus tuottaa 0,05 g Dovobet geeliä.

F) Levittymisalustojen käyttö

Jos haluat, voit käyttää erilaisia levittymisalustoja Dovobet geelin hellävaraiseen hieromiseen ihoon.

Varo, ettet paina kahvaa levityksen aikana.

G) Levitys päänahkaan ja hiusrajaan

Ennen levittämistä Dovobet geeli päänahkaan, sinun tulee kammata hiukset poistaaksesi mahdolliset irtonaiset hilseet. Kallista päätäsi estääksesi Dovobet geelin valumisen kasvoillesi. Se voi auttaa tekemään jakauksen hiuksiisi, ennen kuin levität Dovobet geeliä. Etsi hoidettava alue sormillasi ja levitä hiuksiasi.

Aseta suutin suoraan päänahkaan, levitä geeliä ja hiero Dovobet geeli ihoon.

H) Levityksen jälkeen

Tarkista, että kaikki vaurioituneet alueet on voideltu.

Tarvittaessa pyydä jotakuta auttamaan sinua levittämään Dovobet geeliä paikkoihin, joihin et pääse tai näe.

Pese kädet käytön jälkeen, jos sinä tai joku, joka auttaa sinua, on saanut Dovobet geeliä sormilleen. Tämä estää geelin leviämisen vahingossa muihin kehon osiin (erityisesti kasvoihin, suuhun ja silmiin).

Käytön jälkeen

I) Puhdista Dovobet geeliapplikaattori jokaisen käytön jälkeen

Pyyhi applikaattorin pää käytön jälkeen puhtaalla, kuivalla paperilla. Älä purista kahvaa puhdistuksen aikana.

Huomautus:

Älä puhdista applikaattoria vedellä, pesuaineella tai muilla aineilla.

Älä käytä kosteita tai märkiä materiaaleja applikaattorin pyyhkimiseen.

J) Sulje applikaattori

Aseta suojakorkki applikaattoriin jokaisen käytön jälkeen, jotta applikaattorin pää pysyy puhtaana.

Tarkista aina, että suojakorkki napsahtaa paikalleen, jotta Dovobet geeliä ei pääse vuotamaan varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

K) Arvio jäljellä olevasta määrästä Dovobet geeli

Jäljellä olevan määrän arvioimiseksi Dovobet geeliä, katso täytteen pohjasta männän sijainti. Männän nousee, kun geeliä käytetään.

Ennen kuin käytät uudelleen

L) Tarkista viimeinen käyttöpäivä

Tarkista aina ennen käyttöä täytteen etiketistä viimeinen käyttöpäivä. Älä käytä, jos viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt tai 6 kuukautta täytteen avaamisen jälkeen.

Täytteen viimeinen käyttöpäivä viittaa kuukauden viimeiseen päivään.

M) Poista suojakorkki

Poista suojakorkki nostamalla takana olevaa läppää.

Säilytys

Varmista aina, että suojakorkki napsahtaa kiinni estääksesi Dovobet geelin vuotamisen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.

Katso lisätietoja säilytyksestä kohdasta 5, "Miten säilytät tätä lääkettä".

Hävittäminen

Katso tiedot hävittämisestä kohdasta 5, "Kuinka säilytät tätä lääkettä".

Transtoyou