

## Packungsbeilage: Informationen für den Patienten

Duac Once Daily 10 mg/g + 30 mg/g Gel  
Clindamycin + wasserfreies Benzoylperoxid

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es könnte ihnen schaden, auch wenn deren Krankheitszeichen dieselben sind wie Ihre.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Siehe Abschnitt 4

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was DUAC ONCE DAILY GEL ist und wofür es angewendet wird
2. Was Sie vor der Anwendung von DUAC ONCE DAILY GEL wissen müssen
3. Wie ist DUAC ONCE DAILY GEL anzuwenden
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie ist DUAC ONCE DAILY GEL aufzubewahren
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was DUAC ONCE DAILY GEL ist und wofür es angewendet wird

DUAC ONCE DAILY GEL enthält zwei Arzneimittel: Clindamycin und Benzoylperoxid. DUAC ONCE DAILY GEL gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als ‚Anti-Akne-Präparate‘ bekannt sind.

DUAC ONCE DAILY GEL wird zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Akne auf Ihrer Haut verwendet.

Clindamycin ist ein Antibiotikum, das die Vermehrung der an Akne beteiligten Bakterien stoppt.

Benzoylperoxid reduziert Mitesser und weiße Mitesser. Es tötet auch die an Akne beteiligten Bakterien ab.

In DUAC ONCE DAILY GEL zusammen verwendet, wirken diese durch:

- Bekämpfung der Bakterien, die Akne verursachen können
- Behandlung bestehender Mitesser, weiße Mitesser und Pickel
- Verringerung der Anzahl roter, entzündeter Akneflecken

DUAC ONCE DAILY GEL ist für die Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren bestimmt.

### 2. Was Sie vor der Anwendung von DUAC ONCE DAILY GEL wissen müssen

Verwenden Sie DUAC ONCE DAILY GEL nicht:

wenn Sie allergisch gegen Clindamycin, Lincomycin, Benzoylperoxid oder einen der anderen Bestandteile von DUAC ONCE DAILY GEL sind (aufgeführt in Abschnitt 6)

Verwenden Sie DUAC ONCE DAILY GEL nicht, wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie DUAC ONCE DAILY GEL anwenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie DUAC ONCE DAILY GEL anwenden.

Verwenden Sie DUAC ONCE DAILY GEL nur auf Ihrer Haut. Halten Sie es von Bereichen wie Ihren Augen, Lippen, Mund oder der Innenseite Ihrer Nase fern. Verwenden Sie das Gel nicht auf gereizten Hautstellen. Zum Beispiel, wenn Sie Schnitte, Schürfwunden, Sonnenbrand oder verletzte Haut haben.

Wenn Sie DUAC ONCE DAILY GEL versehentlich in Ihre Augen, Ihren Mund oder in die Innenseite Ihrer Nase bekommen, spülen Sie mit viel Wasser.

Verwenden Sie nicht zu viel DUAC ONCE DAILY GEL auf empfindlichen Hautbereichen.

Die meisten Patienten werden in den ersten Wochen der Behandlung eine gewisse Hautrötung und Schälung erleben. Wenn Ihre Haut gereizt wird, müssen Sie möglicherweise ein ölfreies Feuchtigkeitscreme, verwenden Sie DUAC ONCE DAILY GEL seltener oder hören Sie für eine kurze Zeit auf, es zu verwenden, um Ihrer Haut die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, und beginnen Sie dann die Behandlung erneut. Beenden Sie die Behandlung und suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Hautreizung stark ist (starke Rötung, Trockenheit, Juckreiz, Stechen oder Brennen) oder sich nicht bessert.

Versuchen Sie, den Kontakt von DUAC ONCE DAILY GEL mit gefärbten Stoffen, einschließlich Kleidung, Handtüchern, Bettwäsche, Möbeln oder Teppichen, zu vermeiden. DUAC ONCE DAILY GEL kann diese Materialien bleichen.

DUAC ONCE DAILY GEL kann Haare bleichen.

DUAC ONCE DAILY GEL kann Ihre Haut empfindlicher gegenüber den schädlichen Auswirkungen der Sonne machen. Vermeiden Sie die Nutzung von Sonnenbänken/-lampen und minimieren Sie die Zeit, die Sie in der Sonne verbringen. Sie sollten einen Sonnenschutz verwenden und schützende Kleidung tragen, während Sie DUAC ONCE DAILY GEL verwenden.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Medikament verwenden, wenn:

Sie jemals eines der folgenden Darmprobleme hatten: 'regionale Enteritis', 'Colitis ulcerosa', oder 'antibiotikaassoziierte Kolitis'.

Wenn Sie Bauchkrämpfe oder Durchfall entwickeln, der sich nicht bessert oder stark ist, hören Sie auf, DUAC ONCE DAILY GEL zu verwenden, und kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt. Antibiotika können eine Erkrankung verursachen, die zu starkem Durchfall und Bauchkrämpfen führt, obwohl dies bei Antibiotika, die auf die Haut aufgetragen werden, unwahrscheinlich ist.

Wenn Sie kürzlich andere clindamycin- oder erythromycinhaltige Medikamente verwendet haben, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass DUAC ONCE DAILY GEL nicht so gut wirkt, wie es sollte.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie kürzlich andere clindamycin- oder erythromycinhaltige Medikamente verwendet haben.

#### Kinder

Geben Sie dieses Medikament nicht an Kinder unter zwölf Jahren. Es ist nicht bekannt, ob es bei ihnen wirkt oder sicher ist.

#### Andere Medikamente und DUAC ONCE DAILY GEL

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Medikamente verwenden, kürzlich verwendet haben oder verwenden könnten.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden verwenden:  
andere Aknebehandlungen, einschließlich Antibiotika, die auf Ihrer Haut angewendet werden

medizinische oder ‚abrasive‘ Seifen und Reinigungsmittel

Seifen oder Kosmetika, die eine starke austrocknende Wirkung haben

Produkte, die große Mengen Alkohol oder ‚Adstringentien‘ enthalten

Dies liegt daran, dass sie bei gleichzeitiger Anwendung mit DUAC ONCE DAILY GEL Ihre Haut im Laufe der Zeit reizen können.

DUAC ONCE DAILY GEL kann einige Akne-Medikamente weniger wirksam machen, wenn sie gleichzeitig angewendet werden.

Dies umfasst:

Einige Akne-Medikamente, die auf die Haut aufgetragen werden und Tretinoin, Isotretinoin oder Tazaroten enthalten

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie auch eines dieser Medikamente verwenden. Möglicherweise müssen Sie die beiden Produkte zu unterschiedlichen Tageszeiten verwenden (z. B. eines morgens und das andere abends).

Die gleichzeitige Anwendung anderer Akne-Medikamente mit DUAC ONCE DAILY GEL kann das Risiko von Hautreizungen erhöhen.

Beenden Sie die Behandlung und suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Hautreizung stark wird (starke Rötung, Trockenheit, Juckreiz, Stechen oder Brennen).

DUAC ONCE DAILY GEL sollte nicht gleichzeitig mit erythromycinhaltigen Medikamenten verwendet werden.

Die gleichzeitige Anwendung von DUAC ONCE DAILY GEL mit Medikamenten wie Dapson und Sulfacetamid kann vorübergehend Farbe-Veränderung der Haut- oder Gesichtsbehaarung (gelb/orange Farbe). Dies wird nicht dauerhaft sein.

Eines der Medikamente in DUAC ONCE DAILY GEL kann beeinflussen, wie bestimmte allgemeine Anästhesie Medikamente wirken (genannt „neuromuskuläre Blocker“).

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie operiert werden sollen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie DUAC ONCE DAILY GEL verwenden.

#### Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Es gibt nur begrenzte Informationen über die Sicherheit von DUAC ONCE DAILY GEL bei schwangeren Frauen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, denken, dass Sie schwanger sein könnten oder planen, ein Baby zu bekommen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie dieses Medikament verwenden.

Ihr Arzt wird den Nutzen für Sie und das Risiko für Ihr Baby abwägen, wenn Sie DUAC ONCE DAILY GEL während der Schwangerschaft verwenden.

Es ist nicht bekannt, ob die Inhaltsstoffe von DUAC ONCE DAILY GEL in die Muttermilch übergehen können. Eines der Medikamente in DUAC ONCE DAILY GEL ist Clindamycin. Wenn Clindamycin oral oder durch Injektion eingenommen wird, kann es in die Muttermilch übergehen.

Wenn Sie stillen, müssen Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie DUAC ONCE DAILY GEL verwenden.

Verwenden Sie DUAC ONCE DAILY GEL nicht auf Ihrer Brust, wenn Sie stillen.

### 3. Wie man DUAC ONCE DAILY GEL verwendet

Verwenden Sie dieses Medikament immer genau so, wie es Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker gesagt hat. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Verwenden Sie DUAC ONCE DAILY GEL einmal täglich abends.

Es kann 2-5 Wochen dauern, bis Sie die Wirkung von DUAC ONCE DAILY GEL bemerken.

Verwenden Sie es nicht länger als 12 Wochen am Stück. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie lange Ihre Behandlung dauern wird.

### Wie man DUAC ONCE DAILY GEL anwendet

1. Entfernen Sie vollständig jegliches Make-up.
2. Waschen Sie den betroffenen Hautbereich gründlich. Spülen Sie dann mit warmem Wasser ab und tupfen Sie die Haut sanft trocken.
3. Tragen Sie einen dünnen Film des Gels auf den gesamten betroffenen Hautbereich auf, indem Sie Ihre Fingerspitzen verwenden.
4. Tragen Sie es auf alle Hautbereiche auf, die Akne haben, nicht nur auf die einzelnen Stellen. Wenn sich das Gel nicht leicht in Ihre Haut einreiben lässt, verwenden Sie zu viel.  
Für Ihr Gesicht verwenden Sie eine Menge Gel aus der Tube, die von der Fingerspitze bis zum ersten Gelenk reicht (die erste Falte auf Ihrem Finger). Dies ist ein 'Fingerspitze'.  
Für Ihr Gesicht und Ihren Rücken verwenden Sie insgesamt zweieinhalb 'Fingerspitzen'.
5. Wenn Sie viel Trockenheit oder Hautschälung bekommen, können Sie eine ölfreie, parfümfreie, hypoallergene Feuchtigkeitscreme verwenden, DUAC ONCE DAILY GEL seltener anwenden oder die Behandlung für eine kurze Zeit unterbrechen, um Ihrer Haut die Anpassung an die Behandlung zu ermöglichen. Dieses Medikament wirkt möglicherweise nicht richtig, wenn es nicht täglich angewendet wird.
6. Waschen Sie Ihre Hände nach der Anwendung des Gels.
7. Nachdem es getrocknet ist, können Sie ein nicht fettendes Make-up verwenden.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel immer genau so, wie in dieser Packungsbeilage beschrieben oder wie von Ihrem Arzt oder Apotheker verordnet.  
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn Sie mehr DUAC ONCE DAILY GEL angewendet haben, als Sie sollten  
Achten Sie darauf, nicht zu viel aufzutragen. Zu viel Gel aufzutragen oder es häufiger anzuwenden, wird Ihre Hautunreinheiten nicht schneller beseitigen und kann Hautreizungen verursachen. Wenn dies passiert, verwenden Sie das Gel seltener oder setzen Sie es für ein paar Tage ab und beginnen Sie dann erneut.

Wenn Sie DUAC ONCE DAILY GEL versehentlich verschlucken  
Wenn Sie das Gel versehentlich verschlucken, suchen Sie medizinischen Rat. Sie könnten Symptome ähnlich denen bekommen, die auftreten, wenn Sie Antibiotika oral einnehmen (Magenverstimmung).

Wenn Sie vergessen haben, DUAC ONCE DAILY GEL zu verwenden  
Verwenden Sie keine doppelte Dosis, um vergessene Einzeldosen auszugleichen.  
Tragen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit auf.

Hören Sie nicht ohne Rat mit DUAC ONCE DAILY GEL auf  
Verwenden Sie das Gel nicht länger als 12 Wochen am Stück, ohne mit Ihrem Arzt zu sprechen. Verwenden Sie DUAC ONCE DAILY GEL so lange, wie Ihr Arzt es empfiehlt. Hören Sie nicht auf, es sei denn, Ihr Arzt rät Ihnen dazu.

Es ist wichtig, das Gel weiterhin wie von Ihrem Arzt verschrieben zu verwenden. Wenn Sie zu früh aufhören, kann Ihre Akne zurückkehren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Hören Sie auf, DUAC ONCE DAILY GEL zu verwenden, und suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie eine der folgenden schwerwiegenden Nebenwirkungen bemerken – Sie benötigen möglicherweise dringend medizinische Behandlung:

Anzeichen einer allergischen Reaktion (wie Schwellungen im Gesicht, an den Augen, Lippen oder der Zunge, Nesselsucht oder Atembeschwerden, Kollaps)  
schwere oder langanhaltende Durchfall, oder Bauchkrämpfe  
starkes Brennen, Schälen oder Jucken

Andere mögliche Nebenwirkungen:

Wenn Sie eine dieser Nebenwirkungen bemerken, versuchen Sie, DUAC ONCE DAILY GEL seltener zu verwenden, oder hören Sie für ein oder zwei Tage auf und beginnen Sie dann erneut.

Sehr häufige Nebenwirkungen (mindestens 1 von 10 Personen sind betroffen)

An der Anwendungsstelle:

Brennendes Hautgefühl, Schälen, Juckreiz, trockene Haut  
Rötung der Haut, insbesondere in den ersten Wochen der Anwendung

Diese Nebenwirkungen sind im Allgemeinen mild.

Häufige Nebenwirkungen (weniger als 1 von 10 Personen sind betroffen)

Kopfschmerzen

An der Anwendungsstelle:

Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht, Hautschmerzen  
Rote, juckende Haut, Ausschlag (Dermatitis)

Gelegentliche Nebenwirkungen

(weniger als 1 von 100 Personen betroffen)

An der Anwendungsstelle:

Kribbeln (Parästhesie), Verschlechterung der Akne

Andere Nebenwirkungen

Andere Nebenwirkungen sind bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen aufgetreten, aber ihre genaue Häufigkeit ist unbekannt:

Allergische Reaktionen

Entzündung des Darms, Durchfall, einschließlich blutiger Durchfall, Magenschmerzen

An der Applikationsstelle:

Hautreaktionen, Verfärbung der Haut  
Erhebener juckender Ausschlag (Nesselsucht)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies schließt alle möglichen Nebenwirkungen ein, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Yellow Card Scheme unter: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) oder suchen Sie nach MHRA Yellow Card im Google Play oder Apple App Store. Durch die Meldung von Nebenwirkungen können Sie dazu beitragen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels bereitzustellen.

5. Wie DUAC ONCE DAILY GEL aufzubewahren ist

Bewahren Sie dieses Arzneimittel außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern auf.

Apotheker: Im Kühlschrank lagern (2 °C-8 °C). Nicht einfrieren.

Patient: Nachdem Sie DUAC ONCE DAILY GEL von Ihrem Apotheker erhalten haben, lagern Sie es nicht über 25 °C und entsorgen Sie es nach 2 Monaten.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht nach dem Verfallsdatum, das auf der Tube und der Verpackung angegeben ist (nach „Verw.“). Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht über Abwasser oder den Hausmüll. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Arzneimittel entsorgen können, die Sie nicht mehr verwenden. Diese Maßnahmen helfen, die Umwelt zu schützen.

## 6. Packungsinhalt und weitere Informationen

### Was DUAC ONCE DAILY GEL enthält

Die Wirkstoffe sind: Clindamycin und wasserfreies Benzoylperoxid. 1 g Gel enthält 10 mg (1 % w/w) Clindamycin als Clindamycinphosphat und 30 mg (3 % w/w) wasserfreies Benzoylperoxid als wasserhaltiges Benzoylperoxid.

Die sonstigen Bestandteile sind: Carbomer, Dimeticon, Dinatriumlaurylsulfosuccinat, Dinatriumedetat, Glycerol, Silica (kolloidal hydratisiert), Poloxamer 182, gereinigtes Wasser und Natriumhydroxid

### Wie DUAC ONCE DAILY GEL aussieht und Inhalt der Packung

DUAC ONCE DAILY GEL ist ein weißes bis leicht gelb-farbiges Gel und wird in Tuben zu 30 g und 60 g geliefert.

Nicht alle Packungsgrößen werden in den Verkehr gebracht.

### Zulassung Inhaber und Hersteller

#### Marketing Zulassung Inhaber:

GlaxoSmithKline UK Limited,  
79 New Oxford Street  
London  
WC1A 1DG  
Vereinigtes Königreich

#### Hersteller:

Glaxo Operations UK Ltd,  
Harmire Road, Barnard Castle,  
Co. Durham, DL12 8DT, UK

#### Oder

#### GlaxoSmithKline Trading Services

Limited  
12 Riverwalk,  
Citywest Business Campus  
Dublin 24,  
Irland

#### Andere Formate:

Um dieses Informationsblatt in Braille, Großdruck oder Audio zu hören oder anzufordern, rufen Sie bitte kostenlos an:

0800 198 5000 (nur UK)

Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit:

Produktname                      Duac Einmal täglich 10 mg/g + 30 mg/g Gel

Referenznummer                19494/0251

Dies ist ein Service des Royal National Institute of Blind People.

Dieses Informationsblatt wurde zuletzt im März 2025 überarbeitet.

Markenzeichen sind Eigentum der oder lizenziert an die GSK-Unternehmensgruppe.

©2025 GSK-Unternehmensgruppe oder deren Lizenzgeber

Transtoyou