

Prospecto: Información para el paciente

Duac Once Daily 10 mg/g + 30 mg/g Gel  
clindamicina + peróxido de benzoilo anhidro

Lea todo este prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.
- Si tiene alguna pregunta adicional, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento ha sido recetado solo para usted. No lo pase a otras personas. Puede perjudicarlas, incluso si sus síntomas son los mismos que los suyos.
- Si experimenta cualquier efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. Ver sección 4

Contenido de este prospecto:

1. Qué es DUAC ONCE DAILY GEL y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de usar DUAC ONCE DAILY GEL
3. Cómo usar DUAC ONCE DAILY GEL
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacenar DUAC ONCE DAILY GEL
6. Contenido del envase e información adicional

## 1. Qué es DUAC ONCE DAILY GEL y para qué se utiliza

DUAC ONCE DAILY GEL contiene dos medicamentos: clindamicina y peróxido de benzoilo. DUAC ONCE DAILY GEL pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como 'preparados antiacné'.

DUAC ONCE DAILY GEL se utiliza para tratar el acné leve a moderado en la piel.

La clindamicina es un antibiótico que detiene la reproducción de las bacterias involucradas en el acné.

El peróxido de benzoilo reduce los puntos negros y blancos. También mata las bacterias involucradas en el acné.

Usados juntos en DUAC ONCE DAILY GEL, estos actúan:

combatiendo las bacterias que pueden causar acné  
tratando los puntos negros, blancos y granos existentes  
reduciendo el número de granos rojos e inflamados

DUAC ONCE DAILY GEL es para uso en adultos y adolescentes de doce años o más.

## 2. Lo que necesita saber antes de usar DUAC ONCE DAILY GEL

No use DUAC ONCE DAILY GEL:

si es alérgico a la clindamicina, lincomicina, peróxido de benzoilo o a cualquiera de los otros ingredientes de DUAC ONCE DAILY GEL (enumerados en la Sección 6)

No use DUAC ONCE DAILY GEL si alguna de las condiciones anteriores se aplica a usted. Si no está seguro, hable con su médico o farmacéutico antes de comenzar a usar DUAC ONCE DAILY GEL.

#### Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico antes de usar DUAC ONCE DAILY GEL.

Use DUAC ONCE DAILY GEL solo en su piel. Manténgalo alejado de áreas como los ojos, labios, boca o dentro de la nariz.

No use el gel en áreas irritadas de su piel. Por ejemplo, si tiene cortes, rasguños, quemaduras solares o piel rota.

Si accidentalmente entra DUAC ONCE DAILY GEL en sus ojos, boca o dentro de la nariz, enjuague con abundante agua.

No use demasiado DUAC ONCE DAILY GEL en áreas sensibles de la piel.

La mayoría de los pacientes experimentarán algo de enrojecimiento y descamación de la piel durante las primeras semanas de tratamiento. Si su piel se irrita, puede necesitar usar un producto sin aceite. hidratante, use DUAC ONCE DAILY GEL con menos frecuencia, o deje de usarlo por un corto período para permitir que su piel se recupere y luego reinicie el tratamiento.

Suspenda el tratamiento y consulte a su médico si la irritación de la piel es severa (enrojecimiento severo, sequedad, picazón, escozor o ardor) o no mejora.

Trate de no dejar que DUAC ONCE DAILY GEL entre en contacto con coloreadas telas, incluyendo ropa, toallas, ropa de cama, muebles o alfombras. DUAC ONCE DAILY GEL puede decolorar estos materiales.

DUAC ONCE DAILY GEL puede decolorar el cabello.

DUAC ONCE DAILY GEL puede hacer que su piel sea más sensible a los efectos nocivos del sol. Evite el uso de camas solares/lamparas y minimice el tiempo que pasa al sol. Debe usar un protector solar y llevar ropa protectora mientras usa DUAC ONCE DAILY GEL.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento si:

alguna vez ha tenido alguno de los siguientes problemas intestinales: 'enteritis regional', 'colitis ulcerosa', o 'colitis asociada a antibióticos'.

Si desarrolla calambres estomacales o diarrea que no mejora o es severa, deje de usar DUAC ONCE DAILY GEL y contacte a su médico de inmediato. Los antibióticos pueden causar una condición que resulta en diarrea severa y calambres estomacales, aunque es poco probable que esto ocurra con antibióticos aplicados en la piel.

Si ha usado recientemente otros medicamentos que contienen clindamicina o eritromicina, hay una mayor probabilidad de que DUAC ONCE DAILY GEL no funcione tan bien como debería.

Informe a su médico o farmacéutico si ha usado recientemente otros medicamentos que contienen clindamicina o eritromicina.

#### Niños

No administre este medicamento a niños menores de doce años. No se sabe si funciona o si es seguro para ellos.

#### Otros medicamentos y DUAC ONCE DAILY GEL

Informe a su médico o farmacéutico si está usando, ha usado recientemente o podría usar cualquier otro medicamento.

Informe a su médico o farmacéutico si está usando alguno de los siguientes:

cualquier otro tratamiento para el acné, incluidos los antibióticos usados en su piel  
jabones y limpiadores medicados o 'abrasivos'

jabones o cosméticos que tienen un fuerte efecto secante

productos que contienen grandes cantidades de alcohol o 'astringentes'

Esto se debe a que cuando se usan junto con DUAC ONCE DAILY GEL, pueden irritar su piel con el tiempo.

DUAC ONCE DAILY GEL puede hacer que algunos medicamentos para el acné sean menos efectivos cuando se usan al mismo tiempo.

Esto incluye:

Algunos medicamentos para el acné que se aplican en la piel y que contienen tretinoína, isotretinoína o tazaroteno

Informe a su médico o farmacéutico si también está usando uno de estos medicamentos.

Puede que necesite usar los dos productos en diferentes momentos del día (por ejemplo, uno en la mañana y el otro en la noche).

Usar otros medicamentos para el acné al mismo tiempo que DUAC ONCE DAILY GEL puede aumentar el riesgo de irritación de la piel.

Suspenda el tratamiento y consulte a su médico si la irritación de la piel se vuelve severa (enrojecimiento severo, sequedad, picazón, escozor o ardor).

DUAC ONCE DAILY GEL no debe usarse al mismo tiempo que medicamentos que contienen eritromicina.

Aplicar DUAC ONCE DAILY GEL al mismo tiempo que medicamentos como dapsona y sulfacetamida puede causar un efecto temporal color-cambio de color de la piel o del vello facial (amarillo/naranja color). Esto no será permanente.

Uno de los medicamentos en DUAC ONCE DAILY GEL puede afectar cómo funcionan ciertos medicamentos de anestesia general (llamados "agentes bloqueadores neuromusculares").

Informe a su médico o farmacéutico si va a someterse a una cirugía.

Si no está seguro de si alguno de los puntos anteriores se aplica a usted, hable con su médico o farmacéutico antes de usar DUAC ONCE DAILY GEL.

**Embarazo, lactancia y fertilidad**

Hay información limitada sobre la seguridad de DUAC ONCE DAILY GEL en mujeres embarazadas.

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o está planeando tener un bebé, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

Su médico considerará el beneficio para usted y el riesgo para su bebé al usar DUAC ONCE DAILY GEL mientras está embarazada.

No se sabe si los ingredientes de DUAC ONCE DAILY GEL pueden pasar a la leche materna. Uno de los medicamentos en DUAC ONCE DAILY GEL es la clindamicina. Cuando la clindamicina se toma por vía oral o inyección, puede pasar a la leche materna.

Si está amamantando, debe consultar con su médico antes de usar DUAC ONCE DAILY GEL.

No use DUAC ONCE DAILY GEL en su pecho si está amamantando.

### 3. Cómo usar DUAC ONCE DAILY GEL

Use siempre este medicamento exactamente como su médico o farmacéutico le haya indicado. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.

Use DUAC ONCE DAILY GEL una vez al día por la noche.

Puede tardar de 2 a 5 semanas antes de que vea el efecto de DUAC ONCE DAILY GEL.

No lo use por más de 12 semanas a la vez. Su médico le dirá cuánto durará su tratamiento.

#### Cómo aplicar DUAC ONCE DAILY GEL

1. Retire completamente cualquier maquillaje.
2. Lave bien el área afectada de la piel. Luego enjuague con agua tibia y seque suavemente.
3. Aplique una capa delgada de gel en toda el área de piel afectada, usando las yemas de los dedos.
4. Aplique en todas las áreas de su piel que tengan acné, no solo en los granos individuales. Si el gel no se absorbe fácilmente en su piel, está usando demasiado. Para su cara solamente, use una cantidad de gel del tubo que llegue desde la punta de su dedo hasta la primera articulación (el primer pliegue en su dedo). Esto es un 'dedo'. Para su cara y espalda, use dos y medio 'dedos' en total.
5. Si experimenta mucha sequedad o descamación de la piel, puede usar un hidratante sin aceite, sin fragancia, hipoalergénico, use DUAC ONCE DAILY GEL con menos frecuencia o detenga el tratamiento por un corto período, para permitir que su piel se ajuste al tratamiento. Este medicamento puede no funcionar correctamente si no se aplica todos los días.
6. Lávese las manos después de usar el gel.
7. Después de que se haya secado, puede usar un maquillaje no graso.

Use siempre este medicamento exactamente como se describe en este prospecto o como le haya indicado su médico o farmacéutico.

Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.

Si usa más DUAC ONCE DAILY GEL del que debería

Tenga cuidado de no aplicar demasiado. Aplicar demasiado gel o aplicarlo con más frecuencia no ayudará a que sus granos desaparezcan más rápido y puede causar irritación en la piel. Si esto sucede, use el gel con menos frecuencia o deje de usarlo por unos días y luego comience de nuevo.

Si accidentalmente traga DUAC ONCE DAILY GEL

Si accidentalmente traga el gel, busque consejo médico. Puede experimentar síntomas similares a cuando toma antibióticos por vía oral (malestar estomacal).

#### Si olvida usar DUAC ONCE DAILY GEL

No use una dosis doble para compensar las dosis individuales olvidadas.  
Aplique la siguiente dosis a la hora habitual.

#### No deje de usar DUAC ONCE DAILY GEL sin consejo

No use el gel por más de 12 semanas seguidas sin hablar con su médico. Use DUAC ONCE DAILY GEL durante el tiempo que su médico recomiende. No deje de usarlo a menos que su médico se lo indique.

Es importante continuar usando el gel según lo prescrito por su médico. Si deja de usarlo demasiado pronto, su acné puede regresar.

Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

#### 4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de usar DUAC ONCE DAILY GEL y consulte a un médico de inmediato si nota alguno de los siguientes efectos secundarios graves: puede necesitar tratamiento médico urgente:

signos de una reacción alérgica (como hinchazón de la cara, ojos, labios o lengua, urticaria o dificultad para respirar, colapso)  
severo o prolongado diarrea, o calambres abdominales  
ardor severo, descamación o picazón

Otros posibles efectos secundarios:

Si nota alguno de estos efectos secundarios, intente usar DUAC ONCE DAILY GEL con menos frecuencia, o deje de usarlo durante uno o dos días y luego comience de nuevo.

Efectos secundarios muy comunes (al menos 1 de cada 10 personas se ven afectadas)

En el sitio de aplicación:

Sensación de ardor en la piel, descamación, picazón, piel seca  
Enrojecimiento de la piel, especialmente durante las primeras semanas de uso

Estos efectos secundarios son generalmente leves.

Efectos secundarios comunes (menos de 1 de cada 10 personas se ven afectadas)

Dolor de cabeza

En el sitio de aplicación:

Sensibilidad al sol, dolor en la piel  
Piel roja, con picazón, erupción (dermatitis)

Efectos secundarios poco comunes

(menos de 1 de cada 100 personas afectadas)

En el sitio de aplicación:

Hormigueo (parestesia), empeoramiento del acné

Otros efectos secundarios

Otros efectos secundarios han ocurrido en un número muy pequeño de personas, pero su frecuencia exacta es desconocida:

Reacciones alérgicas

Inflamación del intestino, diarrea, incluyendo diarrea con sangre diarrea, dolor de estómago

En el sitio de aplicación:

Reacciones cutáneas, decoloración de la piel

Erupción cutánea elevada y con picazón (urticaria)

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta cualquier efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no listado en este prospecto. También puede informar de efectos secundarios directamente a través del Esquema de Tarjeta Amarilla en:

[www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) o busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store.

Al informar de efectos secundarios usted puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Cómo almacenar DUAC ONCE DAILY GEL

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Farmacéutico: Conservar en un refrigerador (2 °C-8 °C). No congelar.

Paciente: Después de recibir DUAC ONCE DAILY GEL del farmacéutico, no lo almacene a más de 25 °C y deséchelo después de 2 meses.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el tubo y la caja (después de "Exp:"). La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

No tire los medicamentos por el desagüe ni los deseche con los residuos domésticos.

Pregunte a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no utiliza. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase y otra información

### Qué contiene DUAC ONCE DAILY GEL

Las sustancias activas son: clindamicina y peróxido de benzoilo anhidro. 1 g de gel contiene 10 mg (1 % p/p) de clindamicina como fosfato de clindamicina y 30 mg (3 % p/p) de peróxido de benzoilo anhidro como peróxido de benzoilo hidratado.

Los otros ingredientes son: carbómero, dimeticona, sulfosuccinato de lauril disódico, edetato disódico, glicerol, sílice (coloidal hidratada), poloxámero 182, agua purificada e hidróxido de sodio

## Cómo es DUAC ONCE DAILY GEL y contenido del envase

DUAC ONCE DAILY GEL es un gel de color blanco a ligeramente amarillo-coloreado y se suministra en tubos de 30 g y 60 g.

No todos los tamaños de envase pueden estar comercializados

## Comercialización Titular de la Autorización y Fabricante

### Marketing Autorización Titular:

GlaxoSmithKline UK Limited,  
79 New Oxford Street  
Londres  
WC1A 1DG  
Reino Unido

### Fabricante:

Glaxo Operations UK Ltd,  
Harmire Road, Barnard Castle,  
Co. Durham, DL12 8DT, UK

O

GlaxoSmithKline Trading Services  
Limited  
12 Riverwalk,  
Citywest Business Campus  
Dublín 24,  
Irlanda

### Otros formatos:

Para escuchar o solicitar una copia de este folleto en Braille, letra grande o audio, por favor llame, sin cargo:

0800 198 5000 (Solo Reino Unido)

Por favor, esté preparado para dar la siguiente información:

Nombre del producto                      Duac Una vez al día 10 mg/g + 30 mg/g gel

Número de referencia                    19494/0251

Este es un servicio proporcionado por el Instituto Nacional Real de Personas Ciegas.

Este folleto fue revisado por última vez en marzo de 2025.

Las marcas comerciales son propiedad de o están licenciadas al grupo de empresas GSK.  
©2025 grupo de empresas GSK o su licenciante