

Notice : Informations pour le patient

Duac Once Daily 10 mg/g + 30 mg/g Gel
clindamycine + peroxyde de benzoyle anhydre

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Cela pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut tout effet indésirable possible non mentionné dans cette notice. Voir section 4

Contenu de cette notice :

1. Qu'est-ce que DUAC ONCE DAILY GEL et dans quel cas est-il utilisé
2. Ce que vous devez savoir avant d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL
3. Comment utiliser DUAC ONCE DAILY GEL
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver DUAC ONCE DAILY GEL
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que DUAC ONCE DAILY GEL et dans quel cas est-il utilisé

DUAC ONCE DAILY GEL contient deux médicaments : la clindamycine et le peroxyde de benzoyle. DUAC ONCE DAILY GEL appartient à un groupe de médicaments appelés « préparations anti-acné ».

DUAC ONCE DAILY GEL est utilisé pour traiter l'acné légère à modérée sur votre peau.

La clindamycine est un antibiotique qui empêche les bactéries impliquées dans l'acné de se reproduire.

Le peroxyde de benzoyle réduit les points noirs et les points blancs. Il tue également les bactéries impliquées dans l'acné.

Utilisés ensemble dans DUAC ONCE DAILY GEL, ceux-ci agissent en :
combattant les bactéries qui peuvent causer l'acné
traitant les points noirs, points blancs et boutons existants
réduisant le nombre de boutons rouges et enflammés

DUAC ONCE DAILY GEL est destiné aux adultes et adolescents âgés de douze ans ou plus.

2. Ce que vous devez savoir avant d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL

N'utilisez pas DUAC ONCE DAILY GEL :

si vous êtes allergique à la clindamycine, à la lincomycine, au peroxyde de benzoyle ou à l'un des autres ingrédients de DUAC ONCE DAILY GEL (listés à la section 6)

N'utilisez pas DUAC ONCE DAILY GEL si l'une des conditions ci-dessus s'applique à vous. Si vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de commencer à utiliser DUAC ONCE DAILY GEL.

Avertissements et précautions

Parlez à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL.

Utilisez DUAC ONCE DAILY GEL uniquement sur votre peau. Évitez les zones comme vos yeux, lèvres, bouche ou l'intérieur de votre nez.

N'utilisez pas le gel sur des zones irritées de votre peau. Par exemple, si vous avez des coupures, éraflures, coups de soleil ou peau abîmée.

Si vous mettez accidentellement DUAC ONCE DAILY GEL dans vos yeux, votre bouche ou à l'intérieur de votre nez, rincez abondamment à l'eau.

N'utilisez pas trop de DUAC ONCE DAILY GEL sur les zones sensibles de la peau. La plupart des patients ressentiront une rougeur de la peau et une desquamation au cours des premières semaines de traitement. Si votre peau devient irritée, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un produit sans huile hydratant, utilisez DUAC ONCE DAILY GEL moins souvent, ou arrêtez de l'utiliser pendant une courte période pour permettre à votre peau de récupérer, puis recommencez le traitement.

Arrêtez le traitement et consultez votre médecin si l'irritation de la peau est sévère (rougeur sévère, sécheresse, démangeaisons, picotements ou brûlures) ou ne s'améliore pas.

Essayez de ne pas laisser DUAC ONCE DAILY GEL entrer en contact avec colorés tissus, y compris les vêtements, serviettes, draps, meubles ou moquettes. DUAC ONCE DAILY GEL peut décolorer ces matériaux.

DUAC ONCE DAILY GEL peut décolorer les cheveux.

DUAC ONCE DAILY GEL peut rendre votre peau plus sensible aux effets nocifs du soleil. Évitez l'utilisation de lits/lampe solaires et minimisez le temps passé au soleil. Vous devriez utiliser un écran solaire et porter des vêtements de protection pendant l'utilisation de DUAC ONCE DAILY GEL.

Consultez votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament si :

vous avez déjà eu l'un des problèmes intestinaux suivants : 'entérite régionale', 'colite ulcéreuse', ou 'colite associée aux antibiotiques'.

Si vous développez des crampes d'estomac ou diarrhée qui ne s'améliore pas ou est sévère, arrêtez d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL et contactez immédiatement votre médecin. Les antibiotiques peuvent causer une condition qui entraîne une diarrhée et des crampes d'estomac bien que cela soit peu probable avec les antibiotiques appliqués sur la peau.

Si vous avez récemment utilisé d'autres médicaments contenant de la clindamycine ou de l'érythromycine, il y a un risque accru que DUAC ONCE DAILY GEL ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous avez récemment utilisé d'autres médicaments contenant de la clindamycine ou de l'érythromycine.

Enfants

Ne donnez pas ce médicament aux enfants de moins de douze ans. On ne sait pas s'il est efficace ou sûr pour eux.

Autres médicaments et DUAC ONCE DAILY GEL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser d'autres médicaments.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez l'un des éléments suivants :

- tout autre traitement de l'acné, y compris les antibiotiques utilisés sur votre peau
- savons et nettoyants médicamenteux ou 'abrasifs'
- savons ou cosmétiques ayant un fort effet desséchant
- produits contenant de grandes quantités d'alcool ou 'astringents'

C'est parce que lorsqu'ils sont utilisés avec DUAC ONCE DAILY GEL, ils peuvent irriter votre peau avec le temps.

DUAC ONCE DAILY GEL peut rendre certains médicaments contre l'acné moins efficaces lorsqu'ils sont utilisés en même temps.

Cela inclut :

- Certains médicaments contre l'acné appliqués sur la peau contenant du trétinoïne, de l'isotrétinoïne ou du tazarotène

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez également l'un de ces médicaments. Vous devrez peut-être utiliser les deux produits à des moments différents de la journée (par exemple, l'un le matin et l'autre le soir).

Utiliser d'autres médicaments contre l'acné en même temps que DUAC ONCE DAILY GEL peut augmenter le risque d'irritation cutanée.

Arrêtez le traitement et consultez votre médecin si l'irritation cutanée devient sévère (rougeur sévère, sécheresse, démangeaisons, picotements ou brûlures).

DUAC ONCE DAILY GEL ne doit pas être utilisé en même temps que des médicaments contenant de l'érythromycine.

Appliquer DUAC ONCE DAILY GEL en même temps que des médicaments tels que la dapsonne et la sulfacétamide peut provoquer un effet temporaire couleur-changement de la peau ou des poils du visage (jaune/orange couleur). Cela ne sera pas permanent. Un des médicaments dans DUAC ONCE DAILY GEL peut affecter le fonctionnement de certains médicaments d'anesthésie générale (appelés « agents bloquants neuromusculaires »).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous allez subir une intervention chirurgicale.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une des situations ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL.

Grossesse, allaitement et fertilité

Il n'y a que des informations limitées sur la sécurité de DUAC ONCE DAILY GEL chez les femmes enceintes.

Si vous êtes enceinte ou allaitez, pensez être enceinte ou envisagez d'avoir un bébé, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Votre médecin considérera le bénéfice pour vous et le risque pour votre bébé de l'utilisation de DUAC ONCE DAILY GEL pendant votre grossesse.

On ne sait pas si les ingrédients de DUAC ONCE DAILY GEL peuvent passer dans le lait maternel. Un des médicaments dans DUAC ONCE DAILY GEL est la clindamycine. Lorsque la clindamycine est prise par voie orale ou par injection, elle peut passer dans le lait maternel.

Si vous allaitez, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL.

N'utilisez pas DUAC ONCE DAILY GEL sur votre sein si vous allaitez.

3. Comment utiliser DUAC ONCE DAILY GEL

Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a indiqué. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

Utilisez DUAC ONCE DAILY GEL une fois par jour le soir.

Il peut falloir 2 à 5 semaines avant de voir l'effet de DUAC ONCE DAILY GEL.

Ne pas utiliser pendant plus de 12 semaines d'affilée. Votre médecin vous indiquera la durée de votre traitement.

Comment appliquer DUAC ONCE DAILY GEL

1. Enlevez complètement tout maquillage.
2. Lavez bien la zone de peau affectée. Puis rincez à l'eau tiède et séchez doucement en tapotant.
3. Appliquez une fine couche de gel sur toute la zone de peau affectée, en utilisant le bout de vos doigts.
4. Appliquez sur toutes les zones de votre peau qui ont de l'acné, pas seulement sur les boutons individuels. Si le gel ne s'étale pas facilement sur votre peau, vous en utilisez trop.
Pour votre visage uniquement, utilisez une quantité de gel du tube qui s'étend de la pointe de votre doigt à la première articulation (le premier pli de votre doigt). C'est un 'bout de doigt'.
Pour votre visage et votre dos, utilisez deux et demi 'bouts de doigt' au total.
5. Si vous avez beaucoup de sécheresse ou de desquamation de la peau, vous pouvez utiliser un hydratantsans huile, sans parfum, hypoallergénique, utilisez DUAC ONCE DAILY GEL moins fréquemment ou arrêtez le traitement pendant une courte période, pour permettre à votre peau de s'adapter au traitement. Ce médicament peut ne pas fonctionner correctement s'il n'est pas appliqué tous les jours.
6. Lavez-vous les mains après avoir utilisé le gel.
7. Après qu'il ait séché, vous pouvez utiliser un maquillage non gras.

Utilisez toujours ce médicament exactement comme décrit dans cette notice ou selon les indications de votre médecin ou pharmacien.

Consultez votre médecin ou pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

Si vous utilisez plus de DUAC ONCE DAILY GEL que vous ne devriez

Veillez à ne pas en appliquer trop. Appliquer trop de gel ou l'appliquer plus fréquemment n'aidera pas vos boutons à disparaître plus rapidement et peut provoquer

une irritation de la peau. Si cela se produit, utilisez le gel moins souvent ou arrêtez de l'utiliser pendant quelques jours, puis recommencez.

Si vous avalez accidentellement DUAC ONCE DAILY GEL

Si vous avalez accidentellement le gel, consultez un médecin. Vous pourriez ressentir des symptômes similaires à ceux que vous ressentez lorsque vous prenez des antibiotiques par voie orale (maux d'estomac).

Si vous oubliez d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL

Ne prenez pas de dose double pour compenser les doses individuelles oubliées. Appliquez la dose suivante à l'heure habituelle.

Ne cessez pas DUAC ONCE DAILY GEL sans avis

N'utilisez pas le gel pendant plus de 12 semaines d'affilée sans en parler à votre médecin. Utilisez DUAC ONCE DAILY GEL aussi longtemps que votre médecin le recommande. Ne cessez pas à moins que votre médecin ne vous le conseille.

Il est important de continuer à utiliser le gel comme prescrit par votre médecin. Si vous arrêtez trop tôt, votre acné peut revenir.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre médecin ou pharmacien.

4. Effets indésirables possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Arrêtez d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants – vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent :

signes d'une réaction allergique (tels que gonflement du visage, des yeux, des lèvres ou de la langue, urticaire ou difficulté à respirer, effondrement)
sévère ou prolongée diarrhée, ou crampes abdominales
brûlure sévère, desquamation ou démangeaisons

Autres effets secondaires possibles :

Si vous remarquez l'un de ces effets secondaires, essayez d'utiliser DUAC ONCE DAILY GEL moins souvent, ou arrêtez de l'utiliser pendant un ou deux jours, puis recommencez.

Effets secondaires très fréquents (au moins 1 personne sur 10 est affectée)

Au site d'application :

Sensation de brûlure de la peau, desquamation, démangeaisons, peau sèche
Rougeur de votre peau, surtout pendant les premières semaines d'utilisation

Ces effets secondaires sont généralement légers.

Effets secondaires fréquents (moins de 1 personne sur 10 est affectée)

Maux de tête

Au site d'application :

- Sensibilité au soleil, douleur cutanée
- Peau rouge, qui démange, éruption cutanée (dermatite)

Effets secondaires peu fréquents
(moins de 1 personne sur 100 est affectée)

Au site d'application :

- Picotements (paresthésie), aggravation de l'acné

Autres effets secondaires

D'autres effets secondaires ont été observés chez un très petit nombre de personnes, mais leur fréquence exacte est inconnue :

- Réactions allergiques
- Inflammation de l'intestin, diarrhée, y compris la diarrhée sanglante diarrhée, douleurs à l'estomac

Au site d'application :

- Réactions cutanées, décoloration de la peau
- Éruption cutanée prurigineuse (urticaire)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Cela inclut tout effet secondaire possible non mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets secondaires directement via le système de carte jaune à : www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez MHRA Yellow Card dans le Google Play ou l'Apple App Store. En signalant les effets secondaires vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver DUAC ONCE DAILY GEL

Conservez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Pharmacien : Conserver au réfrigérateur (2 °C-8 °C). Ne pas congeler.

Patient : Après avoir reçu DUAC ONCE DAILY GEL de votre pharmacien, ne le conservez pas à une température supérieure à 25 °C et jetez-le après 2 mois.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur le tube et la boîte (après « Exp: »). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament dans les eaux usées ou les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient DUAC ONCE DAILY GEL

Les substances actives sont : la clindamycine et le peroxyde de benzoyle hydraté. 1 g de gel contient 10 mg (1 % p/p) de clindamycine sous forme de phosphate de clindamycine et 30 mg (3 % p/p) de peroxyde de benzoyle anhydre sous forme de peroxyde de benzoyle hydraté.

Les autres ingrédients sont : carbomère, diméticone, sulfosuccinate de lauryle disodique, édétate disodique, glycérol, silice (colloïdale hydratée), poloxamère 182, eau purifiée et hydroxyde de sodium

Aspect de DUAC ONCE DAILY GEL et contenu de l'emballage

DUAC ONCE DAILY GEL est un gel de couleur blanche à légèrement jaune-coloré et est fourni en tubes de 30 g et 60 g.

Tous les formats d'emballage ne sont pas forcément commercialisés

Commercialisation Autorisation Titulaire et Fabricant

Marketing Autorisation Titulaire :

GlaxoSmithKline UK Limited,

79 New Oxford Street

Londres

WC1A 1DG

Royaume-Uni

Fabricant :

Glaxo Operations UK Ltd,

Harmire Road, Barnard Castle,

Co. Durham, DL12 8DT, UK

Ou

GlaxoSmithKline Trading Services

Limited

12 Riverwalk,

Citywest Business Campus

Dublin 24,

Irlande

Autres formats :

Pour écouter ou demander une copie de cette notice en braille, en gros caractères ou en audio, veuillez appeler gratuitement :

0800 198 5000 (Royaume-Uni uniquement)

Veillez être prêt à fournir les informations suivantes :

Nom du produit Duac Une fois par jour 10 mg/g + 30 mg/g gel

Numéro de référence 19494/0251

Ce service est fourni par l'Institut Royal National des Aveugles.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en mars 2025.

Les marques commerciales sont détenues par ou sous licence au groupe de sociétés GSK.
©2025 groupe de sociétés GSK ou son licencié

Transtoyou