

## Bijsluiter: Informatie voor de patiënt

Duac Once Daily 10 mg/g + 30 mg/g Gel  
clindamycine + watervrij benzoylperoxide

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel, want het bevat belangrijke informatie voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Als u nog vragen heeft, vraag het uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun ziekteverschijnselen dezelfde zijn als de uwe.
- Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4

Wat er in deze bijsluiter staat:

1. Wat DUAC ONCE DAILY GEL is en waarvoor het wordt gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u DUAC ONCE DAILY GEL gebruikt
3. Hoe u DUAC ONCE DAILY GEL moet gebruiken
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u DUAC ONCE DAILY GEL
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### 1. Wat DUAC ONCE DAILY GEL is en waarvoor het wordt gebruikt

DUAC ONCE DAILY GEL bevat twee geneesmiddelen: clindamycine en benzoylperoxide. DUAC ONCE DAILY GEL behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staan als 'anti-acne preparaten'.

DUAC ONCE DAILY GEL wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matige acne op uw huid.

Clindamycine is een antibioticum dat voorkomt dat de bacteriën die bij acne betrokken zijn zich vermenigvuldigen.

Benzoylperoxide vermindert mee-eters en puistjes. Het doodt ook de bacteriën die bij acne betrokken zijn.

Samen gebruikt in DUAC ONCE DAILY GEL, werken deze door:

- het bestrijden van de bacteriën die acne kunnen veroorzaken
- het behandelen van bestaande mee-eters, puistjes en vlekken
- het verminderen van het aantal rode, ontstoken acneplekken

DUAC ONCE DAILY GEL is bedoeld voor gebruik door volwassenen en adolescenten van twaalf jaar of ouder.

### 2. Wat u moet weten voordat u DUAC ONCE DAILY GEL gebruikt

Gebruik DUAC ONCE DAILY GEL niet:

als u allergisch bent voor clindamycine, lincomycine, benzoylperoxide of een van de andere ingrediënten van DUAC ONCE DAILY GEL (vermeld in rubriek 6)

Gebruik DUAC ONCE DAILY GEL niet als een van de bovenstaande op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u DUAC ONCE DAILY GEL gaat gebruiken.

#### Waarschuwingen en voorzorgen

Praat met uw arts of apotheker voordat u DUAC ONCE DAILY GEL gebruikt.

Gebruik DUAC ONCE DAILY GEL alleen op uw huid. Houd het uit de buurt van gebieden zoals uw ogen, lippen, mond of binnenkant van uw neus.

Gebruik de gel niet op geïrriteerde delen van uw huid. Bijvoorbeeld als u snijwonden, schaafwonden, zonnebrand of een beschadigde huid heeft.

Als u per ongeluk DUAC ONCE DAILY GEL in uw ogen, mond of binnenkant van uw neus krijgt, spoel dan met veel water.

Gebruik niet te veel DUAC ONCE DAILY GEL op gevoelige delen van de huid.

De meeste patiënten zullen tijdens de eerste weken van de behandeling enige roodheid en schilfering van de huid ervaren. Als uw huid geïrriteerd raakt, moet u mogelijk een olievrije moisturiser, gebruik DUAC ONCE DAILY GEL minder vaak, of stop met het gebruik voor een korte periode om uw huid te laten herstellen en start daarna de behandeling opnieuw.

Stop de behandeling en raadpleeg uw arts als huidirritatie ernstig is (ernstige roodheid, droogheid, jeuk, prikkeling of branderigheid) of niet verbetert.

Probeer te voorkomen dat DUAC ONCE DAILY GEL in contact komt met gekleurde stoffen, waaronder kleding, handdoeken, beddengoed, meubels of tapijten. DUAC ONCE DAILY GEL kan deze materialen bleken.

DUAC ONCE DAILY GEL kan haar bleken.

DUAC ONCE DAILY GEL kan uw huid gevoeliger maken voor de schadelijke effecten van de zon. Vermijd het gebruik van zonnebanken/lamps en minimaliseer de tijd die u in de zon doorbrengt. U dient een zonnebrandcrème te gebruiken en beschermende kleding te dragen tijdens het gebruik van DUAC ONCE DAILY GEL.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt als:

u ooit een van de volgende darmproblemen heeft gehad: 'regionale enteritis', 'colitis ulcerosa', of 'antibioticum-geassocieerde colitis'.

Als u buikpijn of diarree ontwikkelt die niet verbetert of ernstig is, stop dan met het gebruik van DUAC ONCE DAILY GEL en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Antibiotica kunnen een aandoening veroorzaken die resulteert in ernstige diarree en buikpijn, hoewel dit onwaarschijnlijk is bij antibiotica die op de huid worden aangebracht.

Als u recent andere geneesmiddelen met clindamycine of erytromycine heeft gebruikt, is er een verhoogde kans dat DUAC ONCE DAILY GEL niet zo goed werkt als zou moeten.

Vertel uw arts of apotheker als u recent andere geneesmiddelen met clindamycine of erytromycine heeft gebruikt.

#### Kinderen

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan twaalf jaar. Het is niet bekend of het werkt of veilig is voor hen.

## Andere geneesmiddelen en DUAC ONCE DAILY GEL

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, recent heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken.

Vertel uw arts of apotheker als u een van de volgende gebruikt:

- andere acnebehandelingen, inclusief antibiotica die op uw huid worden gebruikt
- medische of 'schurende' zepen en reinigingsmiddelen
- zepen of cosmetica die een sterk uitdrogend effect hebben
- producten die grote hoeveelheden alcohol of 'adstringentia' bevatten

Dit komt omdat ze, wanneer ze samen met DUAC ONCE DAILY GEL worden gebruikt, na verloop van tijd uw huid kunnen irriteren.

DUAC ONCE DAILY GEL kan sommige acne-medicijnen minder effectief maken wanneer ze tegelijkertijd worden gebruikt.

Dit omvat:

- Sommige acne-medicijnen die op de huid worden aangebracht en tretinoïne, isotretinoïne of tazaroteen bevatten

Vertel uw arts of apotheker als u ook een van deze geneesmiddelen gebruikt. U moet de twee producten mogelijk op verschillende tijdstippen van de dag gebruiken (bijv. één in de ochtend en de andere in de avond).

Het gelijktijdig gebruik van andere acne-medicijnen met DUAC ONCE DAILY GEL kan het risico op huidirritatie verhogen.

Stop de behandeling en raadpleeg uw arts als huidirritatie ernstig wordt (ernstige roodheid, droogheid, jeuk, prikkeling of branderigheid).

DUAC ONCE DAILY GEL mag niet gelijktijdig worden gebruikt met geneesmiddelen die erytromycine bevatten.

Het aanbrengen van DUAC ONCE DAILY GEL tegelijkertijd met geneesmiddelen zoals dapson en sulfacetamide kan een tijdelijke kleur-verandering van huid of gezichtshaar (geel/oranje kleur). Dit zal niet permanent zijn.

Een van de medicijnen in DUAC ONCE DAILY GEL kan beïnvloeden hoe bepaalde algemene anesthesie medicijnen werken (genoemd "neuromusculaire blokkerende middelen").

Vertel uw arts of apotheker als u een operatie moet ondergaan.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u DUAC ONCE DAILY GEL gebruikt.

## Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Er is slechts beperkte informatie over de veiligheid van DUAC ONCE DAILY GEL bij zwangere vrouwen.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bent een baby te krijgen, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit medicijn gebruikt.

Uw arts zal de voordelen voor u en het risico voor uw baby van het gebruik van DUAC ONCE DAILY GEL tijdens de zwangerschap overwegen.

Het is niet bekend of de ingrediënten van DUAC ONCE DAILY GEL in de moedermelk terecht kunnen komen. Een van de medicijnen in DUAC ONCE DAILY GEL is clindamycine. Wanneer clindamycine oraal of via injectie wordt ingenomen, kan het in de moedermelk terechtkomen.

Als u borstvoeding geeft, moet u uw arts raadplegen voordat u DUAC ONCE DAILY GEL gebruikt.

Gebruik DUAC ONCE DAILY GEL niet op uw borst als u borstvoeding geeft.

### 3. Hoe DUAC ONCE DAILY GEL te gebruiken

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

Gebruik DUAC ONCE DAILY GEL eenmaal per dag in de avond.  
Het kan 2-5 weken duren voordat u het effect van DUAC ONCE DAILY GEL ziet.  
Gebruik het niet langer dan 12 weken achter elkaar. Uw arts zal u vertellen hoe lang uw behandeling zal duren.

#### Hoe DUAC ONCE DAILY GEL aan te brengen

1. Verwijder alle make-up volledig.
2. Was het aangetaste huidgebied goed. Spoel daarna af met warm water en dep voorzichtig droog.
3. Breng een dunne laag gel aan op het gehele aangetaste huidgebied, met behulp van uw vingertoppen.
4. Breng aan op alle delen van uw huid die acne hebben, niet alleen op de individuele plekken. Als de gel niet gemakkelijk in uw huid wrijft, gebruikt u te veel.  
Voor alleen uw gezicht, gebruik een hoeveelheid gel uit de tube die reikt van de top van uw vinger tot het eerste gewricht (de eerste plooi op uw vinger). Dit is een 'vingertop'.  
Voor uw gezicht en rug, gebruik in totaal twee en een halve 'vingertoppen'.
5. Als u veel droogheid of schilfering van de huid krijgt, kunt u een olievrije, geurvrije, hypoallergene moisturizergebruiken, gebruik DUAC ONCE DAILY GEL minder vaak of stop de behandeling voor een korte periode, om uw huid de kans te geven zich aan te passen aan de behandeling. Dit medicijn werkt mogelijk niet goed als het niet elke dag wordt aangebracht.
6. Was uw handen na het gebruik van de gel.
7. Nadat het is opgedroogd, kunt u een niet-vette make-up gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u heeft verteld.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

Als u meer DUAC ONCE DAILY GEL gebruikt dan u zou moeten

Let erop dat u niet te veel aanbrengt. Te veel gel aanbrengen of het vaker aanbrengen zal uw puistjes niet sneller laten verdwijnen en kan huidirritatie veroorzaken. Als dit gebeurt, gebruik de gel dan minder vaak of stop een paar dagen en begin dan opnieuw.

Als u per ongeluk DUAC ONCE DAILY GEL inslikt

Als u de gel per ongeluk inslikt, zoek dan medisch advies. U kunt symptomen krijgen die vergelijkbaar zijn met het innemen van antibiotica via de mond (een maagklachten).

Als u vergeet DUAC ONCE DAILY GEL te gebruiken

Gebruik geen dubbele dosis om vergeten doses in te halen.

Breng de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip aan.

Stop niet met DUAC ONCE DAILY GEL zonder advies

Gebruik de gel niet langer dan 12 weken achtereen zonder met uw arts te overleggen. Gebruik DUAC ONCE DAILY GEL zo lang als uw arts aanbeveelt. Stop niet tenzij uw arts u dat adviseert.

Het is belangrijk om de gel te blijven gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts. Als u te vroeg stopt, kan uw acne terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

#### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze krijgt.

Stop met het gebruik van DUAC ONCE DAILY GEL en raadpleeg onmiddellijk een arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt – u heeft mogelijk dringende medische behandeling nodig:

tekenen van een allergische reactie (zoals zwelling van uw gezicht, ogen, lippen of tong, netelroos of ademhalingsmoeilijkheden, instorting)  
ernstige of langdurige diarree, of buikpijn  
ernstige branderigheid, schilfering of jeuk

Andere mogelijke bijwerkingen:

Als u een van deze bijwerkingen opmerkt, probeer DUAC ONCE DAILY GEL minder vaak te gebruiken, of stop het gebruik voor een of twee dagen en begin dan opnieuw.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (minstens 1 op de 10 mensen wordt getroffen)

Op de plaats van aanbrengen:

Brandend gevoel van de huid, schilfering, jeuk, droge huid

Roodheid van uw huid, vooral tijdens de eerste weken van gebruik

Deze bijwerkingen zijn over het algemeen mild.

Vaak voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10 mensen wordt getroffen)

Hoofdpijn

Op de plaats van aanbrengen:

Gevoeligheid voor zonlicht, huidpijn

Rode, jeukende huid, uitslag (dermatitis)

Ongebruikelijke bijwerkingen  
(minder dan 1 op de 100 mensen getroffen)

Op de plaats van aanbrengen:  
Tintelingen (paresthesie), verergering van acne

Andere bijwerkingen  
Andere bijwerkingen zijn bij een zeer klein aantal mensen opgetreden, maar hun exacte frequentie is onbekend:

Allergische reacties  
Ontsteking van de darm, diarree, inclusief bloederige diarree, buikpijn

Op de plaats van toepassing:  
Huidreacties, verkleuring van de huid  
Jeukende verheven uitslag (netelroos)

Melden van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit omvat eventuele bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Yellow Card Scheme op:

[www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store. Door bijwerkingen te melden kunt u helpen meer informatie te verschaffen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. Hoe bewaart u DUAC ONCE DAILY GEL

Bewaar dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Apotheker: Bewaar in een koelkast (2 °C-8 °C). Niet invriezen.

Patiënt: Nadat u DUAC ONCE DAILY GEL van de apotheker heeft ontvangen, bewaar het niet boven 25 °C en gooi het na 2 maanden weg.

Gebruik dit geneesmiddel niet na de vervaldatum die staat vermeld op de tube en doos (na "Exp:"). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Gooi geen geneesmiddelen weg via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u geneesmiddelen weggooit die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat DUAC ONCE DAILY GEL bevat

De werkzame stoffen zijn: clindamycine en watervrij benzoylperoxide. 1 g gel bevat 10 mg (1 % w/w) clindamycine als clindamycinefosfaat en 30 mg (3 % w/w) watervrij benzoylperoxide als watervrij benzoylperoxide.

De andere ingrediënten zijn: carbomeer, dimeticon, dinatriumlaurylsulfosuccinaat, dinatriumedetaat, glycerol, silica (colloïdaal gehydrateerd), poloxameer 182, gezuiverd water en natriumhydroxide

Hoe DUAC ONCE DAILY GEL eruitziet en inhoud van de verpakking

DUAC ONCE DAILY GEL is een wit tot lichtgeel-gekleurde gel en wordt geleverd in tubes van 30 g en 60 g.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Marketing Vergunninghouder en Fabrikant

Marketing Vergunning Houder:  
GlaxoSmithKline UK Limited,  
79 New Oxford Street  
Londen  
WC1A 1DG  
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:  
Glaxo Operations UK Ltd,  
Harmire Road, Barnard Castle,  
Co. Durham, DL12 8DT, UK

Of

GlaxoSmithKline Trading Services  
Limited  
12 Riverwalk,  
Citywest Business Campus  
Dublin 24,  
Ierland

Andere formaten:

Om naar deze bijsluiter te luisteren of een exemplaar in braille, grootletterdruk of audio aan te vragen, bel gratis:

0800 198 5000 (alleen VK)

Houd de volgende informatie bij de hand:

Productnaam                      Duac Once Daily 10 mg/g + 30 mg/g gel

Referentienummer              19494/0251

Dit is een dienst van het Royal National Institute of Blind People.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2025.

Handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de GSK-groep van bedrijven.  
©2025 GSK-groep van bedrijven of zijn licentiegever

Transtoyou