

Bipacksedel: Information till patienten

Duac Once Daily 10 mg/g + 30 mg/g Gel
klindamycin + vattenfri bensoylperoxid

Läs hela denna bipacksedel noggrant innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om deras symtom är desamma som dina.
- Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

Vad denna bipacksedel innehåller:

1. Vad DUAC ONCE DAILY GEL är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder DUAC ONCE DAILY GEL
3. Hur du använder DUAC ONCE DAILY GEL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur DUAC ONCE DAILY GEL ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad DUAC ONCE DAILY GEL är och vad det används för

DUAC ONCE DAILY GEL innehåller två läkemedel: klindamycin och bensoylperoxid. DUAC ONCE DAILY GEL tillhör en grupp läkemedel som kallas 'anti-aknepreparat'.

DUAC ONCE DAILY GEL används för att behandla mild till måttlig akne på din hud.

Klindamycin är ett antibiotikum som stoppar bakterierna involverade i akne från att föröka sig.

Bensoylperoxid minskar pormaskar och vita pormaskar. Det dödar också bakterierna involverade i akne.

Används tillsammans i DUAC ONCE DAILY GEL, dessa verkar genom att:

- bekämpa bakterierna som kan orsaka akne
- behandla befintliga pormaskar, vita pormaskar och finnar
- minska antalet röda, inflammerade aknefläckar

DUAC ONCE DAILY GEL är för användning av vuxna och ungdomar från tolv år och uppåt.

2. Vad du behöver veta innan du använder DUAC ONCE DAILY GEL

Använd inte DUAC ONCE DAILY GEL:

- om du är allergisk mot klindamycin, linkomycin, bensoylperoxid eller något av de andra ingredienserna i DUAC ONCE DAILY GEL (listade i avsnitt 6)

Använd inte DUAC ONCE DAILY GEL om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda DUAC ONCE DAILY GEL.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder DUAC ONCE DAILY GEL.

Använd endast DUAC ONCE DAILY GEL på din hud. Håll det borta från områden som dina ögon, läppar, mun eller insidan av din näsa.

Använd inte gelen på några irriterade områden av din hud. Till exempel, om du har skärsår, skrubbsår, solbränna eller skadad hud.

Om du av misstag får DUAC ONCE DAILY GEL i dina ögon, mun eller insidan av din näsa, skölj med mycket vatten.

Använd inte för mycket DUAC ONCE DAILY GEL på känsliga hudområden.

De flesta patienter kommer att uppleva viss hudrodnad och fjällning under de första veckorna av behandlingen. Om din hud blir irriterad kan du behöva använda en oljefri fuktkräm, använd DUAC ONCE DAILY GEL mindre ofta, eller sluta använda det under en kort period för att låta huden återhämta sig och börja sedan behandlingen igen. Avbryt behandlingen och kontakta din läkare om hudirritationen är allvarlig (kraftig rodnad, torrhet, klåda, sveda eller brännande känsla) eller inte förbättras.

Försök att inte låta DUAC ONCE DAILY GEL komma i kontakt med färgade tyger, inklusive kläder, handdukar, sängkläder, möbler eller mattor. DUAC ONCE DAILY GEL kan bleka dessa material.

DUAC ONCE DAILY GEL kan bleka hår.

DUAC ONCE DAILY GEL kan göra din hud mer känslig för solens skadliga effekter.

Undvik användning av solarium/sollampor och minimera den tid du spenderar i solen.

Du bör använda solskyddsmedel och bära skyddande kläder medan du använder DUAC ONCE DAILY GEL.

Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om:

du någonsin har haft något av följande tarmproblem: 'regional enterit', 'ulcerös kolit', eller 'antibiotika-associerad kolit'.

Om du utvecklar magkramper eller diarré som inte förbättras eller är allvarlig, sluta använda DUAC ONCE DAILY GEL och kontakta din läkare omedelbart. Antibiotika kan orsaka ett tillstånd som resulterar i svår diarré och magkramper även om detta är osannolikt att hända med antibiotika applicerade på huden.

Om du nyligen har använt andra läkemedel som innehåller klindamycin eller erytromycin, finns det en ökad risk att DUAC ONCE DAILY GEL inte fungerar så bra som det borde.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du nyligen har använt några andra läkemedel som innehåller klindamycin eller erytromycin.

Barn

Ge inte detta läkemedel till barn under tolv år. Det är inte känt om det fungerar eller om det är säkert för dem.

Andra läkemedel och DUAC ONCE DAILY GEL

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan komma att använda andra läkemedel.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande:

andra aknebehandlingar inklusive antibiotika som används på huden
medicinska eller 'abrasiva' tvålar och rengöringsmedel
tvålar eller kosmetika som har en starkt uttorkande effekt
produkter som innehåller stora mängder alkohol eller 'sammandragande medel'

Detta beror på att när de används tillsammans med DUAC ONCE DAILY GEL kan de irritera din hud över tid.

DUAC ONCE DAILY GEL kan göra vissa akneläkemedel mindre effektiva när de används samtidigt.

Detta inkluderar:

Vissa akneläkemedel som appliceras på huden och som innehåller tretinoin, isotretinoin eller tazaroten

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du också använder något av dessa läkemedel. Du kan behöva använda de två produkterna vid olika tidpunkter på dagen (t.ex. en på morgonen och den andra på kvällen).

Att använda andra akneläkemedel samtidigt som DUAC ONCE DAILY GEL kan öka risken för hudirritation.

Avbryt behandlingen och kontakta din läkare om hudirritationen blir allvarlig (kraftig rodnad, torrhet, klåda, sveda eller brännande känsla).

DUAC ONCE DAILY GEL bör inte användas samtidigt som läkemedel som innehåller erytromycin.

Att applicera DUAC ONCE DAILY GEL samtidigt som läkemedel som dapsone och sulfacetamid kan orsaka en tillfällig färg-förändring av hud eller ansiktshår (gul/orange färg). Detta kommer inte att vara permanent.

En av medicinerna i DUAC ONCE DAILY GEL kan påverka hur vissa allmänna anestesimediciner fungerar (kallas "neuromuskulära blockerande medel").

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du ska genomgå en operation.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, prata med din läkare eller apotekspersonal innan du använder DUAC ONCE DAILY GEL.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns endast begränsad information om säkerheten för DUAC ONCE DAILY GEL hos gravida kvinnor.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du använder denna medicin.

Din läkare kommer att överväga nyttan för dig och risken för ditt barn med att använda DUAC ONCE DAILY GEL medan du är gravid.

Det är inte känt om ingredienserna i DUAC ONCE DAILY GEL kan passera över i bröstmjolk. En av medicinerna i DUAC ONCE DAILY GEL är klindamycin. När klindamycin tas oralt eller genom injektion kan det passera över i bröstmjolk.

Om du ammar måste du kontrollera med din läkare innan du använder DUAC ONCE DAILY GEL.

Använd inte DUAC ONCE DAILY GEL på ditt bröst om du ammar.

3. Hur du använder DUAC ONCE DAILY GEL

Använd alltid denna medicin exakt som din läkare eller apotekspersonal har sagt till dig. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd DUAC ONCE DAILY GEL en gång om dagen på kvällen.
Det kan ta 2-5 veckor innan du ser effekten av DUAC ONCE DAILY GEL.
Använd inte mer än 12 veckor i taget. Din läkare kommer att tala om hur länge din behandling ska pågå.

Hur man applicerar DUAC ONCE DAILY GEL

1. Ta bort all smink helt.
2. Tvätta det drabbade hudområdet noggrant. Skölj sedan med varmt vatten och klappa försiktigt torrt.
3. Applicera ett tunt lager gel på hela det drabbade hudområdet med hjälp av fingertopparna.
4. Applicera på alla områden av din hud som har akne, inte bara på de enskilda finnarna. Om gelen inte gnids in i huden lätt, använder du för mycket. För endast ansiktet, använd en mängd gel från tuben som når från fingertoppen till första leden (det första vecket på fingret). Detta är en 'fingertopp'. För ansikte och rygg, använd totalt två och en halv 'fingertopp'.
5. Om du får mycket torrhet eller hudflagning, kan du använda en oljefri, doftfri, hypoallergen fuktighetskräm, använd DUAC ONCE DAILY GEL mindre ofta eller avbryt behandlingen en kort period, för att låta huden anpassa sig till behandlingen. Detta läkemedel kanske inte fungerar ordentligt om det inte appliceras varje dag.
6. Tvätta händerna efter att du använt gelen.
7. När det har torkat kan du använda en icke-fet smink.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt vad din läkare eller apotekspersonal har sagt till dig. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du använder mer DUAC ONCE DAILY GEL än du borde

Var noga med att inte applicera för mycket. Att applicera för mycket gel eller att applicera det oftare kommer inte att hjälpa dina finnar att försvinna snabbare, och kan orsaka hudirritation. Om detta händer, använd gelen mindre ofta, eller sluta använda den i några dagar och börja sedan igen.

Om du av misstag sväljer DUAC ONCE DAILY GEL

Om du av misstag sväljer gelen, sök medicinsk rådgivning. Du kan få symptom som liknar de när du tar antibiotika via munnen (en orolig mage).

Om du glömmer att använda DUAC ONCE DAILY GEL

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömda enskilda doser. Applicera nästa dos vid den vanliga tiden.

Sluta inte med DUAC ONCE DAILY GEL utan råd

Använd inte gelen i mer än 12 veckor åt gången utan att prata med din läkare. Använd DUAC ONCE DAILY GEL så länge din läkare rekommenderar. Sluta inte om inte din läkare råder dig att göra det.

Det är viktigt att fortsätta använda gelen enligt din läkares ordination. Om du slutar för tidigt kan din akne återkomma.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

Sluta använda DUAC ONCE DAILY GEL och kontakta en läkare omedelbart om du märker något av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling:

- tecken på en allergisk reaktion (såsom svullnad i ansikte, ögon, läppar eller tunga, nässelutslag eller andningssvårigheter, kollaps)
- allvarlig eller långvarig diarré, eller buksmärter
- svår brännande känsla, fjällning eller klåda

Andra möjliga biverkningar:

Om du märker någon av dessa biverkningar, försök använda DUAC ONCE DAILY GEL mer sällan, eller sluta använda den i en eller två dagar och börja sedan igen.

Mycket vanliga biverkningar (minst 1 av 10 personer påverkas)

På applikationsstället:

- Brännande känsla i huden, fjällning, klåda, torr hud
- Rodnad i huden, särskilt under de första veckorna av användning

Dessa biverkningar är generellt milda.

Vanliga biverkningar (mindre än 1 av 10 personer påverkas)

- Huvudvärk

På applikationsstället:

- Känslighet för solljus, smärta i huden
- Röd, kliande hud, utslag (dermatit)

Mindre vanliga biverkningar

(mindre än 1 av 100 personer påverkas)

På applikationsstället:

- Stickningar (parestesi), försämring av akne

Andra biverkningar

Andra biverkningar har inträffat hos ett mycket litet antal personer men deras exakta frekvens är okänd:

- Allergiska reaktioner

Inflammation i tarmen, diarré, inklusive blodig diarré, magsmärta

På applikationsstället:

Hudreaktioner, missfärgning av huden
Upphöjd kliande utslag (nässelfeber)

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme på:

www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten för denna medicin.

5. Hur du förvarar DUAC ONCE DAILY GEL

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Apotekare: Förvara i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.

Patient: Efter att du har fått DUAC ONCE DAILY GEL från apoteket, förvara det inte över 25 °C och kassera efter 2 månader.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på tuben och kartongen (efter "Exp:"). Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Kasta inte bort några läkemedel via avlopp eller hushållsavfall. Fråga din apotekare hur du ska kasta bort läkemedel du inte längre använder. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övrig information

Vad DUAC ONCE DAILY GEL innehåller

De aktiva substanserna är: klindamycin och vattenfri bensoylperoxid. 1 g gel innehåller 10 mg (1 % w/w) klindamycin som klindamycinfosfat och 30 mg (3 % w/w) vattenfri bensoylperoxid som vattenfri bensoylperoxid.

De övriga ingredienserna är: karbomer, dimetikon, dinatriumlaurylsulfosuccinat, dinatriumedetat, glycerol, kiseldioxid (kolloidal hydratiserad), poloxamer 182, renat vatten och natriumhydroxid

Hur DUAC ONCE DAILY GEL ser ut och förpackningens innehåll

DUAC ONCE DAILY GEL är en vit till svagt gul-färgad gel och levereras i tuber om 30 g och 60 g.

Alla förpackningsstorlekar kanske inte marknadsförs

Marknadsföring Godkännande Innehavare och Tillverkare

Marknadsföring Godkännande Innehavare:
GlaxoSmithKline UK Limited,
79 New Oxford Street
London
WC1A 1DG
Storbritannien

Tillverkare:
Glaxo Operations UK Ltd,
Harmire Road, Barnard Castle,
Co. Durham, DL12 8DT, UK

Eller

GlaxoSmithKline Trading Services
Limited
12 Riverwalk,
Citywest Business Campus
Dublin 24,
Irland

Andra format:
För att lyssna på eller begära en kopia av denna broschyr i punktskrift, stor stil eller ljud,
vänligen ring gratis:

0800 198 5000 (endast Storbritannien)

Var redo att ge följande information:

Produktnamn Duac Once Daily 10 mg/g + 30 mg/g gel

Referensnummer 19494/0251

Detta är en tjänst som tillhandahålls av Royal National Institute of Blind People.

Denna broschyr reviderades senast i mars 2025.

Varumärken ägs av eller är licensierade till GSK-koncernen.
©2025 GSK-koncernen eller dess licensgivare