

Notice : information pour le patient

Duac Gel pour l'acné 10 mg/g + 50 mg/g, gel
clindamycine + peroxyde de benzoyle anhydre

Lisez attentivement toute la notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Avez-vous des questions ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, car il vous a été prescrit uniquement. Cela pourrait être nocif pour d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous.
- Ressentez-vous un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4 ? Ou ressentez-vous un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Duac Gel pour l'acné et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quand ne pas utiliser ce médicament ou quand être particulièrement prudent ?
3. Comment utiliser ce médicament ?
4. Effets indésirables possibles
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Duac Gel pour l'acné et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament contient deux substances : la clindamycine et le peroxyde de benzoyle. Ce médicament appartient au groupe des médicaments connus sous le nom d'anti-acnéiques. Il est utilisé pour le traitement de l'acné légère à modérément sévère de la peau.

La clindamycine est un antibiotique qui empêche les bactéries impliquées dans l'acné de se reproduire.

Le peroxyde de benzoyle réduit les points noirs (comédons ouverts et fermés). Il tue également les bactéries impliquées dans l'acné.

Utilisés ensemble dans ce médicament, ils agissent en :

combattant les bactéries pouvant causer l'acné
traitant les comédons ouverts, les comédons fermés et les lésions d'acné existantes
réduisant le nombre de lésions d'acné rouges et enflammées

Duac Gel pour l'Acné est destiné à être utilisé par les adultes et les adolescents âgés de douze ans ou plus.

2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?

Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ?

vous êtes allergique à la clindamycine, à la lincomycine, au peroxyde de benzoyle ou à l'un des autres composants de ce médicament. Vous trouverez ces substances à la rubrique 6.

N'utilisez pas ce médicament si ce qui précède s'applique à vous. Si vous n'êtes pas sûr, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer à utiliser ce médicament.

Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament ?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Utilisez ce médicament uniquement sur votre peau. Ne l'utilisez pas près de vos yeux, lèvres, bouche ou à l'intérieur de votre nez.

N'utilisez pas ce médicament sur des surfaces cutanées irritées. Par exemple, si vous avez des coupures, des éraflures, un coup de soleil ou une peau endommagée.

Si ce médicament entre accidentellement en contact avec vos yeux, votre bouche ou l'intérieur de votre nez, rincez abondamment à l'eau.

N'utilisez pas trop de ce médicament sur les surfaces sensibles de la peau.

Chez la plupart des patients, la peau présentera une certaine rougeur et des desquamations au cours des premières semaines de traitement. Si votre peau devient irritée, vous devrez peut-être utiliser une crème hydratante sans huile, utiliser ce médicament moins souvent ou arrêter temporairement son utilisation pour permettre à votre peau de se rétablir, puis reprendre le traitement.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si l'irritation cutanée est sévère (rougeur intense, sécheresse, démangeaisons, sensation de piqûre ou de brûlure) ou ne s'améliore pas.

Essayez d'éviter que ce produit entre en contact avec des textiles colorés tels que vêtements, serviettes, literie, meubles ou moquettes. Ce produit peut décolorer ces matériaux.

Ce produit peut décolorer les cheveux.

Ce produit peut rendre votre peau plus sensible aux effets nocifs du soleil. Évitez l'utilisation de bancs solaires/lampes et réduisez au minimum le temps passé au soleil. Utilisez un écran solaire et portez des vêtements protecteurs lorsque vous utilisez ce produit.

Contactez votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce produit dans les cas suivants :

Vous avez déjà eu l'un des problèmes intestinaux suivants : inflammation locale de la muqueuse intestinale (entérite régionale), inflammation du côlon avec fièvre et ulcération (colite ulcéreuse) ou inflammation du côlon (colite) causée par l'utilisation d'antibiotiques. Vous avez des crampes abdominales ou une diarrhée qui ne s'améliorent pas ou qui sont sévères. Dans ce cas, vous devez immédiatement arrêter d'utiliser ce produit et contacter votre médecin. Les antibiotiques peuvent provoquer une affection entraînant une diarrhée sévère et des crampes abdominales. Cependant, il est peu probable que cela se produise si les antibiotiques sont appliqués sur la peau.

Vous avez récemment utilisé d'autres médicaments contenant de la clindamycine ou de l'érythromycine. Il y a alors une plus grande chance que ce produit ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous avez récemment utilisé d'autres médicaments contenant de la clindamycine ou de l'érythromycine.

Enfants

Ne donnez pas ce produit aux enfants de moins de douze ans. On ne sait pas s'il est efficace ou sûr dans cette tranche d'âge.

Utilisez-vous d'autres médicaments ?

Utilisez-vous d'autres médicaments en plus de Duac Gel pour l'acné ou l'avez-vous fait récemment ou est-il possible que vous utilisiez d'autres médicaments dans un avenir proche ? Informez-en alors votre médecin ou pharmacien.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez ce qui suit :

- tout autre traitement de l'acné, y compris l'utilisation d'antibiotiques sur votre peau
- savons médicaux ou savons et nettoyants abrasifs
- savons ou cosmétiques ayant un effet fortement desséchant
- produits contenant une grande quantité d'alcool ou ayant un effet astringent sur la peau.

Ceci parce que lorsqu'ils sont utilisés en même temps que ce produit, ils peuvent provoquer une irritation de la peau. Si vous n'êtes pas sûr que ce qui précède s'applique à vous, contactez votre médecin ou pharmacien avant de l'utiliser.

Duac Gel pour l'acné peut rendre certains médicaments contre l'acné moins efficaces s'ils sont utilisés simultanément. Cela concerne :

Certains médicaments contre l'acné appliqués sur la peau contiennent de la trétinoïne, de l'isotrétinoïne ou du tazarotène.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez également l'un de ces médicaments. Il se peut que vous deviez appliquer les deux produits à des moments différents (par exemple, un le matin et l'autre le soir). L'utilisation simultanée d'autres médicaments avec ce produit peut augmenter le risque d'irritation cutanée.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si l'irritation cutanée devient sévère (rougeur intense, sécheresse, démangeaisons, sensation de piqûre ou de brûlure).

Ce produit ne doit pas être utilisé simultanément avec des médicaments contenant de l'érythromycine.

L'application simultanée de ce produit et de médicaments tels que la dapsonne et le sulfacétamide peut provoquer une décoloration temporaire des poils sur votre peau et votre visage (décoloration jaune/orange). Cela n'est pas permanent.

Une des substances de ce produit peut influencer l'effet de certains médicaments anesthésiants pour anesthésie générale (appelés « agents bloquants neuromusculaires »). Informez

Raconte Si vous n'êtes pas sûr que ce qui précède s'applique à vous, contactez votre médecin ou pharmacien avant de commencer à utiliser ce produit.

Grossesse, allaitement et fertilité

Il existe peu d'informations sur la sécurité de ce produit chez les femmes enceintes.

Êtes-vous enceinte, pensez-vous l'être, souhaitez-vous le devenir ou allaitez-vous ? Contactez votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Le médecin prendra en considération les avantages de l'utilisation de ce produit pour vous et les risques pour votre bébé pendant votre grossesse.

On ne sait pas si les composants de ce produit sont excrétés dans le lait maternel. Un des médicaments dans ce produit est la clindamycine. Lorsque la clindamycine est prise par voie orale ou par injection, elle peut être excrétée dans le lait maternel. Avant de commencer à utiliser ce produit, contactez votre médecin si vous allaitez. N'appliquez pas ce produit sur vos seins si vous allaitez.

On ne sait pas si les composants de ce médicament sont excrétés dans le lait maternel. Un des médicaments dans ce produit est la clindamycine. Lorsque la clindamycine est prise par voie orale ou par injection, elle peut être excrétée dans le lait maternel. Consultez votre médecin avant de commencer à utiliser ce médicament si vous allaitez. N'appliquez pas ce médicament sur vos seins si vous allaitez.

3. Comment utiliser ce médicament?

utilisez ce produit une fois par jour le soir

utilisez ce médicament une fois par jour le soir

il peut falloir deux à cinq semaines avant de remarquer l'effet de ce médicament

n'utilisez pas plus de douze semaines consécutives. Votre médecin vous indiquera la durée de votre traitement.

Comment devez-vous appliquer ce médicament?

1. Votre maquillage doit être complètement retiré.

2. Lavez bien la surface de la peau affectée. Puis rincez à l'eau tiède et séchez doucement.
3. Appliquez avec le bout des doigts une fine couche de gel sur toute la peau affectée.
4. Appliquez sur toutes les surfaces avec de l'acné, pas seulement sur les boutons individuels. Si le gel ne peut pas être facilement frotté sur la peau, vous en utilisez trop. une pointe de doigt (c'est la quantité de gel qui est pressée du tube et va de la pointe du doigt jusqu'à la première articulation) est suffisante pour traiter le visage deux et demi pointes de doigt au total suffisent pour traiter votre visage et votre dos
5. Si la peau devient très sèche ou squameuse, vous pouvez utiliser une crème hydratante sans huile, utiliser ce médicament moins souvent ou arrêter le traitement pendant une courte période pour permettre à votre peau de s'habituer au traitement. Ce médicament peut ne pas fonctionner de manière optimale s'il n'est pas appliqué tous les jours.
6. Lavez vos mains après avoir utilisé le gel.
7. Une fois le gel séché, vous pouvez utiliser un maquillage non gras.

Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a indiqué. Vous avez des doutes sur la bonne utilisation? Contactez votre médecin ou pharmacien.

Avez-vous utilisé trop de ce médicament?

Assurez-vous de ne pas en appliquer trop. Appliquer trop ou plus souvent le gel n'aide pas à faire disparaître les boutons plus rapidement et peut provoquer une irritation de la peau. Si cela se produit, vous devez utiliser le gel moins souvent ou arrêter pendant quelques jours, puis recommencer.

Avez-vous avalé ce médicament par accident?

Contactez votre médecin ou pharmacien si vous avez avalé le gel par accident. Il se peut que vous ayez les mêmes symptômes que lorsque vous prenez des antibiotiques par voie orale (maux d'estomac).

Avez-vous oublié d'utiliser ce médicament ?

ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée
utilisez la dose suivante à l'heure habituelle

Ne cessez pas ce médicament sans avis

N'utilisez pas le gel plus de 12 semaines consécutives sans consulter votre médecin. Utilisez ce médicament aussi longtemps que votre médecin le recommande. Arrêtez uniquement sur l'avis de votre médecin. Il est important de continuer à utiliser le gel comme prescrit par votre médecin. Si vous arrêtez trop tôt, votre acné peut revenir.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets secondaires, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Arrêtez immédiatement d'utiliser ce médicament et consultez immédiatement votre médecin si vous observez l'un des effets secondaires graves suivants - vous avez besoin d'un traitement médical immédiat :

signes d'une réaction allergique (comme un gonflement du visage, des yeux, des lèvres ou de la langue, de l'urticaire, des difficultés respiratoires ou un évanouissement (collapsus))
diarrhée sévère ou persistante, ou crampes abdominales
sensation de brûlure sévère, desquamation sévère ou démangeaisons

Autres effets secondaires possibles :

Si vous ressentez l'un de ces effets secondaires, essayez d'utiliser ce médicament moins souvent, ou arrêtez de l'utiliser pendant un ou deux jours, puis recommencez.

Effets secondaires très fréquents

Ils peuvent survenir chez au moins 1 personne sur 10

À l'endroit d'application :

rougeur, desquamation, sécheresse de la peau

Ces effets secondaires sont généralement légers.

Effets secondaires fréquents

Ceux-ci peuvent survenir chez moins de 1 personne sur 10
maux de tête

Au site d'application :

sensation de brûlure, douleur, sensibilité à la lumière du soleil

Effets secondaires peu fréquents

Ceux-ci peuvent survenir chez moins de 1 personne sur 100
picotements dus à l'irritation d'un nerf (paresthésie), aggravation de l'acné, peau rouge qui démange, éruption cutanée (inflammation de la peau (dermatite), éruption cutanée (rash érythémateux))

Autres effets secondaires

D'autres effets secondaires ont été observés chez un très petit nombre de personnes, mais leur fréquence exacte est inconnue :

réactions allergiques
inflammation intestinale, diarrhée (y compris diarrhée sanglante), douleurs d'estomac

Au site d'application :

réactions cutanées, décoloration de la peau
éruption cutanée surélevée et prurigineuse (urticaire)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux effets secondaires possibles qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le Centre Néerlandais de Pharmacovigilance Lareb, site web : www.lareb.nl. En signalant les effets secondaires, vous pouvez nous aider à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pharmacie : conserver au réfrigérateur (2°C - 8°C). Ne pas congeler

Patient : après avoir reçu ce médicament de votre pharmacie, conserver en dessous de 25°C. Jeter après deux mois.

N'utilisez plus ce médicament après la date de péremption. Elle se trouve sur le tube et la boîte après EXP. Il y a un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments que vous n'utilisez plus. Ils seront alors détruits de manière responsable et ne finiront pas dans l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Quelles substances contient ce médicament?

les substances actives dans ce médicament sont : phosphate de clindamycine, correspondant à 1% p/p (10 mg/g) de clindamycine et peroxyde de benzoyle hydraté correspondant à 5% p/p (50 mg/g) de peroxyde de benzoyle anhydre

les autres substances dans ce médicament sont : carbomère, diméticone, sulfosuccinate de lauryle disodique, édétate disodique, glycérine, dioxyde de silicium colloïdal hydraté, poloxamère 182, eau purifiée, hydroxyde de sodium

À quoi ressemble le gel Duac Acne et combien y en a-t-il dans un emballage?

Le gel Duac Acne est fourni en tubes de 5, 6, 15, 25, 30, 50, 55, 60 et 70 grammes

le gel est de couleur blanc cassé

chaque emballage contient un tube

toutes les tailles d'emballage mentionnées ne sont pas commercialisées

Enregistré sous le numéro RVG 31531.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd.

Unité 2, Bâtiment 2500,

Avenue 2000,

Cork Airport Business Park,

Cork,

Irlande

Pour toute information concernant ce médicament, veuillez contacter le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Pays-Bas

GlaxoSmithKline BV

Van Asch van Wijckstraat 55H

3811 LP Amersfoort

033 2081100

Fabricant :

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Pologne

ou

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk,

Citywest Business Campus

Dublin 24,

Irlande

Ce médicament est enregistré dans les États membres de l'Espace économique européen et au Royaume-Uni (Irlande du Nord) sous les noms suivants :

Danemark : Clindoxyl Gel

Chypre, Grèce : Indoxyl Gel

Estonie, Islande, Italie, Lettonie, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède : Duac Gel

Finlande : Clindoxyl Geeli

Allemagne : Duac Akne Gel

Pays-Bas : Duac Acne Gel 10 mg/g + 50 mg/g, gel

République tchèque, Lituanie, Pologne : Duac

Irlande, Malte, Royaume-Uni (Irlande du Nord) : Duac Once Daily Gel

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en septembre 2021.

Transtoyou