

Información para el usuario: Información para el usuario

ECURAL® Crema grasa

1mg/g Crema

Principio activo: Furoato de mometasona (Ph.Eur.)

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, ya que contiene información importante.

- Conserve el prospecto. Puede que desee leerlo nuevamente más tarde.
- Si tiene más preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado personalmente. No lo dé a terceros. Puede ser perjudicial para otras personas, incluso si parecen tener los mismos síntomas que usted.
- Si nota efectos secundarios, consulte a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a los efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. están. Ver sección 4.

Qué contiene este prospecto

1. Qué es ECURAL Crema grasa y para qué se utiliza?
2. Qué debe saber antes de usar ECURAL Crema grasa?
3. Cómo se debe usar ECURAL Crema grasa?
4. Qué efectos secundarios son posibles?
5. Cómo se debe almacenar ECURAL Crema grasa?
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es ECURAL Crema grasae y para qué se utiliza?

ECURAL Crema grasa contiene como principio activo furoato de mometasona, una forma sintética altamente eficaz del cortisona natural del cuerpo (glucocorticoide). La crema es para uso externo.

ECURAL Crema grasa se utiliza para la tratamiento de todas las enfermedades inflamatorias y pruriginosas de la piel que responden a un tratamiento externo con glucocorticoides como psoriasis, dermatitis atópica (neurodermatitis) y eccema de contacto irritante y/o alérgico (dermatitis de contacto).itis). ECURAL Crema grasa es una crema antiinflamatoria altamente eficaz.

2. ¿Qué debe tener en cuenta antes de usar ECURAL Crema grasa?

- ECURAL Crema grasa no debe utilizarse,

- si es alérgico al principio activo furoato de mometasona, otros corticosteroides, soja, cacahuete o a cualquiera de los componentes mencionados en la sección 6.mencionados mencionados en caso de rosácea en la cara
- en caso de acné (acné vulgar)
- en acné (acné vulgar)
- en caso de adelgazamiento de la piel (atrofia cutánea)
- en caso de inflamación de la piel alrededor de la boca (dermatitis perioral)
- en picazón de la piel (prurito) en el área anal o genital
- en caso de dermatitis del pañal
- en infecciones de la piel causadas por bacterias, por ejemplo, erupciones cutáneas o purulentas, virus, por ejemplo, herpes zóster, herpes, verrugas, parásitos o hongos, por ejemplo, Candida o dermatofitos.
- en caso de varicela
- en caso de reacciones a vacunas

- en caso de tuberculosis
  - en caso de sífilis
  - en el ojo o en el párpado (la crema no debe entrar en el ojo bajo ninguna circunstancia)
  - en heridas o úlceras cutáneas (ulceraciones cutáneas).
  - Advertencias y precauciones medidas de
- Por favor, hable con su médico o farmacéutico, antes de usar ECURAL crema grasa.

- Si aplica ECURAL crema grasa en grandes áreas del cuerpo o durante un período prolongado, debe consultar a su médico de antemano (véase también la sección 3).
- El uso en psoriasis debe ser estrictamente controlado por un médico.
- Evite cualquier contacto con los ojos. Los efectos secundarios reportados para los o inyectada (aplicada sistémicamente) Coparticularmente cierto para los niños pequeños y niños. Niños. Si experimenta visión borrosa otros trastornos visuales, consulte a su médico. Niños
- Niños  
Uso de ECURAL crema grasa junto con otros medicamentos
- Uso de ECURAL crema grasa junto con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está usando otros medicamentos, ha usado recientemente otros medicamentos o planea usar otros medicamentos. Esto también se aplica a los medicamentos sin receta y a los medicamentos a base de plantas o homeopáticos que medicamentos. Durante el tratamiento con ECURAL crema grasa en el área genital o anal, el excipiente vaselina blanca puede reducir la resistencia al desgarramiento de los condones de látex. Esto puede comprometer la seguridad de los condones. puede estar comprometida.

- Embarazo y lactancia

Si está embarazada o amamantando, o si sospecha que está embarazada o planea quedar embarazada, consulte a su médico o

farmacéutico antes de usar este medicamento.

**Embarazo** El uso de ECURAL crema grasa durante el embarazo solo debe realizarse después de consultar a su médico. Como con todos los glucocorticoides de uso externo, no debe pasarse por alto en mujeres embarazadas que el principio activo puede entrar en el torrente sanguíneo del feto y puede afectar el crecimiento del feto. puede llegar al torrente sanguíneo del feto y puede influir en el crecimiento del feto.

#### Lactancia

aplicarse en el área del pecho. Los glucocorticoides se excretan en la leche materna. Si se requiere un tratamiento con dosis más altas Los glucocorticoides se excretan en la leche materna. Si se requiere un tratamiento con dosis más altas o sobre un período prolongado, se debe interrumpir la lactancia (ver también la sección 3).

- Vehículos y capacidad para manejar máquinas

Es no se requieren precauciones especiales.

#### 3. Cómo se debe usar ECURAL Crema Grasa?

Use este medicamento siempre exactamente según lo acordado con su médico o farmacéutico. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.

ECURAL Crema Grasa está destinada para uso en la piel.

Aplique ECURAL Crema Grasa una vez al día. ECURAL Crema Grasa se aplica en una capa fina sobre las áreas afectadas de la piel.

Evite el uso prolongado de ECURAL Crema Grasa, es decir, no use la crema grasa por más tiempo que 3 semanas.

Una aplicación en la cara no debe exceder una duración de 5 días.

Evite también una aplicación a gran escala de ECURAL Crema Grasa, es decir, no aplique la crema grasa en más del 20% de la superficie corporal. En caso de mejoría, a menudo se recomienda el uso de un glucocorticoide más débil.

A menudo es útil la llamada “terapia en tándem”, es decir, h. por día eTambién puede ser adecuada una alternancia semanal de tratamiento con ECURAL Crema Grasa y una crema sin principio activo. (Véase también la sección

Asimismo, un tratamiento alternando semanalmente entre ECURAL crema grasa y una crema sin principio activo puede ser adecuado. (Véase también la sección

Aplicación en niños mayores de 2 años

- Uso en niños mayores de 2 años

La duración de la aplicación para un período de tratamiento con la dosis efectiva más baja posible. La duración del uso es para Niños En niños, ECURAL Crema Grasa debe aplicarse solo en áreas pequeñas, es decir, en menos En niños, ECURAL Crema Grasa debe aplicarse solo en áreas pequeñas, es decir, en menos de 10% de la superficie corporal. debe aplicarse. Por favor, hable con su médico Por favor, hable con su médico o farmacéutico, si tiene la impresión de que el efecto de ECURAL Crema Grasa es demasiado fuerte o demasiado débil.

- Si ha aplicado una cantidad mayor de ECURAL Crema Grasa de la que debería

Informe a su médico de inmediato.

Si ECURAL Crema Grasa se ha ingerido accidentalmente o en cantidades demasiado grandes o durante un período demasiado prolongado, esto puede llevar a ciertas enfermedades (por ejemplo, síndrome de Cushing) que deben ser tratadas.

El contenido de principio activo en cada envase es tan bajo que, en el improbable caso de una ingestión accidental, tiene poco o ningún efecto perjudicial.

- Si ha olvidado aplicar ECURAL Crema Grasa

No aplique el doble de cantidad si ha olvidado la aplicación anterior. Aplique la dosis olvidada tan pronto como sea posible y luego continúe con su ritmo de aplicación habitual. Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consúlte

Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, contacten a su médico o farmacéutico.

#### 4. ¿Qué efectos secundarios son posibles?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufren.

Para la frecuencia de los efectos secundarios se utilizan las siguientes categorías:

Muy frecuentes: más de 1 de cada 10 tratados

Frecuentes: 1 a 10 de cada 100 tratados

Ocasionalmente: 1 a 10 de cada 1.000 tratados

Raras: 1 a 10 de cada 10.000 tratados

Muy raras: menos de 1 tratado de 10.000

No conocido: Frecuencia no estimable a partir de los datos disponibles

Frecuentemente se presentaron hormigueo y escozor. Ocasionalmente se produjeron nódulos elevados (formación de pápulas) y pústulas.

Muy raramente se presentaron inflamaciones de los folículos pilosos (foliculitis), sensación de ardor y picazón en la piel (prurito). En las siguientes reacciones adversas la frecuencia no es conocida:

Infección, forúnculo, sensación anormal (parestesia),

eccema (dermatitis de contacto), cambio de color de la piel

(hipopigmentación), crecimiento excesivo de vello (hipertrichosis), formación de estrías en la piel (estrías cutáneas), inflamación de la piel similar al acné (dermatitis acneiforme),

adelgazamiento de la piel (atrofia cutánea) y dolor o reacciones en el sitio de aplicación. La visión borrosa se presentó con el uso de glucocorticoides (frecuencia: no conocida). oíden en (Frecuencia: No conocida).

en el rostro (dermatitis perioral), dermatitis perioral

Ablandamiento de la piel (maceración cutánea), sudamina (miliaria), dilataciones de los vasos cutáneos (telangiectasias) e infecciones secundarias (infecciones secundarias).

Puede ocurrir que los glucocorticoides cambien la apariencia de cuadros clínicos y, por lo tanto, dificulten su reconocimiento. Asimismo, los glucocorticoides pueden retrasar el proceso de curación.

Otros posibles efectos secundarios: los fosfolípidos hidrogenados de soja pueden causar muy raramente reacciones alérgicas.

- ¿Qué se debe tener en cuenta en los niños?

Los niños están particularmente en riesgo de desarrollar efectos secundarios bajo tratamiento con glucocorticoides (por ejemplo, supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, síndrome de Cushing).

Un tratamiento a largo plazo con corticosteroides puede afectar el crecimiento y el desarrollo de los niños.

- Notificación de efectos secundarios

Si nota efectos secundarios, consulte a su médico o Farmacéutico. Esto también se aplica a los efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente al Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios, Dpto. de Farmacovigilancia, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Sitio web: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de). Al informar sobre los efectos secundarios, puede contribuir a que se proporcione más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Cómo se debe conservar ECURAL Crema Grasa?

Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños inaccesible.

No debe usar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada. La fecha de caducidad se encuentra en el cartón o el tubo después de "Usar antes de". La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

- Condiciones de almacenamiento  
No almacenar a más de 25 °C.

- Indicaciones sobre la duración después de abierto

Después de abrir es ECURAL Crema grasa estable durante 3 meses y no debe usarse después. No deseche los medicamentos en el agua residual. Pregunte a su farmacéutico o a su servicio local de eliminación de residuos cómo desechar el medicamento si ya no lo necesita. Contribuye así a la protección del medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

- Qué contiene ECURAL Crema grasa  
El principio activo es furoato de mometasona (Ph.Eur.).

1g de crema contiene 1mg de furoato de mometasona (Ph.Eur.).

Los demás componentes son: vaselina blanca; cera blanqueada; almidón de poli{O-[hidrógeno-(oct-1-en-1-il)succinil]}, sal de aluminio; dióxido de titanio; fosfolípidos hidrogenados de soja; ácido fosfórico al 10%; agua purificada; 2-metilpentano-2,4-diol.

- Cómo es ECURAL Crema grasa y contenido del

envase

ECURAL Crema grasa es una crema blanca. ECURAL Crema grasa está disponible en envases de 10 g, 20 g, 25 g, 50 g y 100 g de crema.

Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase e no se comercialicen todos los tamaños de envase.

- Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización de comercialización  
MSD SHARP & DOHME GMBH

Lindenplatz 1

85540 Haar

Dirección postal:

Apartado de correos 1202

85530 Haar

Tel.: 0800/673673673

Fax: 0800/673673329

Correo electrónico: [e-mail@msd.de](mailto:e-mail@msd.de)

Distribuidor:

DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH, 85530  
Haar

Fabricante  
Schering-Plough Labo N.V.  
Industriepark 30  
2220 Heist-op-den-Berg  
Bélgica

Este prospecto fue revisado por última vez en agosto de 2017.

¿Tiene más preguntas?

Por favor, póngase en contacto con:

Centro de Información MSD:

Tel.: 0800/673673673

Fax: 0800/673673329 Correo electrónico:

email@msd.de

También puede encontrar este prospecto en formatos para ciegos y personas con discapacidad visual en el Servicio de Información al Paciente

<http://www.patienteninfo-service.de/>.