

Käyttötiedote: Tietoa käyttäjälle

ECURAL® Rasvavoide

1mg/g voide

Vaikuttava aine: Mometasonifuroaatti (Ph.Eur.)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä se sisältää tärkeitä tietoja.

- Säilytä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämälääke on määrätty vain sinulle. Älä anna sitä kenellekään muulle. Se voi vahingoittaa muita, vaikka heidän oireensa olisivat samankaltaisia kuin sinun.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Katso kohta 4.

Mitä tässä pakkausselosteessa on

1. Mikä on ECURAL-rasvavoide on ja mihin sitä käytetään?
2. Mitä sinun tulisi tietää ennen ECURAL-rasvavoiteen käyttöä?AL-rasvavoidetta huomioida?
3. Miten on ECURAL-rasvavoidetta käytetään?
4. Mitkä haittavaikutukset ovat mahdollisia?
5. Miten on ECURAL-rasvavoidetta säilytettävä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mikä on ECURAL Rasvavoideja mihin sitä käytetään?

ECURAL Rasvavoide sisältää kuin vaikuttavana aineena mometasonifuroaattia, joka on voimakas synteettinen muoto kehon omasta kortisonista (glukokortikoidi). Voide on ulkoiseen käyttöön.

ECURAL Rasvavoidetta käytetään kaikkien tulehduksellisten ja kutisevien ihosairauksien hoitoon, jotka reagoivat ulkoiseen glukokortikoidihoitoon, kuten psoriaasi, atooppinen dermatiitti ja ärsytys- ja/tai allerginen kosketushottuma (kontaktidermatiitti).ECURAL Rasvavoide on voimakas, tulehdusta ehkäisevä voide.

2. Mitä sinun tulisi huomioida ennen ECURAL Rasvavoiteen käyttöä?

- ECURAL Rasvavoidetta ei saa käyttää,
- jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle mometasonifuroaatille, muille

kortikosteroideille, soijalle, maapähkinälle tai jollekin tämän lääkkeen kohdassa 6mainituille muulle aineosalle.

ruusufinnissä (rosacea) kasvoilla

- aknetaudin (akne vulgaris) yhteydessä
- aknella (akne vulgaris)
- ihon oheneminen (ihon atrofia)
- ihon tulehdus suun ympärillä (perioraalinen dermatiitti) suun ympärillä (perioraalinen dermatiitti)
- kun kutina (pruritus) peräaukon tai sukuelinten alueella
- vaippaihottuma
- kun ihoinfektiot, jotka johtuvat bakteereista, esim. iho- tai märkärakkulat, viruksista, esim. vyöruusu, herpes, syylät, loiset tai sienet, esim. Candida tai dermatofyytit.
- vesirokko
- rokotusreaktiot
- tuberkuloosi
- kuppa

- silmän tai silmäluomen alueella (voidetta ei saa missään tapauksessa joutua silmään)
- haavoihin tai ihon haavaumiin (ihon haavaumat). haavoihin tai ihon haavaumiin (ihon haavaumat).
- Varoitukset ja varotoimenpiteet Varoitukset ja varotoimenpiteet

Keskustele lääkärisi kanssa tai Apteekkari, ennen kuin käytät ECURAL-rasvavoidetta.

- Jos käytät ECURAL-rasvavoidetta laajoille ihoalueille tai pitkäaikaisesti, sinun on ehdottomasti neuvoteltava lääkärisi kanssa etukäteen (katsomys kohta 3).
- Psoriaasin hoito vaatii tiivistä lääkärin seuranta. Lääkärin on valvottava tarkasti.
- Vältä kaikenlaista kosketusta silmiin. Suun kautta otettujen tai injektoidujen (systemisesti käytettyjen) kortikosteroidien raportoituja haittavaikutuksia, mukaan lukien lisämunuaiskuoren toiminnan heikkeneminen, voi esiintyä myös ulkoisesti käytettäessä. Tämä koskee erityisesti pieniä lapsia ja lapsia. Jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, ota yhteyttä lääkäriisi. Lapset
- Lapset ECURAL-rasvavoiteen käyttö yhdessä muiden lääkkeiden kanssa
- ECURAL-rasvavoiteen käyttö yhdessä muiden lääkkeiden kanssa

Ilmoitalääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät muita lääkkeitä, olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai aiot käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös reseptivapaita ja kasviperäisiä tai homeopaattisia päänsärky lääkkeitä. ECURAL-rasvavoiteen käytön yhteydessä sukupuolielinten tai peräaukon alueella voi valkoisen vaseliinin apuaineen vuoksi lateksikondomien repeämisluku heikentyä. Tämä voi vaikuttaa kondomien turvallisuuteen.igt olla.

- Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät tai jos epäilet olevasi raskaana tai aiot tulla raskaaksi, kysy

neuvoa lääkäriltäsi tai apteekkariltäsi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskausvankeus

ECURAL-rasvavoidetta saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin ohjeiden mukaan. Kuten kaikkien ulkoisesti käytettävien glukokortikoidien kohdalla, ei pidä unohtaa, että vaikuttava aine voipäästä syntymättömän lapsen verenkiertoon ja vaikuttaa syntymättömän lapsen kasvuun.

Imetys

ECURAL-rasvavoidetta saa käyttää imetyksen aikana vain lääkärin ohjeiden mukaan. ECURAL-rasvavoidetta ei saa käyttää rintojen alueella.

Glukokortikoidit erittyvät äidinmaitoon. Jos hoito korkeammilla annoksilla tai pidemmän ajanjakson ajan, imetys on keskeytettävä (katso myös kohta 3).

- Vajo- ja koneidenkäyttökyky

Se ei erityisiä varotoimia tarvita.

3. Kuinka on ECURAL-rasvavoidetta käytettävä?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma.

ECURAL-rasvavoide on tarkoitettu käytettäväksi iholla.

Levitä ECURAL-rasvavoidetta kerran päivässä. ECURAL-rasvavoide levitetään ohuesti sairastuneille ihoalueille.

Vältä ECURAL-rasvavoiteen pitkäaikaista käyttöä, ts. älä käytä rasvavoidetta pidempään kuin 3 viikkoa.

Kasvojen alueella käyttöä ei tulisi jatkaa yli 5 päivän ajan.

Vältä myös laajamittaista käyttöä ECURAL-rasvavoiteella, eli älä käytä rasvavoidetta yli 20 %:lla kehon pinta-alasta. Parannuksen myötä suositellaan usein heikomman glukokortikoidin käyttöä.

Usein niin sanottu "tandem-terapia" on järkevää, eli h. päivässä eMyös viikoittainen vuorottelu ECURAL-rasvavoiteen ja voiteen

ilman vaikuttavaa ainetta voi olla sopivaa.
(Katso myös kohta
Samoin hoito voi olla sopiva, kun ECURAL-
rasvavoidetta ja vaikuttamatonta voidetta
käytetään viikoittain vuorotellen. (Katso myös
kohta Käyttö yli 2-vuotiailla lapsilla

- Käyttö yli 2-vuotiailla lapsilla
hoitojakson aikana pienimmällä mahdollisella
tehokkaalla annoksella. Käyttöaika
onhoidonaika mahdollisimman pienellä
tehokkaalla annoksella. Käyttöaika on Lapset
Lapsilla ECURAL-rasvavoidetta tulisi käyttää
vain pienille alueille, eli
ECURAL-rasvavoidetta tulisi käyttää lapsilla
vain pienille alueille, ts. alle 10 %:lle kehon
pinta-alasta. käytettävä. Keskustele lääkärisi
kanssa

Keskustele lääkärisi kanssa tai apteekkari, jos
sinusta tuntuu, että ECURAL-rasvavoiteen
vaikutus on liian voimakas tai liian heikko.

- Jos olet käyttänyt suuremman määrän
ECURAL-rasvavoidetta kuin sinun
pitäisi

Ilmoitavälittömästi lääkärillesi.

Jos ECURAL-rasvavoidetta on vahingossa
nielty tai liian suurina määrinä tai liian pitkän
ajan käytetty, se voi johtaa tiettyihin
sairauksiin (esim. Cushingin oireyhtymä),
jotka vaativat hoitoa. Vaikuttavan aineen
Vaikutusainepitoisuus jokaisessa
pakkauksessa niin pieni, että
epätodennäköisessä tapauksessa
tahattomasta nielemisestä on vain vähän tai
ei lainkaan haitallisia vaikutuksia. Jos olet
unohtanut käyttää ECURAL-rasvavoidetta

- Älä käytä kaksinkertaista
määrää, jos olet unohtanut edellisen käytön.
Käytä unohtunut annos mahdollisimman pian
ja jatka sitten normaalia käyttörutiiniasi. Jos
sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen
käytöstä, ota, jos unohdit edellisen käytön.
Suorita unohtunut käyttö mahdollisimman
pian ja palaa sitten tavanomaiseen
käyttörutiiniisi.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen
käytöstä, ota yhteyttä lääkärisi puoleen tai
apteekkihenkilökuntaan.

4. Mitkä haittavaikutukset ovat mahdollisia?

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi
aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta ne eivät
ilmene kaikilla.

Haittavaikutusten yleisyysluokituksissa
käytetään seuraaviakategorioita:

Hyvin yleinen: yli 1 hoidettu 10:stä

Yleinen:

1-10 hoidettua 100:sta Melko harvinainen:

1-10 hoidettua 1 000:sta Harvinainen:

1-10 hoidettua 10 000:sta Hyvin harvinainen:

Hyvin harvinainen: vähemmän kuin 1
hoidettu 10 000:sta

Tuntematon: Saatavilla olevien tietojen
perusteella ei voida arvioida
esiintyvyyttä

Usein esiintyi pistelyä ja kihelmöintiä.

Satunnaisesti esiintyi kohonneita kyhmyjä
(papuloita) ja märkärakkuloita.

Hyvin harvoin esiintyi karvatuppitulehduksia
(follikuliitti), polttavaa tunnetta ja ihon kutinaa
(pruritus). Seuraavien haittavaikutusten
esiintyvyys ei ole tiedossa:

Infektio, furunkkeli, tuntohäiriö (parestesia),
ekseema (kosketushottuma), ihon
värimuutokset

(hypopigmentaatio), liiallinen karvankasvu
(hypertrikoosi), ihon venytysjuovat (striat),
aknomainen ihotulehdus (akneiforminen
dermatiitti), ihon oheneminen (ihon atrofia) ja
kipu tai reaktiot käyttöalueella. Näön
hämartyminen esiintyi glukokortikoidien
käytön yhteydessä (esiintyvyys: tuntematon).

Seuraavat haittavaikutukset esiintyivät
satunnaisesti ulkoisesti käytettävien
glukokortikoidien käytön yhteydessä ja voivat
esiintyä myös ECURALin käytön yhteydessä:

Kuiva iho, ihoärsytys, ihotulehdus
(dermatiitti), ihotulehdus kasvoilla
(perioraalinen dermatiitti),
ihon pehmeneminen (ihon maseraatio),
hikirauhastulehdus (miliaria), ihon verisuonten
laajentumat (teleangiektasiat) ja
sekundaariset infektiot (sekundaariset
infektiot). perioraalinen dermatiitti
(suunympärysihottuma),
Ihon pehmeneminen (ihon maseraatio),
hikirauhasten hikinäpyt (miliaria), ihon

verisuonten laajentumat (teleangiektasiat) ja jälki-infektiot (sekundääri-infektiot).

Glukokortikoidit voivat muuttaa sairauksien ilmenemismuotoa ja siten vaikeuttaa niiden tunnistamista. Samoin glukokortikoidit voivat hidastaa paranemisprosessia.

Muita mahdollisia sivuvaikutuksia: Hydratut fosfolipidit soijapavuista voivat hyvin harvoin aiheuttaa allergisia reaktioita.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Hydratoidut soijapavun fosfolipidit voivat hyvin harvoin aiheuttaa allergisia reaktioita tulee ottaa huomioon lapsilla?

- Lapset ovat huomioitava lapsilla?

Cushingin oireyhtymä). Pitkäaikainen kortikosteroidihoito voi vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen. Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi

taihoito kortikosteroideilla voi vaikuttaa kasvuun ja kehitykseen

alkaen Lapsilla on.

- Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai Apteekkari. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa olevat.

Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista

suoraan Saksan liittovaltion lääke- ja lääkintätuoteinstituutille, osasto Farmakovigilanssi, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, verkkosivusto:

www.bfarm.de. Ilmoittamalla

haittavaikutuksista voit auttaa tarjoamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen

turvallisuudesta. Ilmoittaminen voi auttaa tarjoamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytetään ECURAL-rasvavoidetta?

Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä löytyy ulkopakkauksesta tai tuubista merkinnän

”Käytettävä ennen” jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä viittaa kuukauden

viimeiseen päivään.

- Säilytysolosuhteet

Älä säilytä yli 25 °C lämpötilassa.

- Avaamisen jälkeinen säilyvyysaika

Avauksen jälkeen on ECURAL-rasvavoidetta säilyy 3 kuukautta ja sitä ei tulisi käyttää tämän jälkeen. Älä hävitä lääkkeitä viemäriin.

Kysy apteekkariltasi tai

paikalliselta jätehuoltolaitokselta, miten lääke hävitetään, kun et enää tarvitse sitä. Näin autat suojelemaan ympäristöä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

- Mitä ECURAL-rasvavoidetta sisältää

Vaikuttava aine on mometasonifuroaatti (Ph.Eur.).

1 g voidetta sisältää 1 mg mometasonifuroaattia (Ph.Eur.).

Muut aineet ovat: valkoinen vaseliini; valkaistu vaha; Poly{O-[vety-(okt-1-eeeni-1yyli)sukkinyyli]tärkkelys}, alumiinisuolo; titaanidioksidi; hydratoidut fosfolipidit soijapavuista; fosforihappo 10 %; puhdistettu vesi; 2-metyylipentaani-2,4-dioli.

- Miltä ECURAL-rasvavoidetta näyttää ja pakkauksen

sisältö

ECURAL-rasvavoidetta on valkoinen voidetta.

ECURAL-rasvavoidetta on saatavilla pakkauksissa, jotka sisältävät 10 g, 20 g, 25 g, 50 g ja 100 g voidetta.

Mahdollisesti ei kaikkia pakkaukokoja tuoda markkinoille. Mahdollisesti ei kaikkia pakkaukokoja tuoda markkinoille.

- Lääkevalmisteen myyntiluvan haltija ja valmistaja

Lääkevalmisteen myyntiluvan haltija

MSD SHARP & DOHME GMBH

Lindenplatz 1

85540 Haar

Postiosoite:

Postilokero 1202

85530 Haar

Puh.: 0800/673673673

Faksi: 0800/673673329

Sähköposti: e-mail@msd.de

Yhteismyyjä:

DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH, 85530
Haar

Valmistaja
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

Tätä pakkausselostetta on viimeksi tarkistettu
elokuussa 2017.

Onko sinulla lisäkysymyksiä?

Ota yhteyttä:

MSD Infokeskus:

Puh.: 0800/673673673

Faksi: 0800/673673329 Sähköposti:

email@msd.de

Löydät tämän pakkausselosteen myös sokeille
ja heikkonäköisille tarkoitetuissa muodoissa

PotilasInfo-palvelusta

<http://www.potilasinfo-palvelu.fi/>.

Transtoyou