

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

ECURAL® Riebus kremas

1mg/g kremas

Veiklioji medžiaga: mometazono furoatas (Ph.Eur.)

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį, nes jame pateikta svarbi informacija. Laikykite pakuotės lapelį. Gali būti, kad vėliau norėsite jį perskaityti dar kartą.

- Jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės į savo gydytoją
- Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės į savo gydytoją vaistininką. Šis vaistas buvo skirtas tik jums. Nedalinkite jokitiems asmenims. Jis gali pakenkti kitiems žmonėms, net jei jų simptomai yra tokie patys kaip jūsų. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją
- Jei pastebėjote šalutinį poveikį, kreipkitės į savo gydytoją vaistininką. Tai taip pat taikoma šalutiniam poveikiui, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje. Vaistininkui. Tai taip pat taikoma šalutiniams poveikiams, kurie nėra nurodyti šiame pakuotės lapelyje yra. Žr. 4 skyrių.

Kas yra šiame pakuotės lapelyje

1. Kas yra ECURAL riebalinis kremas ir kam jis vartojamas?
2. Ką turėtumėte žinoti prieš vartodami ECURAL riebalinį kremą?
3. Kaip yra ECURAL riebalinis kremas vartojamas?
4. Kokios šalutinės reakcijos gali būti galimos?
5. Kaip yra ECURAL riebalinis kremas laikomas?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra ECURAL riebus kremas ir kam jis naudojamas?

ECURAL riebus kremas sudėtyje yra kaip veiklioji medžiaga mometazono furoatas, stipriai veikianti dirbtinai sukurta natūralaus kortizono (gliukokortikoido) forma. Kremas yra naudojamas išoriškai.

ECURAL riebus kremas naudojamas visų uždegiminių ir niežtinčių odos ligų, kurios reaguoja į išorinį gydymą gliukokortikoidais, tokių kaip žvynelinė (psoriazė), atopinis dermatitas (neurodermitas) ir dirginimo ir/arba alerginis kontaktinis dermatitas (kontaktodermatitas), gydymui. ECURAL riebus kremas yra stipriai veikiantis, uždegimą mažinantis kremas.

2. Ką turėtumėte žinoti prieš naudodami ECURAL riebus kremą?

- ECURAL riebus kremas neturėtų būti naudojamas,
- jei esate alergiški veikliajai medžiagai mometazono furoatui, kitiems kortikosteroidams, sojai, žemės riešutams ar bet kuriai iš 6 skyriuje nurodytų kitų šio vaisto sudedamųjų dalių.
- esant rožinei (rosacea) veide
- esant aknei (acne vulgaris)
- esant odos suplonėjimui (odos atrofija)
- esant odos uždegimui aplink burną (perioraliniis dermatitas)
- esant odos niežuliui (pruritas) analinėje arba genitalinėje srityje
- esant vystyklų bėrimui
- esant odos infekcijoms, kurias sukelia bakterijos, pvz., odos ar pūliniai bėrimai, virusai, pvz., juostinė pūslelinė, herpesas, karpos, parazitai ar grybeliai, pvz. Candida ar dermatofitai.
- esant vėjaraupiams

- esant skiepų reakcijoms
- esant tuberkuliozei
- esant sifiliui
- ant akies ar akies voko (kremas jokių būdu neturi patekti į akį)
- ant žaizdų ar odos opų (odos opų).
- Įspėjimai ir atsargumopriemonės

Prašome pasitarti su savo gydytoju arba vaistininką, prieš pradėdami vartoti ECURAL riebių kremą.

- Jei ECURAL riebių kremą naudosite ant didelių kūno plotų arba ilgesnį laiką, būtinai pasitarkite su savo gydytoju (taip pat žr. 3 skyrių).
- Psoriazės gydymą turi atidžiai stebėti gydytojas.
- Venkite bet kokio kontakto su akimis. Šalutinis poveikis, kuris pasireiškia vartojant arba suleidžiant (sistemiškai vartojamus) kortikosteroidus, įskaitant antinksčių funkcijos sutrikimą, gali pasireikšti ir vartojant išoriškai. Tai ypač aktualu mažiems vaikams ir vaikai. Vaikai arba kiti regėjimo sutrikimai, kreipkitės į savo gydytoją. Vaikai
- Vaikai
ECURAL riebaus kremo vartojimas kartu su kitais vaistais
- ECURAL riebių kremas vartojimas kartu su kitais vaistais

Informuokite savo gydytoją arba vaistininką, jei vartojate kitus vaistus, neseniai vartojote kitus vaistus arba ketinate vartoti kitus vaistus. Tai taikoma ir nereceptiniams bei augaliniams arba homeopatiniais vaistams.

Gydant ECURAL riebaliniu kremu genitalijų arba analinėje srityje, dėl pagalbinės medžiagos baltosios vazelino gali sumažėti latekso prezervatyvų atsparumas plyšimui. Dėl to gali būti sumažintas prezervatyvų saugumas.

- Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jei esate nėščia arba žindote, arba jei manote, kad galite būti nėščia, arba planuojate pastoti, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas

ECURAL riebalinį kremą nėštumo metu galima vartoti tik pasitarus su gydytoju.

Kaip ir visiems išoriškai vartojamiems gliukokortikoidams, nėščioms moterims neturėtų būti pamiršta, kad veiklioji medžiaga gali patekti į negimusio vaiko kraujotaką ir gali paveikti negimusio vaiko augimą. gali patekti į negimusio vaiko kraujotaką ir gali būti paveiktas negimusio vaiko augimas.

Žindymo laikotarpis

ECURAL riebalinį kremą žindymo laikotarpiu galima vartoti tik pasitarus su gydytoju.

ECURAL riebalinio kremo negalima tepti krūtinės srityje. Glukokortikoidai išsiskiria į motinos pieną. Jei gydymas didesnėmis dozėmis

negalima tepti krūtinės srityje. arba ilgesnį laikotarpį būtina, žindymą reikia nutraukti (taip pat žr. 3 skyrių).

- Vairavimas ir gebėjimas valdyti mechanizmus

Tai nėra jokių ypatingų atsargumo priemonių.

3. Kaip yra ECURAL riebalinis kremas naudojamas?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai pagal gydytojo arba vaistininko nurodymus. Kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, jei nesate tikri.

ECURAL riebalinis kremas yra skirtas naudoti ant odos.

Naudokite ECURAL riebalinį kremą kartą per dieną. ECURAL riebalinis kremas plonai tepamas ant pažeistų odos vietų.

Venkite ilgalaikio ECURAL riebalinio kremo naudojimo, t. y. nenaudokite riebalinio kremo ilgiau nei 3 savaites.

Naudojimas veido srityje neturėtų trukti ilgiau nei 5 dienas.

Venkite taip pat plataus naudojimo ECURAL riebaliniu kremu, t. y. netepkite kremo daugiau nei 20% kūno paviršiaus. Pagerėjus būklei, dažnai rekomenduojama naudoti silpnesnį gliukokortikoidą.

Dažnai vadinamoji „tandeminė terapija“ yra prasminga, t. y. per dieną vieną kartą naudoti ECURAL riebalinį kremą ir po 12 valandų

naudoti tinkamą kremą be veikliosios medžiagos.

Taip pat gali būti tinkamas gydymas, keičiant ECURAL riebalinį kremą ir kremą be veikliosios medžiagos kas savaitę. (Taip pat žiūrėkite skyrių 2)

- Naudojimas vaikams nuo 2 metų

Apie saugų ECURAL riebalinio kremo naudojimą vaikams yra pakankamai klinikinių tyrimų, trunkančių 3 savaites. ECURAL riebalinio kremo naudojimas vaikams turėtų būti kuo trumpesnį gydymo laikotarpis su mažiausia veiksminga doze. Naudojimo trukmė vaikams nuo 2 metų yra ne daugiau kaip 3 savaitės.

Vaikams ECURAL riebalinis kremas turėtų būti naudojamas tik mažose srityse, t. y. mažiau nei 10% kūno paviršiaus. Prašome pasitarti su savo gydytoju

Prašome pasikalbėti su savo gydytoju arba vaistininkui, jei manote, kad ECURAL riebalinio kremo poveikis yra per stiprus arba per silpnas.

- Jei pavartojote didesnę ECURAL riebalinio kremo kiekį, nei turėtumėte

Informuokite nedelsiant savo gydytoją.

Jei ECURAL riebalinis kremas buvo netyčia prarytas arba per dideliais kiekiais arba per ilgą laiką buvo naudojamas, tai gali sukelti tam tikras ligas (pvz., Kušingo sindromą), kurias reikia gydyti.

Veiklioji medžiaga kiekvienoje pakuotėje yra tokia maža, kad mažai tikėtina netyčinio nurijimo atveju ji turės mažai arba visai neturės žalingo poveikio.

- Jei pamiršote pavartoti ECURAL riebalinį kremą

Nenaudokite dvigubo kiekio, jei pamiršote ankstesnį naudojimą. Pamirštą dozę pavartokite kuo greičiau ir tada vėl laikykitės įprasto naudojimo ritmo. Jei turite daugiau klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės. Jei turite daugiau klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

4. Kokios šalutinės reakcijos yra galimos?

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali sukelti šalutinių reakcijų, tačiau jos nepasireiškia visiems pacientams.

Šalutinių reakcijų dažnumo apibūdinimui naudojamos šios kategorijos:

Labai dažnai: daugiau nei 1 iš 10 gydytų

Dažnai: 1 iki 10 iš 100 gydytų

Kartais: 1 iki 10 iš 1 000 gydytų

Retai: 1 iki 10 iš 10 000 gydytų

Labai retai: mažiau nei 1 gydytas iš 10 000

Nežinoma: Dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis

Dažnai pasireiškė dilgčiojimas ir dygsniai.

Retkarčiais atsirado iškilusių mazgelių (papulių) ir pustulių.

Labai retai pasireiškė plaukų folikulų uždegimas (folikulitas), deginimo jausmas ir odos niežėjimas (pruritas). Toliau nurodytų šalutinių poveikių dažnis nežinomas:

Infekcija, furunkulas, jutimo sutrikimas (parestezija),

Egzema (kontaktinis dermatitas), odos spalvos pokytis

(hipopigmentacija), per didelis plaukuotumas (hipertrichozė), odos strijų susidarymas

(strijos), aknės tipo odos uždegimas

(akniforminis dermatitas), odos plonėjimas

(atrofija) ir skausmas arba reakcijos taikymo vietoje. Neryškus matymas pasireiškė

vartojant gliukokortikoidus (dažnis: nežinomas).

Toliau nurodyti šalutiniai poveikiai retkarčiais pasireiškė vartojant išorinius gliukokortikoidus

ir gali pasireikšti vartojant ECURAL: Sausa oda, odos dirginimas, odos uždegimas

(dermatitas), odos uždegimasveido srityje (perioralinis dermatitas),

odos suminkštėjimas (maceracija), prakaito liaukų uždegimas (miliaria), odos kraujagyslių

išsiplėtimas (teleangiektazija) ir antrinės infekcijos (sekundarinės infekcijos).

Gali atsirasti taip, kad gliukokortikoidai

pakeičia ligų vaizdą ir taip apsunkina jų atpažinimą. Gali atsirasti taip, kad

gliukokortikoidai pakeičia ligų vaizdą ir taip apsunkina jų atpažinimą.

Taip pat gliukokortikoidai gali sulėtinti gijimo procesą.

Kitos galimos šalutinės reakcijos: hidrinti sojų fosfolipidai labai retai gali sukelti alergines reakcijas. sukelti.

- Ką reikia atkreipti dėmesį vaikams?

Vaikai yra ypač rizikingi, gydant gliukokortikoidais, patirti šalutinių poveikių (pvz., hipotalamo-hipofizės-antinksčių ašies slopinimas, Kušingo sindromas).

Kušingo sindromas).

Ilgalaikis gydymas kortikosteroidais gali turėti įtakos vaikų augimui ir vystymuisi. Ilgalaikis gydymas kortikosteroidais gali turėti įtakos vaikų augimui ir vystymuisi.

vaikų. Šalutinių poveikių pranešimas

- Jei pastebite šalutinius poveikius, kreipkitės į savo gydytoją

Jei pastebėjote šalutinį poveikį, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma šalutiniams poveikiams, kurie nėra nurodyti šiame pakuotės lapelyje nurodyti.

Jūs taip pat galite pranešti apie šalutinius poveikius tiesiogiai Vokietijos vaistų ir medicinos produktų institutui,

Farmakologinės budrumo skyriui, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, svetainė:

www.bfarm.de. Pranešdami apie šalutinius poveikius, galite prisidėti prie to, kad būtų pateikta daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. Pranešdami apie šalutinius poveikius, galite prisidėti prie to, kad būtų pateikta daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

Pranešdami apie šalutinius poveikius, galite prisidėti prie to, kad būtų pateikta daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti ECURAL riebalų kremą?

Laikykite šį vaistą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jūs negalite naudoti šio vaisto po nurodytos galiojimo datos. Galiojimo datą rasite ant dėžutės arba ant tūbelės po „Tinka iki“. Galiojimo data nurodo paskutinę nurodyto mėnesio dieną.

- Laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

- Pastaba apie galiojimo laiką po atidarymo

Atidarius yra ECURAL riebalinis kremas galioja 3 mėnesius ir po to neturėtų būti naudojamas. Vaistų neišmeskite į nuotekas.

Klauskite savo vaistininko arba savo vietinės atliekų tvarkymo įmonės, kaip išmesti vaistą, jei jo nebereikia. Taip prisidedate prie aplinkos apsaugos.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

- Kas yra ECURAL riebalinis kremas
Veiklioji medžiaga yra mometazono furoatas (Ph.Eur.).

1 g kremo yra 1 mg mometazono furoato (Ph.Eur.).

Kiti komponentai yra: baltasis vazelinai; balintas vaškas; poli{O-[vandenilio-(okt-1-en-1il)sukcinilo]krakmolai}, aliuminio druska; titano dioksidas; hidruoti sojų fosfolipidai; fosforo rūgštis 10%; išgrynintas vanduo; 2-metilpentan-2,4-diol.

- Kaip atrodo ECURAL riebalinis kremas ir pakuotės

turinys

ECURAL riebalinis kremas yra baltas kremas.

ECURAL riebalinis kremas tiekiamas pakuotėse po 10 g, 20 g, 25 g, 50 g ir 100 g kremo.

Gali būti, kad ne visos pakuotės dydžiai bus pateikti į rinką. e ne visos pakuotės dydžiai bus pateikti į rinką.

- Farmacinis verslininkas ir gamintojas

Farmacinis verslininkas

MSD SHARP & DOHME GMBH

Lindenplatz 1

85540 Haar

Pašto adresas:

Pašto dėžutė 1202

85530 Haar

Tel.: 0800/673673673

Faksas: 0800/673673329

El. paštas: e-mail@msd.de

Bendrai platintojas:

DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH, 85530 Haar

Gamintojas

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą
peržiūrėtas 2017 m. rugpjūčio mėn.
Ar turite daugiau klausimų?
Prašome kreiptis į:
MSD informacijos centras:
Tel.: 0800/673673673
Faksas: 0800/673673329 El. paštas:
email@msd.de
Šį pakuotės lapelį taip pat galite rasti
akliesiems ir silpnaregiams skirtuose
formatuose pacientų informacijos tarnyboje
<http://www.patienteninfo-service.de/>.

Transtoyou