

Ulotka dołączona do opakowania: Informacje dla użytkownika

ECURAL® Maść tłusta

1mg/g krem

Substancja czynna: Mometazon furoinian (Ph.Eur.)

Przeczytaj uważnie całą ulotkę, zanim zaczniesz stosować ten lek, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

- Zachowaj tę ulotkę. Może zechcesz przeczytać ją ponownie.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Ten lek został przepisany wyłącznie Tobie. Nie przekazuj go innym osobom. Może zaszkodzić innym, nawet jeśli mają podobne objawy do Twoich.
- Jeśli zauważysz działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. są. Patrz punkt 4.

Co zawiera ta ulotka

1. Co to jest ECURAL maść tłusta i w jakim celu się ją stosuje?
2. Co należy wiedzieć przed zastosowaniem maści ECURAL?
3. Jak stosować maść ECURAL?
4. Jakie działania niepożądane mogą wystąpić? ?
5. Jak przechowywać maść ECURAL?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest ECURAL Fettcreme i do czego jest stosowana?

ECURAL Fettcreme zawiera jako substancję czynną mometazon furoinian, silnie działającą sztucznie wytworzoną formę kortyzonu (glikokortykosteroid). Krem jest stosowany zewnętrznie.

ECURAL Fettcreme jest stosowany do leczenia wszystkich zapalnych i swędzących chorób skóry, które reagują na zewnętrzne leczenie glikokortykosteroidami, takich jak łuszczyca (psoriasis), atopowe zapalenie skóry (neurodermitis) oraz podrażnieniowe i/lub alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (kontaktdermatitis). ECURAL Fettcreme to silnie działający, przeciwzapalny krem.

2. Co należy wiedzieć przed zastosowaniem ECURAL Fettcreme?

- ECURAL Fettcreme nie może być stosowany,

- jeśli jesteś uczulony na substancję czynną mometazonfuroinian, inne kortykosteroidy, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z wymienionych w punkcie 6. wymienionych innych składników tego leku.
- przy trądziku różowatym (rosacea) na twarzy
- przy trądziku pospolitym (acne vulgaris)
- przy ścięczeniu skóry (atrofia skóry)
- przy zapaleniu skóry wokół ust (zapalenie skóry wokół ust)
- przy swędzeniu skóry (świąd) w okolicy odbytu lub genitaliów
- przy odparzeniach pieluszkowych
- przy infekcjach skóry spowodowanych przez bakterie, np. wysypki skórne lub ropne, wirusy, np. półpasiec, opryszczka, brodawki, pasożyty lub grzyby, np. Candida lub dermatofity.
- przy ospie wietrznej
- przy reakcjach poszczeniennych
- przy gruźlicy
- przy kile

- na oku lub powiece (krem nie powinien dostać się do oka)
- na rany lub owrzodzenia skóry (owrzodzenia skórne).
- Ostrzeżenia i środki ostrożności Proszę skonsultować się z lekarzem

Proszę porozmawiać ze swoim lekarzem lub farmaceutą, zanim zastosujesz ECURAL maść tłustą.

- Jeśli stosujesz ECURAL maść tłustą na dużych powierzchniach ciała lub przez dłuższy czas, koniecznie skonsultuj się wcześniej z lekarzem (zobacz także punkt 3).
- Stosowanie w przypadku łuszczycy musi być ściśle kontrolowane przez lekarza.
- Unikaj jakiegokolwiek kontaktu z oczami. Działania niepożądane, które są zgłaszane dla lub wstrzykiwane (stosowane ogólnoustrojowo) szczególnie małych dzieci (dzieci). Dzieci. Jeśli wystąpi u Ciebie niewyraźne widzenie inne zaburzenia widzenia, skontaktuj się z lekarzem. Dzieci ECURAL maść tłusta nie powinna być stosowana u dzieci poniżej 2 roku życia, ponieważ brak jest wystarczających doświadczeń klinicznych.
- Dzieci ECURAL maść tłusta nie powinna być stosowana u dzieci poniżej 2 lat, ponieważ brak jest wystarczających doświadczeń klinicznych.
- Stosowanie ECURAL maści tłustej razem z innymi lekami

Poinformuj swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli stosujesz inne leki, niedawno stosowałeś inne leki lub zamierzasz stosować inne leki. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty oraz ziołowych lub homeopatycznych leków.

Podczas leczenia maścią tłustą ECURAL w okolicach narządów płciowych lub odbytu, z powodu zawartości białej wazeliny, może dojść do zmniejszenia wytrzymałości prezerwatyw lateksowych. Może to wpłynąć na bezpieczeństwo prezerwatywy. być.

- Ciąża i karmienie piersią

Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, podejrzewasz, że jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem tego leku zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty.

Ciąża Stosowanie maści tłustej ECURAL w czasie ciąży powinno odbywać się wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Jak w przypadku wszystkich glikokortykosteroidów stosowanych zewnętrznie, nie należy zapominać, że substancja czynna może dostać się do krwiobiegu nienarodzonego dziecka i wpływać na jego wzrost. Karmienie piersią

Okres karmienia piersią ECURAL maść tłusta może być stosowana w okresie karmienia piersią tylko po konsultacji z lekarzem. ECURAL maść tłusta nie może przy tym Glikokortykosteroidy są wydzielane do mleka matki. W przypadku leczenia wyższymi dawkami Glukokortykoidy są wydzielane do mleka matki. W przypadku leczenia wyższymi dawkami lub przez dłuższy czas jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią (patrz także punkt 3).

- Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

To nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności.

3. Jak należy stosować maść tłustą ECURAL?

Stosuj ten lek zawsze dokładnie według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Zapytaj lekarza lub farmaceutę, jeśli nie jesteś pewien. Maść tłusta ECURAL jest przeznaczona do stosowania na skórę.

Stosuj maść tłustą ECURAL raz dziennie. Maść tłusta ECURAL nakłada się cienko na zmienione chorobowo miejsca na skórze. Unikaj długotrwałego stosowania maści tłustej ECURAL, tzn. nie stosuj maści dłużej niż 3 tygodnie.

Stosowanie na twarzy nie powinno przekraczać 5 dni.

Unikaj również stosowania na dużych powierzchniach ECURAL maści tłustej, tzn.

nie stosuj maści na więcej niż 20% powierzchni ciała. W przypadku poprawy często zaleca się stosowanie słabszego glikokortykosteroidu.

Często tak zwana „terapia tandemowa” jest sensowna, tzn. raz dziennostosowanie ECURAL maści tłustej, a po 12 godzinach stosowanie odpowiedniej maści bez substancji czynnej.

Również leczenie w cotygodniowej zmianie ECURAL maści tłustej i maści bez substancji czynnej może być odpowiednie. (Zobacz także sekcja 2)

- Stosowanie u dzieci powyżej 2 lat
Dotychczas przeprowadzono wystarczające badania kliniczne dotyczące bezpiecznego stosowania ECURAL maści tłustej u dzieci przez okres 3 tygodni. Stosowanie ECURAL maści tłustej u dzieci powinno odbywać się przez możliwie najkrótszy okres leczenia przy najmniejszej skutecznej dawce. Czas stosowania wynosi dla dzieci powyżej 2 lat maksymalnie 3 tygodnie.

U dzieci ECURAL maść tłusta powinna być stosowana tylko na małych powierzchniach, tzn. na mniej niż 10% powierzchni ciała. Proszę skonsultować się z lekarzem

Proszę porozmawiać ze swoim lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz wrażenie, że działanie maści tłustej ECURAL jest zbyt silne lub zbyt słabe.

- Jeśli zastosowałeś większą ilość maści tłustej ECURAL niż powinieneś
Poinformuj natychmiast swojego lekarza. Jeśli maść tłusta ECURAL została przypadkowo połknięta lub w zbyt dużych ilościach lub przez zbyt długi czas była stosowana, może to prowadzić do pewnych schorzeń (np. zespół Cushinga), które wymagają leczenia.

Działanie jest tak niska, że w mało prawdopodobnym przypadku niezamierzonego połknięcia ma niewielki lub żaden szkodliwy wpływ. Jeśli zapomniłeś zastosować maść tłustą ECURAL

- Nie stosuj podwójnej ilości, jeśli zapomniłeś o poprzedniej aplikacji. Nadrób pominiętą aplikację tak szybko, jak to możliwe, a następnie wróć do swojego zwykłego rytmu stosowania. Jeśli

masz dalsze pytania dotyczące stosowania tego leku, skontaktuj się, jeśli zapomniłeś o poprzednim zastosowaniu. Wykonaj pominiętą aplikację tak szybko, jak to możliwe, a następnie wróć do swojego zwykłego rytmu stosowania.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania tego leku, skontaktuj się. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Jakie działania niepożądane są możliwe?

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W odniesieniu do częstości występowania działań niepożądanych stosuje się następujące kategorie:

Bardzo często:	więcej niż 1 na 10 leczonych
Często:	1 do 10 na 100 leczonych
Sporadycznie:	1 do 10 na 1.000 leczonych
Rzadko:	1 do 10 na 10.000 leczonych
Bardzo rzadko:	mniej niż 1 leczony na 10 000
Nieznane:	Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często występowały mrowienie i kłucie. Sporadycznie pojawiały się wypukłe grudki (tworzenie się grudek) i krosty.

Bardzo rzadko występowały zapalenia mieszków włosowych (zapalenie mieszków włosowych), uczucie pieczenia i swędzenie skóry (świąd). W przypadku następujących działań niepożądanych częstość nie jest znana:

Infekcja, czyrak, zaburzenia czucia (parestezje), wyprysk (kontaktowe zapalenie skóry), zmiana koloru skóry (hipopigmentacja), nadmierne owłosienie (hipertrichoza), rozstępy skórne (rozstępy), trądzikopodobne zapalenie skóry (trądzikopodobne zapalenie skóry), ścieńczenie skóry (atrofia skóry) i ból lub reakcje w miejscu aplikacji. Niewyraźne

widzenie występowało przy stosowaniu glikokortykoidów (częstość: nieznana). Następujące działania niepożądane występowały sporadycznie przy stosowaniu zewnętrznych glikokortykosteroidów i mogą również wystąpić przy stosowaniu ECURAL: Sucha skóra, podrażnienie skóry, zapalenie skóry (zapalenie skóry), zapalenie skórytywarzy (okołoustne zapalenie skóry), Rozmiękczenie skóry (maceracja skóry), potówki (miliaria), rozszerzenia naczyń skórnych (teleangiektazje) i wtórne infekcje (infekcje wtórne).

Może się zdarzyć, że glikokortykosteroidy zmieniają obraz kliniczny chorób i tym samym utrudniają ich rozpoznanie. *ungsbild von Krankheitsbildern verändern und dadurch deren Erkennung erschweren.*

Podobnie glikokortykosteroidy mogą opóźnić proces gojenia.

Inne możliwe działania niepożądane: uwodnione fosfolipidy z soi mogą bardzo rzadko wywoływać reakcje alergiczne. *ervorrufen.*

- Co należy zwrócić uwagę u dzieci?

Dzieci są szczególnie narażone na wystąpienie działań niepożądanych podczas leczenia glikokortykosteroidami (np. zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga).

Rozpoczęcie długoterminowego leczenia glikokortykosteroidami może mieć wpływ na wzrost i rozwój stosowanie kortykosteroidów może wpływać na wzrost i rozwój dzieci. Zgłaszanie działań niepożądanych

- Jeśli zauważysz działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem

Jeśli zauważysz działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce podane. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Federalnego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych, Dział Farmakowigilancji, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, strona internetowa: www.bfarm.de. Zgłaszając działania niepożądane, można przyczynić się do dostarczenia większej ilości informacji na temat bezpieczeństwa tego leku. Zgłaszając

działania niepożądane, można przyczynić się do dostarczenia większej ilości informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

5. Jak należy przechowywać maść tłustą ECURAL?

Przechowywać ten lek w miejscu niedostępnym dla dzieci niedostępny. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności jest podany na kartoniku lub na tubie po „Zużyć do”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

- Warunki przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

- Informacja o trwałości po otwarciu

Po otwarciu jest ECURAL maść tłusta jest ważna przez 3 miesiące i nie powinna być używana po tym okresie. Nie wyrzucaj leków do ścieków. Zapytaj swojego farmaceutę lub lokalne przedsiębiorstwo utylizacji, jak pozbyć się leku, jeśli go już nie potrzebujesz. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

- Co zawiera ECURAL maść tłusta

Substancja czynna jest mometazon furoinian (Ph.Eur.).

1g maści zawiera 1mg mometazonu furoinianu (Ph.Eur.).

Inne składniki to: wazelina biała; воск wybielony; skrobia poli{O-[wodor-(okt-1-en-1yl)succynylowa]}, sól glinowa; dwutlenek tytanu; uwodnione fosfolipidy z soi; kwas fosforowy 10%; woda oczyszczona; 2-metylo-2,4-pentanodiol. Jak wygląda ECURAL maść tłusta i zawartość

- opakowania

ECURAL maść tłusta jest białą maścią. ECURAL maść tłusta jest dostępna w opakowaniach po 10 g, 20 g, 25 g, 50 g i 100 g maści. biała maść. ECURAL maść tłusta jest dostępna w opakowaniach po 10 g, 20 g, 25 g, 50g i 100g maści. Możliwe, że nie wszystkie wielkości opakowań są wprowadzane do obrotu. e nie wszystkie

wielkości opakowań są wprowadzane do obrotu.

- Podmiot odpowiedzialny i producent

Podmiot odpowiedzialny
MSD SHARP & DOHME GMBH
Lindenplatz 1
85540 Haar
Adres korespondencyjny:
Skr. poczt. 1202
85530 Haar
Tel.: 0800/673673673
Fax: 0800/673673329
E-Mail: e-mail@msd.de

Dystrybutor:
DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH, 85530
Haar

Producent
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

Ulotka została ostatnio zaktualizowana w sierpniu 2017.

Masz dodatkowe pytania?

Proszę skontaktować się z:

Centrum Informacyjne MSD:

Tel.: 0800/673673673

Fax: 0800/673673329 E-Mail: email@msd.de

Ulotka ta jest również dostępna w formatach dla osób niewidomych i słabowidzących w serwisie PacjentInfo

<http://www.patienteninfo-service.de/>.