

Informații pentru utilizator: Informații pentru utilizatori

ECURAL® Cremă grasă

1mg/g Cremă

Substanța activă: Furoat de mometazonă (Ph.Eur.)

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a începe utilizarea acestui medicament, deoarece conține informații importante.

- Păstrați prospectul. S-ar putea să doriți să-l recitiți mai târziu.
- Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament v-a fost prescris personal. Nu-l dați altor persoane. Poate dăuna altor persoane, chiar dacă acestea par să aibă aceleași simptome ca și dumneavoastră.
- Dacă observați reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest lucru este valabil și pentru reacțiile adverse care nu sunt menționate în acest prospect sunt. Vezi secțiunea 4.

Ce conține acest prospect

1. Ce este ECURAL cremă grasă și pentru ce se utilizează?
2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza ECURAL cremă grasă?
3. Cum se utilizează ECURAL cremă grasă?
4. Ce reacții adverse sunt posibile?
5. Cum se păstrează ECURAL cremă grasă?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este ECURAL cremă grasă și pentru ce se utilizează?

ECURAL cremă grasă conține ca substanță activă furoat de mometazonă, o formă sintetică puternic activă a cortizonului natural (glucocorticoid). Crema este pentru uz extern.

ECURAL cremă grasă este utilizată pentru tratamentul tuturor afecțiunilor inflamatorii și pruriginoase ale pielii care răspund la tratamentul extern cu glucocorticoizi, cum ar fi psoriazisul, dermatita atopică și dermatita de contact iritantă și/sau alergică.

ECURAL cremă grasă este o cremă antiinflamatoare puternică.

2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza ECURAL cremă grasă?

- ECURAL cremă grasă nu trebuie utilizată
- dacă sunteți alergic la substanța activă furoat de mometazonă, alte

corticosteroizi, soia, arahide sau la oricare dintre celelalte componente menționate la punctul 6. menționate ale acestui medicament.

- în cazul rozaceei (cupru) pe față
- în cazul acneei (acneea vulgară)
- în caz de subțiere a pielii (atrofie cutanată)
- în caz de inflamație a pielii în jurul gurii (dermatită periorală)
- în caz de mâncărime a pielii (prurit) în zona anală sau genitală
- în caz de erupție de scutec
- în caz de infecții ale pielii cauzate de bacterii, de exemplu, erupții cutanate sau purulente, virusi, de exemplu, zona zoster, herpes, negi, paraziți sau ciuperci, de exemplu, Candida sau dermatofiți.
- în caz de varicelă
- în caz de reacții la vaccin
- în caz de tuberculoză
- în caz de sifilis

- la ochi sau pe pleopă (crema nu trebuie să ajungă în niciun caz în ochi)
- pe răni sau ulceratii cutanate (ulceratii cutanate).
- Avertismente și măsuri de precauție

Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacist, înainte de a utiliza ECURAL cremă grasă.

- Dacă utilizați ECURAL cremă grasă pe suprafețe mari ale corpului sau pe o perioadă mai lungă de timp, trebuie să consultați neapărat medicul dumneavoastră înainte (vezi de asemenea secțiunea 3).
- O utilizare în cazul psoriazisului trebuie să fie monitorizată atent de către un medic.
- Evitați orice contact cu ochii. Efectele secundare raportate pentru corticosteroizii administrați oral sau injectați (utilizați sistemic), inclusiv funcția redusă a glandelor suprarenale, pot apărea și în cazul utilizării externe. Acest lucru este valabil în special pentru sugari și copii. Dacă aveți vedere încețoșată Dacă aveți vedere încețoșată alte tulburări de vedere, adresați-vă medicului dumneavoastră. Copii
- Copii
- Utilizarea ECURAL cremă grasă împreună cu alte medicamente
- Utilizarea cremei grase ECURAL împreună cu alte medicamente

Informați medicul sau farmacistul dumneavoastră dacă utilizați alte medicamente, ați utilizat recent alte medicamente sau intenționați să utilizați alte medicamente. Acest lucru este valabil și pentru medicamentele fără prescripție medicală și pentru cele pe bază de plante sau homeopaticile medicamente.

În timpul tratamentului cu ECURAL cremă grasă în zona genitală sau anală, din cauza excipientului vaselină albă, poate apărea o reducere a rezistenței la rupere a prezervativelor din latex. Astfel, siguranța prezervativelor poate fi afectată.ă.

- Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, sau dacă bănuiți că sunteți gravidă, sau intenționați să rămâneți gravidă, întrebați medicul sau farmacistul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament.

Sarcina Aplicarea ECURAL cremă grasă în timpul sarcinii trebuie să aibă loc doar după consultarea medicului dumneavoastră. Ca și în cazul tuturor glucocorticoizilor aplicați extern, la femeile gravide nu trebuie neglijat faptul că substanța activă poate ajunge în circulația sanguină a copilului nenăscut și poate influența creșterea acestuia. poate ajunge în fluxul sanguin al copilului nenăscut și poate influența creșterea copilului nenăscut.

Perioada de alăptare în zona sânilor. Glucocorticoizii sunt excretați în laptele matern. Dacă este necesar un tratament cu doze mai mari de glucocorticoizi, trebuie luate măsuri de precauție adecvate. sau pe o perioadă mai lungă de timp, alăptarea trebuie întreruptă (vezi și secțiunea 3).

- Vehicularea și capacitatea de a folosi utilaje

Este nu sunt necesare măsuri de precauție speciale.

3. Cum se utilizează crema grasă ECURAL?

Utilizați acest medicament întotdeauna exact conform indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului. Întrebați medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Crema grasă ECURAL este destinată aplicării pe piele.

Aplicați crema grasă ECURAL o dată pe zi.

Crema grasă ECURAL se aplică subțire pe zonele afectate ale pielii.

Evitați utilizarea pe termen lung a cremei grase ECURAL, adică nu aplicați crema grasă mai mult decât 3 săptămâni.

O aplicare pe față nu ar trebui să depășească o durată de 5 zile.

Evitați, de asemenea, o aplicare pe suprafețe maride ECURAL cremă grasă, adică nu aplicați crema grasă pe mai mult de 20% din

suprafața corpului. La ameliorare, este adesea recomandată utilizarea unui glucocorticoid mai slab.

Adesea este utilă așa-numita „terapie tandem”, adică o dată pe zi aplicarea de ECURAL cremă grasă și după 12 ore aplicarea unei creme adecvate fără substanță activă. De asemenea, poate fi potrivit un tratament alternant săptămânal cu ECURAL cremă grasă și o cremă fără substanță activă. (Vezi și secțiunea 2)

- Utilizare la copii peste 2 ani

Există suficiente studii clinice privind utilizarea sigură a ECURAL cremă grasă la copii pentru o durată de 3 săptămâni. Utilizarea ECURAL cremă grasă la copii ar trebui să se facă pe o perioadă cât mai scurtă posibil, cu doza eficientă minimă. Durata utilizării este desă fie efectuată pe o perioadă de tratament cu cea mai mică doză eficientă posibilă. Durata utilizării este pentru copii peste 2 ani, maximum 3 săptămâni. La copii, ECURAL cremă grasă ar trebui aplicată doar pe suprafețe mici, adică pe mai puțin de 10% din suprafața corpului. ar putea fi.

Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul, dacă aveți impresia că efectul ECURAL cremă grasă este prea puternic sau prea slab.

- Dacă ați aplicat o cantitate mai mare de ECURAL cremă grasă decât ar trebui

Informați-vă imediat medicul.

Dacă ECURAL cremă grasă a fost ingerată din greșeală sau în cantități prea mari sau pe o perioadă prea lungă de timp, aceasta poate duce la anumite afecțiuni (de exemplu, sindromul Cushing) care trebuie tratate. Efectul este atât de scăzut, încât în cazul puțin probabil al unei ingestii accidentale are puțin sau niciun efect nociv. Dacă ați uitat să aplicați ECURAL cremă grasă

- Nu aplicați o cantitate dublă

Nu utilizați doza dublă dacă ați uitat aplicarea anterioară. Aplicați doza uitată cât mai curând posibil și apoi reveniți la ritmul obișnuit de aplicare. Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-, dacă ați uitat aplicarea anterioară.

Efectuați aplicarea uitată cât mai curând posibil și apoi reveniți la ritmul obișnuit de aplicare.

medicului dumneavoastră. n consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

4. Ce reacții adverse sunt posibile?

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Pentru frecvența reacțiilor adverse sunt utilizate următoarele categorii:

Foarte frecvente: mai mult de 1 din 10 pacienți

Frecvente: 1 până la 10 pacienți din 100

Ocazionale: 1 până la 10 pacienți din 1.000

Rare: 1 până la 10 pacienți din 10.000

Foarte rare: mai puțin decât 1 pacient din 10.000

Necunoscut: Frecvența nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile

Frecvent au apărut furnicături și înțepături.

Ocazional au apărut noduli ridicați (formare de papule) și pustule.

Foarte rar au apărut inflamații ale foliculilor de păr (foliculită), senzație de arsură și mâncărime a pielii (prurit). Pentru următoarele reacții adverse nu este cunoscută frecvența:

Infecție, furuncul, senzație anormală (parestezie),

Eczemă (dermatită de contact), schimbare de culoare a pielii

(hipopigmentare), pilozitate excesivă (hipertricoză), formare de striții pe piele

(striae cutanate), inflamație a pielii

asemănătoare acneei (dermatită acneiformă), subțierea pielii (atrofie cutanată) și durere sau

reacții la locul de aplicare. Vedere încețoșată a apărut la utilizarea glucocorticoizilor

(frecvență: necunoscută). oiden pe (Frecvență: Necunoscută).

pe față (dermatită periorală), Înmuiera pielii (macerare cutanată), miliaria, dilatarea vaselor de sânge ale pielii (telangiectazii) și infecții secundare.

Înmuierea pielii (macerarea pielii), miliaria, dilatarea vaselor de sânge ale pielii (telangiectazii) și infecții secundare.

Se poate întâmpla ca glucocorticoizii să modifice aspectul unor afecțiuni și astfel să îngreuneze recunoașterea acestora.

De asemenea, glucocorticoizii pot întârzia procesul de vindecare.

Alte posibile efecte secundare: Fosfolipidele hidrogenate din soia pot provoca foarte rar reacții alergice.

- Ce trebuie luat în considerare la copii?

Copiii sunt deosebit de expuși riscului de a dezvolta efecte secundare sub tratament cu glucocorticoizi (de exemplu, suprimarea axei hipotalamus-hipofiză-suprarenale, sindromul Cushing).

Un tratament pe termen lung cu corticosteroizi poate avea efecte asupra creșterii și dezvoltării

copiilor. Raportarea efectelor secundare

- Dacă observați efecte secundare, adresați-vă medicului dumneavoastră

Dacă observați reacții adverse, contactați medicul dumneavoastră sau farmacist. Acest lucru este valabil și pentru reacțiile adverse care nu sunt menționate în acest prospect sunt.

Puteți raporta reacțiile adverse direct la Institutul Federal pentru Medicamente și Produse Medicale, Dept. Farmacovigilență, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații despre siguranța acestui medicament. gen raportați, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează ECURAL Cremă grasă?

Păstrați acest medicament departe de copii inaccesibil.

Nu trebuie să utilizați acest medicament după data de expirare indicată. Data de expirare este menționată pe cutie sau pe tub după „Utilizabil până la”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii indicate.

- Condiții de păstrare

Nu păstrați la temperaturi peste 25 °C.

- Indicație privind termenul de valabilitate după deschidere

După deschidere este ECURAL Cremă grasă este valabilă 3 luni și nu trebuie utilizată ulterior. Nu aruncați medicamentele în apa uzată. Întrebați farmacistul dumneavoastră sau serviciul local de eliminare a deșeurilor cum să eliminați medicamentul dacă nu mai aveți nevoie de el. Astfel contribuiți la protecția mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

- Ce conține ECURAL Cremă grasă
Substanța activă este furoatul de mometazonă (Ph.Eur.).
1g cremă conține 1mg furoat de mometazonă (Ph.Eur.).

Celelalte componente sunt: vaselină albă; ceară albă; amidon succinat de aluminiu; dioxid de titan; fosfolipide hidrogenate din soia; acid fosforic 10%; apă purificată; 2-metilpentan-2,4-diol. Cum arată ECURAL Cremă grasă și conținutul

- ambalajului
ECURAL Cremă grasă este o cremă albă. ECURAL Cremă grasă este disponibilă în ambalaje de 10 g, 20 g, 25 g, 50g și 100g cremă. o cremă albă. ECURAL Cremă grasă este disponibilă în pachete de 10 g, 20 g, 25 g, 50g și 100g cremă. Este posibil să nu fie puse în circulație toate dimensiunile pachetelor. e nu toate dimensiunile pachetelor sunt puse în circulație.

- Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

MSD SHARP & DOHME GMBH

Lindenplatz 1

85540 Haar

Adresă poștală:

Căsuța poștală 1202

85530 Haar

Tel.: 0800/673673673

Fax: 0800/673673329

E-Mail: e-mail@msd.de

Distribuitor asociat:

DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH, 85530
Haar

Producător
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în
august 2017.

Aveți întrebări suplimentare?

Vă rugăm să contactați:

MSD Infocenter:

Tel.: 0800/673673673

Fax: 0800/673673329 E-Mail: email@msd.de

Găsiți acest prospect și în formate pentru
nevăzători și persoane cu deficiențe de
vedere pe serviciul de informații pentru
pacienți [http://www.patienteninfo-
service.de/](http://www.patienteninfo-service.de/).

Transtoyou