

Pakendi infoleht: teave kasutajale
ESTRAMON® 50 µg/24 h, transdermaalne plaaster

estradiool

Lugege see infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
See ravim on määratud ainult teile. Ärge andke seda teistele. See võib neid kahjustada, isegi kui nende haigusnähud on samad mis teil.
Kui te märkate kõrvaltoimeid, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See hõlmab ka võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Vt lõik 4.

Mis on selles infolehes

1. Mis on ESTRAMON 50 ja milleks seda kasutatakse.
2. Mida on vaja teada enne ESTRAMON 50 kasutamist.
3. Kuidas ESTRAMON 50 kasutada.
4. Võimalikud kõrvaltoimed.
5. Kuidas ESTRAMON 50 säilitada.
6. Pakendi sisu ja muu teave.

1. Mis on ESTRAMON 50 ja milleks seda kasutatakse.

ESTRAMON 50 on preparaat hormoonasendusraviks (HAR). See sisaldab naissuguhormooni östrogeeni.

ESTRAMON 50 kasutatakse naistel pärast menopausi, kelle viimane menstruaaltsükkel (menopaus) lõppes vähemalt 12 kuud tagasi.

ESTRAMON 50 kasutatakse:

Menopausijärgsete sümptomite leevendamiseks

Menopausi ajal väheneb organismi enda östrogeeni tootmine. See võib põhjustada sümptomeid nagu kuumahood näos, kaelas ja rinnus. ESTRAMON 50 leevendab selliseid sümptomeid, mis tekivad pärast menopausi. ESTRAMON 50 määratakse teile ainult siis, kui teie sümptomid mõjutavad oluliselt teie igapäevast elukvaliteeti.

Osteoporoosi ennetamine

Pärast menopausi võivad mõnede naiste luud muutuda hapraks (osteoporoos). Te peaksite arutama kõiki saadaolevaid ravivõimalusi oma arstiga. ESTRAMON 50 saate kasutada osteoporoosi arengu ennetamiseks pärast menopausi, kui teil on suurenenud risk osteoporoosiga seotud luumurdude tekkeks ja teised ravimid ei sobi teile.

Kogemused üle 65-aastaste naiste ravis on piiratud.

2. Mida peate teadma enne ESTRAMON 50 kasutamist.
Meditiiniline ajalugu ja regulaarsed kontrollid

Hormoonasendusravi on seotud teatud riskidega, mida tuleks kaaluda enne ravi alustamist või jätkamist.

Kogemused enneaegse menopausiga naiste (munasarjade talitlushäire või kirurgilise eemaldamise tõttu) ravis on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad hormoonasendusravi riskid erineda teiste naiste omadest. Palun konsulteerige oma arstiga selle kohta.

Enne hormoonasendusravi alustamist (või taasalustamist) kogub teie arst teie enda ja teie perekonna meditsiinilise ajaloo. Teie arst otsustab, kas füüsiline läbivaatus on vajalik. Vajadusel võib see hõlmata rindade ja/või kõhu läbivaatust.

Kui olete alustanud hormoonasendusravi, peaksite regulaarselt (vähemalt kord aastas) käima arsti juures kontrollis. Nende läbivaatuste ajal arutage palun oma arstiga ESTRAMON 50 ravi jätkamise eeliseid ja riske.

Palun käige regulaarselt oma arstiga kokkulepitud rindade sõeluuringutel.

Ärge kasutage ESTRAMON 50

kui mõni järgmistest tingimustest kehtib teie kohta. Kui te pole kindel, kas see on nii, rääkige palun oma arstiga enne ESTRAMON 50 kasutamist.

Ärge kasutage ESTRAMON 50, kui

- teil on või on varem olnud rinnavähk või kui te kahtlustate, et teil on rinnavähk
- teil on vähk, mille kasv sõltub östrogeenidest, näiteks emaka limaskesta vähk (endomeetrium) või vastav kahtlus
- esineb teadmata põhjusega tupeverejooks
- on ravimata emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia)
- teil on või on varem olnud verehüüve veenis (tromboos), näiteks jalgades (süvaveenitromboos) või kopsudes (kopsuemboolia).
- Teil on vere hüübimishäire (näiteks valgu C, valgu S või antitrombiini puudulikkus)
- teil on või on varem olnud arterites verehüüvetest põhjustatud häire, nagu näiteks südameatakk, insult või äkiline rindkere pingutus ja valu (stenokardia)
- teil on maksahaigus või olete varem põdenud maksahaigust ja teie maksafunktsiooni väärtused ei ole veel normaliseerunud
- teil on haruldane, pärilik verehaigus, mida tuntakse porfüüria nime all
- teil on allergia (talumatus) östradioli, soja, maapähklite või mõne muu selle ravimi koostisosa suhtes, mis on loetletud jaotises 6.

Kui mõni ülaltoodud seisunditest tekib esmakordselt ESTRAMON 50 kasutamise ajal, lõpetage ravi kohe ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstiga enne, kui teil on kunagi olnud mõni allpool loetletud terviseprobleem, kuna need võivad ravi ajal ESTRAMON 50-ga korduda või süveneda. Järgmiste juhtumite korral peaksite sagedamini arsti juures kontrollis käima:

- emaka healoomulised kasvaja (müoomid)

- emaka limaskesta kasv väljaspool emakat (endometriosis) või eelnev emaka limaskesta liigne kasv (endomeetriumi hüperplaasia)
- suurenenud vere hüübimise oht (vt 'venoossed verehüübed [tromboosid]')
- suurenenud östrogeenist sõltuva vähi risk (kui näiteks teie emal, õel või vanaemal oli rinnavähk)
- kõrge vererõhk
- maksahaigused, näiteks healoomuline maksakasvaja
- diabeet
- sapikivid
- migreenid või tugevad peavalud
- immuunsüsteemi häire, mis mõjutab paljusid keha organite funktsioone (süsteemne erütematoosne luupus [SLE])
- epilepsia
- astma
- häire, mis mõjutab kuulmekilet ja kuulmist (otoskleroos)
- väga kõrge vere lipiidide tase (triglütseriidid)
- vedelikupeetus südame- või neeruhaiguse tagajärjel
- kaasasündinud (pärilik) või omandatud angioödeem

Te peate ravi kohe katkestama ja arstiga nõu pidama

kui hormoonasendusravi ajal esineb mõni järgmistest häiretest või olukordadest:

- häired, mis on mainitud jaotises 'Ärge kasutage ESTRAMON 50'
- naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi). See võib viidata maksahaigusele.
- näo, keele ja/või kurgu turse, vastavalt neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisprobleemidega, mis viitavad angioödeemile.
- märkimisväärne vererõhu tõus (sümptomiteks võivad olla peavalud, väsimus ja pearinglus)
- migreenilaadsed peavalud, mis esinevad esmakordselt
- kui te rasestute
- kui märkate verehüüvete märke, nagu
 - valulik jalgade turse ja punetus
 - äkiline valu rinnus
 - hingamisraskused

Lisainformatsiooni leiate jaotisest 'venoossed verehüübed (tromboosid)'.

Pange tähele: ESTRAMON 50 ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud vähem kui 12 kuud või kui olete alla 50-aastane, võib olla vajalik kasutada täiendavaid rasestumisvastaseid meetodeid. Küsige nõu oma arstilt.

Hormoonasendusravi ja vähk

Emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähk (endomeetriumi vähk)

Emaka limaskesta liigse paksenemise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähi (endomeetriumi vähk) risk suureneb östrogeenmonoteraapia ajal.

Gestageeni kasutamine/ manustamine lisaks östrogeenravi ajal vähemalt 12 päeva iga 28-päevase tsükli jooksul kaitseb teid selle täiendava riski eest. Seega, kui teie emakas on endiselt alles, määrab teie arst ka gestageeni. Kui teie emakas on eemaldatud (hüsterektoomia), rääkige

oma arstiga, kas saate ohutult kasutada ESTRAMON 50 ilma gestageeni lisaks võtmata/kasutamata.

Keskmiselt diagnoositakse 5-l 1000-st naisest, kellel on emakas alles ja kes ei kasuta hormoonasendusravi, emaka limaskesta vähk vanuses 50 kuni 65 aastat. Seevastu naiste seas, kellel on emakas alles ja kes saavad hormoonasendusravi östrogeenmonopreparaadiga, diagnoositakse 10 kuni 60 emaka limaskesta vähi juhtu 1000-st naisest vanuses 50 kuni 65 aastat, sõltuvalt annusest ja ravi kestusest (st 5 kuni 55 lisajuhtu).

Ootamatu verejooks

Estramon 50 kasutamise ajal tekib kord kuus verejooks (nn ärajäämisverejooks). Kui aga kogete ootamatut verejooksu või määrimist väljaspool menstruatsiooniperioodi, mis jätkub

- kauem kui esimesed 6 kuud ravi ajal
- ja algab pärast ESTRAMON 50 kasutamist rohkem kui 6 kuud
- pärast ravi lõpetamist,

palun konsulteerige oma arstiga nii kiiresti kui võimalik.

Rinnavähk

Saadaval olevad andmed näitavad, et hormoonasendusravi (HAR) östrogeeni ja gestageeni kombinatsiooniga või östrogeenmonoteraapia HAR jaoks suurendab rinnavähi riski. Täiendav risk sõltub HAR kestusest ja on ilmne 3 aasta jooksul pärast kasutamist. Pärast HAR lõpetamist väheneb täiendav risk aja jooksul; see risk võib siiski püsida 10 aastat või kauem, kui olete HAR-i kasutanud rohkem kui 5 aastat.

Võrdluseks

50-54-aastastel naistel, kes ei kasuta HAR-i, diagnoositakse keskmiselt 13 kuni 17 rinnavähi juhtu 1000-st naisest 5-aastase perioodi jooksul.

50-aastaste naiste seas, kes alustavad HAR-i östrogeenmonopreparaadiga 5-aastase perioodi jooksul, on 16 kuni 17 juhtu 1000-st kasutajast (st 0 kuni 3 lisajuhtu).

50-aastaste naiste seas, kes alustavad HAR-i östrogeeni ja gestageeniga 5-aastase perioodi jooksul, on 21 juhtu 1000-st kasutajast (st 4 kuni 8 lisajuhtu).

50-59-aastastel naistel, kes ei kasuta HAR-i, diagnoositakse keskmiselt 27 rinnavähi juhtu 1000-st naisest 10-aastase perioodi jooksul.

50-aastaste naiste seas, kes alustavad HAR-i östrogeenmonopreparaadiga 10-aastase perioodi jooksul, on 34 juhtu 1000-st kasutajast (st 7 lisajuhtu).

50-aastaste naiste seas, kes alustavad HAR-i östrogeeni ja gestageeniga 10-aastase perioodi jooksul, on 48 juhtu 1000-st kasutajast (st 21 lisajuhtu).

Kontrollige oma rindu regulaarselt. Konsulteerige oma arstiga, kui märkate oma rindades mingeid muutusi, näiteks

- sissevajumised (lohud) nahas
- nibude muutused
- tükid, mida saate näha või tunda

Kui teil on võimalus osaleda rinnavähi varajase avastamise programmis (mammograafia sõeluuringu programm), peaksite seda võimalust kasutama. Palun teavitage mammograafiat teostavat spetsialisti, et te võtate hormoonasendusravimeid. Hormoonasendusraviga seotud ravimid võivad suurendada rinnakoe tihedust ja seega mõjutada mammograafia tulemust. Kui rinnakoe tihedus on suurenenud, ei pruugi olla võimalik kõiki muutusi avastada.

Munasarjavähk

Munasarjavähk on haruldane - palju haruldasem kui rinnavähk. Östrogeeni monopreparaatide või kombineeritud östrogeeni-gestageeni preparaate kasutamine hormoonasendusraviks on seotud veidi suurenenud munasarjavähi riskiga. Munasarjavähi tekkimise risk muutub vanusega.

50-54-aastaste naiste seas, kes ei kasuta HRT-d, diagnoositakse rinnavähk 5-aastase perioodi jooksul keskmiselt umbes 2 juhul 2000 naise kohta. Hormoonasendusravi kasutavate naiste seas rohkem kui 5 aastat on umbes 3 juhtumit 2000 kasutaja kohta (st umbes 1 lisajuhtum).

Hormoonasendusravi kardiovaskulaarsed mõjud

Venoossed verehüübed (tromboosid)

Verehüüvete tekkimise risk veenides (tromboosid) on umbes 1,3 kuni 3 korda suurem hormoonasendusravi kasutavate naiste seas kui mittekasutajate seas. Risk on eriti kõrge esimesel kasutusaastal.

Verehüübed võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi. Kui verehüüve liigub kopsudesse, võib see põhjustada rindkere pinget, hingeldust, minestamist või isegi surma.

Teil on suurem tõenäosus verehüübe tekkeks, kui vananete ja kui mõni järgmistest tingimustest kehtib teie kohta. Palun rääkige oma arstiga, kui mõni järgmistest olukordadest kehtib teie kohta:

- kui te ei saa suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikemat aega kõndida (vt ka jaotis 3 pealkirja all 'kui teile on plaanitud operatsioon')
- kui olete märkimisväärselt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m²)
- kui teil on verehüübimishäire, mis nõuab pikaajalist ravimit verehüüvete vältimiseks
- kui mõnel teie lähedasel sugulasel on kunagi olnud verehüüve jalas, kopsus või muus elundis
- kui teil on süsteemne erütematoosne luupus (SLE)
- kui teil on vähk.

Verehüüvete tunnuste kohta vaadake 'te peate ravi kohe katkestama ja arstiga rääkima'.

Võrdluseks

Vaadates 50ndates eluaastates naisi, kes kasutavad hormoonasendusravi, võib eeldada, et 4 kuni 7 naist 1 000-st arendab järgmise 5 aasta jooksul venoosse verehüübe.

50ndates eluaastates naiste seas, kes on kasutanud 5 aastat hormoonasendusravi östrogeeni monopreparaadiga, esineb 9 kuni 12 tromboosi juhtu 1 000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).

50ndates eluaastates naiste seas, kellel on emakas eemaldatud ja kes on kasutanud 5 aastat hormoonasendusravi östrogeeni monopreparaadiga, esineb 5 kuni 8 tromboosi juhtu 1 000 kasutaja kohta (st 1 lisajuhtum).

Südamehaigus (südameatakk)

Puuduvad tõendid selle kohta, et hormoonasendusravi ennetaks südameatakki.

Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad kombineeritud hormoonasendusravi östrogeeni ja gestageeniga, on veidi suurem tõenäosus südamehaiguse tekkeks kui neil, kes ei kasuta hormoonasendusravi.

Südamehaiguse tekkerisk ei ole suurenenud naistel, kellel on emakas eemaldatud ja kes kasutavad ainult östrogeene.

Insult

Insuldi risk on umbes 1,5 korda suurem naistel, kes kasutavad hormoonasendusravi, võrreldes nendega, kes ei kasuta. Hormoonasendusravist tingitud lisainsultide arv suureneb vanusega.

Võrdluseks

Vaadates 50ndates eluaastates naisi, kes ei kasuta hormoonasendusravi, võib 5-aastase perioodi jooksul oodata 8 insulti 1 000 naise kohta. 50ndates eluaastates naiste seas, kes kasutavad hormoonasendusravi, esineb 11 juhtu 1 000 kasutaja kohta (st 3 lisajuhtu).

Muud häired

- Hormoonasendusravi ei ennetata mäluhäireid. On mõningaid tõendeid suurenenud mäluhäirete riski kohta naistel, kes on hormoonasendusravi alustamisel üle 65-aastased. Küsige nõu oma arstilt.
- Patsiendid, kellel on neeru- või südamefunktsiooni häired: Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust kehas; seetõttu, kui teil on südame- või neerufunktsiooni häired, tuleks teid hoolikalt jälgida. Kui teil on raske neerufunktsiooni häire, tuleks teid hoolikalt jälgida, kuna vereringes olevate östrogeenide tase võib suurened.
- Patsiendid, kellel on teatud lipiidide ainevahetuse häire (hüpertriglütserideemia): Kui teil on kõrgeenenud vere lipiidide tase (triglütseriidid), tuleks teie vere lipiidide taset hoolikalt jälgida ESTRAMON 50 ravi ajal, kuna harvadel juhtudel on täheldatud järsku vere triglütseriidide tõusu koos sellele järgneva pankrease põletikuga seoses östrogeenraviga.
- On teada, et kõikide nahale kantavate ravimite puhul võib tekkida kontaktallergia. Kuigi see on äärmiselt haruldane, võib see viia tõsiste allergiliste reaktsioonideni, kui jätkate ravimi kasutamist.

Pediaatriline populatsioon

ESTRAMON 50 ei tohi kasutada lastel.

ESTRAMON 50 kasutamine koos teiste ravimitega

Teatud ravimid võivad ESTRAMON 50 toimet nõrgendada. See võib põhjustada ebaregulaarset veritsust. Nende hulka kuuluvad järgmised ravimid:

- Epilepsiaravimid, mis sisaldavad näiteks fenobarbitaali, fenütoiini või karbamasepiini
- Tuberkuloosiravimid, mis sisaldavad näiteks rifampitsiini või rifabutiini
- teatud HIV-infektsioonide ravimid, mis sisaldavad näiteks nevirapiini, efavirensi, ritonaviiri või nelfinaviiri
- taimsed ravimid, mis sisaldavad naistepuna (*Hypericum perforatum*)
- muud infektsioonide ravimid, mis sisaldavad näiteks ketokonasooli või erütromütsiini.

Hormoonasendusravi võib mõjutada teiste ravimite toimet:

- Epilepsiaravimid (lamotrigiin), kuna see võib põhjustada krampide sageduse suurenemist.
- Ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri kombinatsioonravi koos dasabuviiriga või ilma, samuti glekapreviiri/pibrentasviiri ravi C-hepatiidi viiruse (HCV) vastu võib põhjustada maksaväärtuste tõusu vereanalüüsides (maksasaensüümi ALAT tõus) naistel, kes kasutavad CHD-ravi etünnüülöstradiooliga. ESTRAMON 50 sisaldab östradiooli etünnüülöstradiooli asemel. Ei ole teada, kas maksasaensüümi ALAT tõus võib tekkida, kui kasutada ESTRAMON 50 koos selle kombinatsioonraviga HCV vastu.

Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te võtate/kasutate teisi ravimeid, kui olete hiljuti võtnud/kasutanud teisi ravimeid või kui kavatsete võtta/kasutada teisi ravimeid; isegi kui need on käsimüügiravimid, taimsed preparaadid või looduslikud ravimid. Teie arst annab teile hea meelega nõu.

Laboratoorsed testid

Kui teil on vaja teha vereanalüüs, teavitage oma arsti või laboritöötajaid, et kasutate ESTRAMON 50, kuna see ravim võib mõjutada teatud laboratoorsete testide tulemusi.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

ESTRAMON 50 on mõeldud ainult postmenopausis naistele. Kui jääte rasedaks, lõpetage ESTRAMON 50 kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Imetamine

Ärge kasutage ESTRAMON 50 imetamise ajal.

Mõju autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele

ESTRAMON 50 ei ole teadaolevalt mõjutanud autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet.

3. Kuidas kasutada ESTRAMON 50.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Teie arst püüab määrata madalaima annuse, mis on vajalik teie sümptomite raviks võimalikult lühikese aja jooksul. Palun rääkige oma arstiga, kui teil on tunne, et ESTRAMON 50 toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kuidas kasutada ESTRAMON 50.

ESTRAMON 50 võib kasutada pidevalt (ilma pausita) või tsükliliselt (21 päeva kasutamist, millele järgneb 7-päevane paus). Naistel, kellel on emakas alles, tuleb ESTRAMON 50 ravi kombineerida sobiva gestageeni annusega (mille määrab arst) vähemalt 12-14 päeva jooksul iga 28-päevase tsükli jooksul (vt ka jaotis 2).

Gestageeni lisamine ei ole soovitatav naistele, kellel on emakas eemaldatud, välja arvatud juhtudel, kui on diagnoositud emaka limaskestast kasv väljaspool (endometriosis) (vt ka jaotis 2).

Pidev ESTRAMON 50 kasutamine on võimalik naistel pärast emaka eemaldamist või kui östrogeenipuuduse sümptomid ilmnevad tugevalt ravi vabaperioodil.

Esimestel ravikuudel võib esineda ebaregulaarset veritsust või määrimist. Kui teil esineb tugev veritsus või kui veritsus või määrimine jätkub pärast esimesi ravikuusid, teavitage palun oma arsti, et vajadusel saaks ravi kohandada (vt jaotis 2, 'ootamatu veritsus').

Manustamisviis

Transdermaalseks manustamiseks (naha külge kleepimiseks)

ESTRAMON 50 plaastrit kantakse kaks korda nädalas, st kasutatud plaaster asendatakse uuega iga 3 või 4 päeva järel.

Kohta, kuhu transdermaalne plaaster kantakse, tuleks iga uue plaastriga muuta. Kõige sobivamad piirkonnad plaastri jaoks on vöökohast allpool, kus nahk ei kortsu palju. ESTRAMON 50 ei tohi kanda rindadele ega nende lähedusse! Valitud nahapiirkond peab olema puhas, rasvavaba, kuiv ja kahjustamata. Transdermaalne plaaster tuleks kanda kohe, kui see on kotist eemaldatud. Kui võimalik, ärge puudutage kleepuvat pinda.

1. Transdermaalsed plaastrid on individuaalselt pakitud. Vahetult enne kasutamist rebige pakend lahti sisselõike juurest koti nurgas ja eemaldage transdermaalne plaaster seda kahjustamata. (Joonis 1)
2. Painutage transdermaalselt plaastrit ettevaatlikult üles ja alla mööda lõikejoont, kuni eemaldatav kile eraldub transdermaalse plaastri kleepuvast pinnast mööda perforeeritud joont. Nüüd eemaldage osa lõigatud eemalduskilest plaastri tagaküljelt. (Joonis 2)
3. Kinnitage vabastatud kleepuv pind tervislikule, puhastatud nahapiirkonnale alakõhul või puusa tagaküljel. (Joonis 3)
4. Seejärel tõstke veidi transdermaalse plaastri külgnevat osa, eemaldage ülejäänud eemalduskile ja kleepige transdermaalne plaaster täielikult peale. (Joonis 4)
5. Pärast pealekandmist vajutage transdermaalne plaaster kindlalt alla peopesaga ja hoidke seda umbes 10 sekundit. (Joonis 5)

Ärge jätke transdermaalselt plaastrit otsese päikesevalguse kätte. ESTRAMON 50 kleepub hästi nahale ka vannis, duši all või füüsilise tegevuse ajal.

Kui plaaster tuleb enneaegselt lahti (enne 3 või 4 päeva lõppu), kas osaliselt või täielikult, asendage see uue transdermaalse plaastriga.

Kontrollige, kas plaastri ebapiisav kleepumine on tingitud pealekandmisvigadest. Harvadel juhtudel võib kleepuvust mõjutada individuaalne nahaseisund.

Ravi algus

Kui te

- ei kasuta praegu hormoonasendusravi või kui olete kasutanud östrogeeni – võimalik, et koos gestageeniga – katkematult, võite alustada ESTRAMON 50 raviga igal päeval.

Kui te

- olete kasutanud östrogeeni regulaarselt 21 päeva - viimased 12-14 päeva koos gestageeniga - ja seejärel teinud 7-päevase pausi; või kui te
- olete kasutanud östrogeeni katkematult, kuid olete kasutanud gestageeni viimased 12-14 päeva iga 28-päevase tsükli jooksul,

peaksite lõpetama praeguse ravitsükli enne ESTRAMON 50 ravi alustamist.

Esimene päev pärast eelneva ravi lõppu (katkematu kasutamise korral) või esimene päev pärast ravipausi (tsüklilise kasutamise korral) on sobiv aeg ESTRAMON 50 ravi alustamiseks.

Kui olete kasutanud suuremat kogust ESTRAMON 50 kui peaksite

Kui olete kasutanud suuremaid koguseid, peate konsulteerima arstiga.

Üleannustamise võimalikud tunnused on iiveldus, oksendamine, rindade pingetunne ja tupeverejooks.

Kui esineb üleannustamise märke, tuleks ESTRAMON 50 eemaldada. Vajalik ravi peaks põhinema sümptomitel.

Kui olete unustanud ESTRAMON 50 kasutada

Ärge kandke kahekordset annust, kui olete eelneva pealekandmise unustanud.

Kui olete - kogemata - unustanud transdermaalse plaastri vahetada pärast 3. või 4. päeva, vahetage see kohe. Järgmine plaastri vahetus peaks toimuma tavapärasel päeval.

Vahelejäädud annused suurendavad läbimurdeverejooksu või määrimise tõenäosust.

Palun teavitage oma arsti, kui soovite oma ravi pikemaks ajaks katkestada.

Kui lõpetate ESTRAMON 50 ravi

Te ei tohiks ESTRAMON 50 ravi katkestada ega lõpetada ilma arstiga konsulteerimata. Kui lõpetate selle ravi, võib esineda ärajäämisverejooks.

Kui teile on planeeritud operatsioon

Kui teil on plaanis operatsioon, teavitage palun operatsiooni teostavat arsti, et kasutate ESTRAMON 50. 4 kuni 6 nädalat enne planeeritud operatsiooni võib olla vajalik ESTRAMON 50 kasutamine lõpetada, et vähendada tromboosi riski (vt jaotis 2, 'Venoossed verehüübed [tromboos]'). Palun konsulteerige oma arstiga; tema saab teile öelda, millal ESTRAMON 50 kasutamist jätkata.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, küsige oma arstilt või apteekrilt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed.

See ravim - nagu kõik ravimid - võib põhjustada teatud kõrvaltoimeid, kuid need ei pruugi teie puhul tingimata esineda.

Järgnevaid häireid on hormoonasendusravi kasutavatel naistel teatatud sagedamini kui mittekasutajatel:

- rinnavähk
- emaka limaskesta liigne kasv või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või vähk)
- munasarjavähk
- verehüübed jalgade või kopsude veenides (venoosne trombemboolia)
- südamehaigus
- insult
- mäluhäired (tõenäoline dementsus), kui hormoonasendusravi alustatakse üle 65-aastaselt

Lisateabe saamiseks nende kõrvaltoimete kohta vaadake jaotist 2.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised

Kui täheldate ühte või mitut järgmistest sümptomitest, vajate kohest arstiabi:

- äkiline valu rinnus
- rinnavalgu, mis kiirgub kätte või kaela
- hingeldus
- valulik turse ja punetus jalgades
- silma- ja näonaha kollakas värvumine, uriini tumenemine, sügelus (kollatõbi)
- ebatavaline tupeveritsus või määrimine (läbimurdeveritsus) pärast ESTRAMON 50 plaastrite pikaajalist kasutamist või pärast ESTRAMON 50 ravi lõpetamist
- muutused rinnas, eriti naha sissetõmbed, muutused nibudes ja tükid, mida saab näha või tunda (rinnavähk)
- valulikud menstruatsioonid
- ebaselged migreenilaadsed peavalud

Lõpetage ESTRAMON 50 kasutamine ja konsulteerige kohe oma arstiga, kui märkate ühte või mitut ülaltoodud sümptomitest. Pöörake tähelepanu hormoonasendusraviga üldiselt seotud riskidele (vt jaotis 2 'Hoiatused ja ettevaatusabinõud').

Muud kõrvaltoimed

Lisaks on ESTRAMON 50 kasutamisega seoses teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 patsienti 10-st)

- peavalud
- nahareaktsioonid manustamiskohas (sealhulgas nahaärritus, põletustunne, lööve, kuiv nahk, verejooks, verevalumid, põletik, turse, naha pigmentatsioon, nõgestõbi ja villid)
- rindade pingulolek ja valu rinnas
- valulikud menstruatsioonid, menstruatsioonihäired

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st)

- depressioon
- närvilisus
- meeleolumuutused
- unetus
- unisus
- iiveldus
- seedehäired

- kõhulahtisus
- kõhuvalu
- puhitustunne
- kõhu täitumise tunne
- suurenenud söögiisu
- akne
- lööve
- kuiv nahk
- sügelus
- seljavalu
- suurenenud rinnad
- tugev menstruatsiooniverejooks
- viskoosne valge kuni kollakas tupest väljumine
- ebaregulaarne tupest verejooks
- tugevad emaka kokkutõmbed
- vaginiit
- emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia)
- valu
- nõrkus
- vedelikupeetus (tursed) jäsemetes (käed ja jalad)
- kaalumuutus

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

- ärevus
- migreen
- peapööritus
- nägemisprobleemid
- kuivad silmad
- vererõhu tõus
- südamepekslemine
- oksendamine
- naha värvimuutus
- liigesvalu
- lihaste krampid
- teatud maksaensüümide tõus

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)

- talumatus
- muutused sugulises ihas
- kihelus või tuimus kätes ja jalgades
- venoossed verehüübed
- sapikivid
- muutused maksafunktsioonis ja sapi voolus
- juuste väljalangemine
- lihasnõrkus
- emaka leiomüoom
- munajuhade tsüstid

- emakakaela polüübid
- eritised piimanäärdest
- allergilised reaktsioonid nagu lööbed
- isutus

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)

- nõgestõbi
- raske allergilise reaktsiooni tunnused (sealhulgas hingamisraskused, näo, keele, kurgu või naha turse, pearinglus ja nõgestõbi)
- vähenenud süsivesikute taluvus
- silmade, pea ja kaela tahtmatud liigutused
- raskused kontaktläätsede kandmisel
- tõsised nahamuutused
- liigne karvakasv
- porfüüria halvenemine
- ninaverejooks

Teadmata (ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata)

- rinnavähk
- verehüübed
- valu jäsemetes
- ebanormaalsed maksafunktsiooni väärtused
- allergiline nahapõletik
- tükid rinnas (mittevähilised)

Sojaõli (Ph. Eur.) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on teatatud seoses teiste hormoonasendusravi preparaatidega:

- sapiteede häired
- erinevad nahahaigused
 - naha värvimuutus, eriti näol ja kaelal, nn raseduslaigud (kloasm)
 - valulikud, punakad nahasõlmed (erütem nodosum)
 - lööve ketendava punetuse või põletikuga (erütem multiforme)

Kõrvaltoimete teatamine

Kui märkate mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti või apteekriga. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Samuti saate kõrvaltoimetest otse teatada

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Föderaalne Ravimite ja Meditsiiniseadmete Instituut) osakond (osakond) Farmakovigilaansus

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175 Bonn

Veebisait: <https://www.bfarm.de>

Kõrvaltoimetest teatades võite aidata kaasa selle ravimi ohutuse kohta rohkem teabe kättesaadavaks tegemisele.

5. Kuidas säilitada ESTRAMON 50.

Hoidke seda ravimit laste eest kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast pakendil ja kotikesel märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg on vastava kuu viimane päev.

Säilitamistingimused

Ärge hoidke üle 30 °C.

Erijuhised hävitamiseks

Pärast kasutamist tuleb ESTRAMON 50 plaaster kokku voltida (kleepuv pind sissepoole!).

Ärge kunagi visake ravimeid kanalisatsiooni (nt ärge loputage neid tualetist või kraanikausist alla). Küsige oma apteegist, kuidas ravimit hävitada, kui olete selle kasutamise lõpetanud. See aitab kaitsta keskkonda. Lisateabe saamiseks vaadake <https://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung>.

6. Pakendi sisu ja muu teave.

Mida ESTRAMON 50 sisaldab

Toimeaine on: östradiool

1 transdermaalne plaaster suurusega 20 cm² sisaldab:

4,13 mg östradioolhemihüdraati, mis vastab 4 mg östradioolile

Keskmine östradiooli vabanemine päevas:

50 mikrogrammi

Teised koostisosad on:

Maatriks: Polü[(2-etuülheksüül)akrülaat-ko-metüülakrülaat-ko-akrüülhape-ko-(2,3-epoksüpropüül)metakrülaat] (62,2:32,0:5,7:0,03), RRR-alfa-tokoferooli preparaat (USP) (sisaldab sojaõli [Ph.Eur.])

Kandjafilm: Polüetüleentereftalaat

Kaitsekile: Polüetüleentereftalaat, silikoniseeritud

ESTRAMON 50 välimus ja pakendi sisu

ESTRAMON 50 on läbipaistev ovaalne transdermaalne plaaster kaitsekilega (eemaldada enne kasutamist) ja kahe funktsionaalse kihiga: östradiooli sisaldav isekleepuv maatriksikiht ja kandjafilm.

ESTRAMON 50 on saadaval pakendites, mis sisaldavad 6, 18 ja 24 transdermaalist plaastrit.

Võimalik, et kõiki pakendi suurusi ei turustata.

Ravimifirma ja tootja

Hexal AG Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Telefon: (08024) 908-0

Faks: (08024) 908-1290

E-post: service@hexal.com

Seda infolehte uuendati viimati 2023. aasta septembris.

Transtoyou