

Pakendi infoleht: teave kasutajale  
ATOZET 10 mg/10 mg kaetud tabletid  
ATOZET 10 mg/20 mg kaetud tabletid  
ATOZET 10 mg/40 mg kaetud tabletid  
ATOZET 10 mg/80 mg kaetud tabletid  
ezetimiib/atorvastatiin

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest siin on oluline teave teie jaoks.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on ATOZET ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit võtta?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu informatsioon

1. Mis on ATOZET ja milleks seda ravimit kasutatakse?

ATOZET on ravim, mis alandab kõrgeks tõusnud kolesterooli taset. See ravim sisaldab esetimiibi ja atorvastatiini.

Seda ravimit kasutatakse täiskasvanutel, et vähendada üldkolesterooli, 'halva' kolesterooli (LDL-kolesterooli) ja triglütseriidideks nimetatud rasvade sisaldust veres. Lisaks suurendab see ravim 'hea' kolesterooli (HDL-kolesterooli) taset.

See ravim alandab kolesterooli kahel viisil. See vähendab kolesterooli imendumist seedetraktis ja vähendab ka kolesterooli, mida teie keha ise toodab.

Kolesterool on üks mitmest rasvainest, mis on vereringes. Teie üldkolesterool koosneb peamiselt LDL- ja HDL-kolesteroolist.

LDL-kolesterooli nimetatakse sageli 'halvaks' kolesterooliks, kuna see võib koguneda teie veresoonte seintele, moodustades 'naastu'. Lõpuks võib see 'naast' kasvada ja põhjustada veresoonte ahenemist. See ahenemine võib aeglustada või blokeerida verevoolu elutähtsatesse organitesse, nagu süda või aju. See verevoolu blokeerimine võib põhjustada südameinfarkti või insulti.

HDL-kolesterooli nimetatakse sageli 'heaks' kolesterooliks, kuna see aitab vältida halva kolesterooli kogunemist veresoontesse ja kaitseb seeläbi südame-veresoonkonna haiguste eest.

Triglütseriidid on teine rasvavorm teie veres, mis võib suurendada südame-veresoonkonna haiguste riski.

Seda ravimit kasutatakse patsientidel, kelle kolesteroolitaset ei ole dieediga piisavalt alandatud. Selle ravimi kasutamisel peate jätkama oma kolesterooli alandavat dieeti.

Seda ravimit kasutatakse lisaks teie kolesterooli alandavale dieedile, kui teil on:  
kõrge kolesteroolitase veres (heterosügootne perekondlik ja mitte-perekondlik primaarne hüperkolesteroleemia) või liiga kõrge rasvasisaldus veres (segatüüpi hüperlipideemia)  
ja see ei ole piisavalt alandatud ainult statiiniga  
mille jaoks olete kasutanud statiini ja esetimiibi eraldi tablettidena.  
pärilik haigus (homo- ja perekondlik hüperkolesteroleemia), mis suurendab kolesterooli kontsentratsiooni veres. Teile võidakse määrata ka muid ravimeetodeid. südame- ja veresoonkonna haigused. See ravim vähendab südameataki, insuldi, südame verevoolu suurendava operatsiooni või haiglaravi riski rindkerevalu tõttu. See ravim ei aita teil kaalust alla võtta.

## 2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Olete allergiline selle ravimi mõne koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.  
Teil on maksahaigus või olete seda kunagi põdenud.  
Vereanalüüsid on näidanud seletamatuid ebanormaalseid maksafunktsiooni väärtusi.  
Olete fertiilses eas naine, kes ei kasuta usaldusväärset rasestumisvastast vahendit.  
Olete rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga.  
Kasutate glekapreviiri/pibrentasviiri kombinatsiooni C-hepatiidi raviks.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist:

kui teil on varem olnud insult koos verejooksuga ajus või ajus on vedelikku varasemate insultide tõttu,  
kui teil on neeruprobleemid,  
kui teil on kilpnäärme alatalitus (hüpotüreoidism),  
kui teil on olnud korduvat või seletamatut lihasvalu või lihasprobleemide ajalugu, ise või perekonnas,  
kui teil on varem olnud lihasprobleeme teiste lipiidide taset alandavate ravimite (näiteks teiste statiinide või fibraatide) ravi ajal,  
kui te tarvitate regulaarselt suures koguses alkoholi,  
kui teil on olnud maksahaigus,  
kui olete vanem kui 70 aastat,  
kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga,  
kui te kasutate praegu suukaudset või süstitavat ravimit, või olete viimase 7 päeva jooksul kasutanud ravimit nimega fusidiinhape (ravim bakteriaalse infektsiooni vastu). Fusidiinhappe ja ATOZETi kombinatsioon võib põhjustada tõsisid lihasprobleeme (rabdomüolüüs),  
kui teil on või on olnud müasteenia (haigus, mille puhul esineb üldine lihasnõrkus, mõnel juhul ka hingamislihaste nõrkus) või okulaarne müasteenia (haigus, mis põhjustab silmalihaste nõrkust), kuna statiinid võivad mõnikord seisundit halvendada või põhjustada müasteenia teket (vt lõik 4)

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekib seletamatu valu, tundlikkus või lihasnõrkus selle ravimi kasutamise ajal. Seda seetõttu, et harvadel juhtudel võivad lihasprobleemid olla tõsised, sealhulgas lihaste lagunemine, mis võib põhjustada neerukahjustusi. On teada, et atorvastatiin põhjustab lihasprobleeme. Lihasprobleeme on teatatud ka esetiimiibi kasutamisel.

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga, kui teil on pidev lihasnõrkus. Selle tõestamiseks ja ravimiseks võivad olla vajalikud täiendavad testid ja ravimid.

Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne selle ravimi võtmist:  
kui teil on raske kopsuhaigus.

Kui mõni ülaltoodud punktidest kehtib teie kohta (või kui te kahtlete), võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist, sest teie arst peab enne ja võib-olla ka ravi ajal tegema vereanalüüsi, et ennustada teie lihaste kõrvaltoimete riski. On teada, et lihaste kõrvaltoimete risk, nt. rabdomüolüüs, suureneb, kui teatud ravimeid võetakse samaaegselt (vt lõik 2 'Kas te kasutate veel teisi ravimeid?').

Selle ravimi kasutamise ajal jälgib teie arst hoolikalt, kas teil on diabeet või kas teil on suurenenud risk diabeedi tekkeks. Teil võib olla suurenenud risk diabeedi tekkeks, kui teil on kõrge veresuhkru- ja rasvade tase, kui teil on ülekaal ja kui teil on kõrge vererõhk.

Teavitage oma arsti kõigist oma meditsiinilistest seisunditest, sealhulgas allergiatest.

Selle ravimi ja fibraatide (kolesterooli alandavad ravimid) kombineeritud kasutamist tuleks vältida, kuna selle ravimi kasutamist koos fibraatidega ei ole uuritud.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat  
Seda ravimit ei soovitata lastele ja noorukitele kuni 18 aastat.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks ATOZETile veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate lähitulevikus teisi ravimeid kasutama? Teavitage sellest oma arsti või apteekrit. See kehtib ka ravimite kohta, mille jaoks te ei vaja retsepti.

Mõned ravimid võivad mõjutada selle ravimi toimet või võivad olla selle ravimi poolt mõjutatud (vt lõik 3). Sellised koostoimed võivad muuta ühe või mõlemad ravimid vähem tõhusaks. Lisaks võib see suurendada kõrvaltoimete riski või nende tõsidust, sealhulgas tõsist seisundit, mis lagundab lihaseid ja on tuntud kui 'rabdomüolüüs', nagu kirjeldatud lõigus 4:

tsüklosporiin (ravim, mida sageli kasutatakse elundisiirdamiste korral),  
erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin, fusidiinhape\*\*, rifampitsiin  
(antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide vastu),  
ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, flukonasool, posakonasool (seenevastased ravimid)  
gemfibrosiil, teised fibraadid, nikotiinhappe sarnased ained, kolestipool, kolestüramiin  
(ravimid lipiidide taseme reguleerimiseks),  
mõned kaltsiumikanali blokaatorid, mida kasutatakse rinnavalgu (stenokardia) või kõrge vererõhu vastu, nt amlodipiin, diltiaseem,  
digoksiin, verapamiil, amiodaroon (kasutatakse ebaregulaarse südamerütmi raviks),

ravimid HIV ja AIDSi raviks, nt ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir, kombinatsioon tipranaviir/ritonaviir jne, mõned ravimid, mida kasutatakse C-hepatiidi raviks, nt telapreviir, botsepreviir ja kombinatsioon elbasviir/grazopreviir daptomütsiin (ravim, mida kasutatakse raskesti ravitavate naha ja nahakudede infektsioonide ning baktereemia (kus bakterid on teie veres) raviks).

\*\* Kui peate võtma fusidiinhapet suu kaudu bakteriaalse infektsiooni raviks, peate selle ravimi kasutamise ajutiselt lõpetama. Teie arst ütleb teile, millal on ohutu ATOZETi uuesti kasutada. ATOZETi kasutamine koos fusidiinhappega võib harvadel juhtudel põhjustada lihasnõrkust, -tundlikkust või -valu (rabdomüolüüs). Lisateavet rabdomüolüüsi kohta vt lõik 4.

Teised ravimid, millel on teadaolevalt koostoimeid selle ravimiga suukaudsed rasestumisvastased vahendid (ravimid raseduse vältimiseks), stiripentool (krambivastane ravim, mida kasutatakse epilepsia korral), tsimetidiin (kasutatakse kõrvetiste ja mao-soolehaavandite korral), fenasoon (valuvaigisti), antatsiidid (maohapet neutraliseerivad ained, mis sisaldavad alumiiniumi või magneesiumi), varfariin, fenprokumoon, atsenokumarool või fluindioon (ravimid verehüüvete vältimiseks), kolhitsiin (ravim podagra raviks), naistepuna (ilma retseptita saadaval olev ravim depressiooni raviks).

Millele peate tähelepanu pöörama toidu, joogi ja alkoholiga?

Vaadake jaotist 3 juhiste saamiseks selle ravimi kasutamise kohta. Pöörake tähelepanu järgmisele:

**Greibimahl**

Ärge jooge rohkem kui üks või kaks väikest klaasi greibimahla päevas, kuna suured kogused greibimahla võivad muuta selle ravimi toimet.

**Alkohol**

Vältige liigset alkoholi tarbimist selle ravimi kasutamise ajal. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2 'Millal peate selle ravimiga olema eriti ettevaatlik?'.

**Rasedus ja imetamine**

Ärge kasutage seda ravimit, kui olete rase, proovite rasestuda või arvate, et võite olla rase. Ärge kasutage seda ravimit, kui võite rasestuda, välja arvatud juhul, kui kasutate usaldusväärseid rasestumisvastaseid meetmeid. Kui rasestute selle ravimi kasutamise ajal, lõpetage kohe selle võtmine ja rääkige oma arstiga.

Ärge kasutage seda ravimit, kui toidate last rinnaga.

Selle ravimi ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole veel tõestatud.

Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt enne ravimi kasutamist.

**Autojuhtimine ja masinate kasutamine**

Eeldatavasti ei mõjuta see ravim teie autojuhtimisvõimet ega masinate kasutamise võimet. Siiski peate arvestama, et mõned inimesed võivad pärast selle ravimi võtmist tunda pearinglust.

ATOZET sisaldab laktoosi

ATOZET tabletid sisaldavad suhkrut, mida nimetatakse laktoosiks. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

ATOZET sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, see tähendab, et see on sisuliselt 'naatriumivaba' on.

### 3. Kuidas seda ravimit võtta?

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Teie arst määrab teile sobiva tableti tugevuse, sõltuvalt teie praegusest ravist ja isiklikust riskistaatusest. Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Enne selle ravimiga alustamist peate järgima kolesterooli alandavat dieeti.

Te peate seda kolesterooli alandavat dieeti jätkama ka selle ravimi kasutamise ajal.

Kui palju võtta

Soovitav annus on 1 tablett seda ravimit suu kaudu üks kord päevas.

Millal võtta

Seda ravimit võib võtta igal kellaajal. Võite seda ravimit võtta koos toiduga või ilma.

Kui arst on selle ravimi määranud koos teise kolesterooli alandava ravimiga, mille toimeaine on kolestüramiin või mõni muu sapphapet siduv vaik, peate seda ravimit võtma vähemalt 2 tundi enne või 4 tundi pärast sapphapet siduva vaigu manustamist.

Kas olete võtnud liiga palju seda ravimit?

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kas unustasite seda ravimit võtta?

Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha, vaid jätkake järgmisel päeval tavapärase skeemiga.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest või sümptomitest, lõpetage tablettide võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, keele ja kurgu turset, mis võib viia tõsiste hingamisprobleemideni

tõsine seisund, mille korral esineb naha tugev ketendus ja turse, naha, suu, silmade, suguelundite villid ja palavik; nahalööve roosakasapunaste laikudega, eriti peopesadel või jalataldadel, võimalik, et villidega

lihasnõrkus, -tundlikkus, -valu või -rebenemine või uriini punakaspruun värvus, eriti kui tunnete end samal ajal halvasti või teil on kõrge kehatemperatuur. Selle põhjuseks võib olla ebanormaalne lihaste lagunemine, mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemideni (rabdomüolüüs).

luupusesarnane sündroom (seisund, kus immuunsüsteem pöörduv keha enda vastu, sümptomiteks on nahalööve, liigesprobleemid, vererakkude põletik/hälve, veresoonte põletik).

Kui teil tekivad ootamatud või ebatavalised verejooksud või verevalumid, võib see viidata maksahaigusele. Pöörduge võimalikult kiiresti arsti poole.

Järgmisi kõrvaltoimeid on sageli teatatud (esinevad vähem kui 1-l 10-st kasutajast):  
kõhulahtisus,  
lihasvalu.

Järgmisi kõrvaltoimeid on mõnikord teatatud (esinevad vähem kui 1-l 100-st kasutajast):  
gripp,  
depressioon; unehäired; unehäire,  
pearinglus; peavalu; surin,  
aeglane südametegevus,  
kuumahood,  
hingeldus,  
kõhuvalu; puhitus; kõhukinnisus; seedehäired; gaasid; sagedasem roojamine; mao põletik; iiveldus; maovaevused; maoärritus,  
akne; nõgestõbi (urtikaaria),  
liigesevalu; seljavalu; jalakrambid; väsimus, lihasspasmid või nõrkus; valu kätes ja jalgades,  
ebatavaline nõrkus; väsimustunne või halb enesetunne; turse, eriti pahkludes (turse),  
kõrgemad tulemused mõnede vereanalüüside puhul maksa- või lihasfunktsiooni (CK) testimiseks,  
kaalutõus.

Järgmised kõrvaltoimed on teatatud sagedusega 'teadmata' (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata):

myasthenia gravis (haigus, mis põhjustab üldist lihasnõrkust, mõnel juhul hingamisel kasutatavates lihastes),  
okulaarne müasteenia (haigus, mis põhjustab silmalihaste nõrkust).

Võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekib käte või jalgade nõrkus, mis süveneb pärast aktiivsuse perioode, kahelinägemine või rippuvad silmalaud, neelamisraskused või hingeldus.

Lisaks on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest inimestel, kes on kasutanud seda ravimit või tablette, mis sisaldavad esetimiibi või atorvastatiini:

allergilised reaktsioonid, sealhulgas näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi (vajab kohest ravi),

suurenenud punane lööve, mõnikord sihtmärgilaadsete laikudega nahal, maksaprobleemid, köha, kõrvetised, söögiisu vähenemine; isukaotus, kõrge vererõhk, nahalööve ja sügelus; allergilised reaktsioonid, sealhulgas lööve ja nõgestõbi (urtikaaria), kõõlusevigastus, sapikivid või sapipõie põletik (mis võib põhjustada kõhuvalu, iiveldust ja oksendamist), kõhunäärme põletik, sageli tugeva kõhuvaluga, vererakkude arvu vähenemine, mis võib põhjustada verevalumeid/verejookse (trombotsütopeenia), ninakõrvalkoobaste põletik; ninaverejooks, kaelavalu; valu; valu rinnus; kurguvalu, veresuhkru taseme tõus ja langus (kui teil on diabeet, peate oma veresuhkru taset hoolikalt jälgima), õudusunenäod, sõrmede ja varvaste tuimus või surin, valu- või puuetundlikkuse vähenemine, maitse muutus; suukuivus, mälukaotus, kõrva ja/või pea kohin; kuulmislangus, oksendamine, röhitsemine, juuste väljalangemine, kehatemperatuuri tõus, uriinianalüüsid, mis on positiivsed valgete vereliblede suhtes, hägune nägemine; nägemisprobleemid, günekomastia (rindade suurenemine meestel).

Mõnede statiinidega on lisaks teatatud järgmistest võimalikest kõrvaltoimetest:

seksuaalsed probleemid, depressioon, hingamisprobleemid, sealhulgas püsiv köha ja/või hingeldus või palavik, diabeet (suhkruhaigus). See esineb tõenäolisemalt, kui teil on veres palju suhkruid ja rasvu, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk. Teie arst jälgib teid selle ravimi kasutamise ajal. pidev valu, tundlikkus või lihaskõrvaltoime, eriti kui tunnete end samal ajal halvasti või teil on kõrge palavik, mis ei pruugi kaduda pärast selle ravimi kasutamise lõpetamist (sagedus teadmata).

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Hollandi kõrvaltoimete keskusele Lareb, veebisait: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud pakendile pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp. Hoida originaalpakendis, et kaitsta hapniku eest.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või tualetti ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse vastutustundlikult ja ei satu keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu informatsioon

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeained on esetimiib ja atorvastatiin. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg esetimiibi ja 10, 20, 40 või 80 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina).

Muud ained selles ravimis on: kaltsiumkarbonaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumkroskarmelloos, hüdroksüpropüültselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, polüsorbaat 80, povidoon, naatriumlaurüülsulfaat.

Õhukese polümeerikatte koostis: hüpromelloos, makrogool 8000, titaandioksiid (E171), talk.

Kuidas ATOZET välja näeb ja kui palju on pakendis?

Valged kuni murtud valged, kapslikujulised, mõlemalt poolt kumerad, õhukese polümeerikattega tabletid.

ATOZET 10 mg/10 mg tabletid: ühele küljele on pressitud '257'.

ATOZET 10 mg/20 mg tabletid: ühele küljele on pressitud '333'.

ATOZET 10 mg/40 mg tabletid: ühele küljele on pressitud '337'.

ATOZET 10 mg/80 mg tabletid: ühele küljele on pressitud '357'.

Pakendi suurused:

Blisterpakendid, mis sisaldavad 10, 30, 90 ja 100 kilekattega tabletti lämmastikuga täidetud alumiinium/alumiinium blistrites (oPA-AI-PVC vormfoolium alumiiniumkattega).

Üksikpakendid, mis sisaldavad 30x1 ja 45x1 kilekattega tabletti lämmastikuga täidetud alumiinium/alumiinium blistrites (oPA-AI-PVC vormfoolium alumiiniumkattega).

Mitte kõiki loetletud pakendi suuruseid turustata.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holland

Tel.: 00800 66550123

E-post: [dpoc.benelux@organon.com](mailto:dpoc.benelux@organon.com)

Tootja:

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Holland

Organon Heist bv  
Industriepark 30  
2220 Heist-op-den-Berg  
Belgia

Organon N.V.  
Kloosterstraat 6  
5349 AB Oss  
Holland

Registrisse kantud:

ATOZET 10 mg/10 mg, kaetud tabletid RVG 114373

ATOZET 10 mg/20 mg, filmkaetud tabletid RVG 114374

ATOZET 10 mg/40 mg, õhukese polümeerikattega tabletid RVG 114375

ATOZET 10 mg/80 mg, õhukese polümeerikattega tabletid RVG 114376

See ravim on registreeritud EEA liikmesriikides järgmiste nimede all:

ATOZET: Belgia, Bulgaaria, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Island, Itaalia, Horvaatia, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Hispaania, Rootsi

LIPTRUZET: Küpros, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari

ZOLETORV: Tšehhi

Seda pakendi infolehte on viimati kinnitatud juulis 2023.

Lisateavet selle ravimi kohta leiate Ravimiameti veebisaidilt ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)).