

Pakendi infoleht: teave kasutajale
FINASTERIDE ACCORD 1 MG KAETUD TABLETID
Finasteriid

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest siin on oluline teave teie jaoks.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.

Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.

Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Finasteride Accord ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Finasteride Accord ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Finasteride Accord sisaldab finasteriidi. Finasteriid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5-alfa-reduktaasi inhibiitoriteks.

Teie arst on teile selle ravimi määranud, kuna te kannatate meeste hormoonide mõjul tekkinud kiilaspäisuse all (tuntud ka kui androgeenne alopeetsia). See ravim hoiab ära edasise juuste väljalangemise meestel. Mehed, kellel on kerge kuni mõõdukas, kuid mitte täielik juuste väljalangemine, võivad oodata kasu selle ravimi kasutamisest. See ravim pärsib olulist ensüümi (5 α -reduktaas tüüp 2), mis on seotud juuksefolliikulite regulatsiooniga. Peanahal vähendab see ravim peamiselt DHT kontsentratsiooni, ainet, mis oluliselt soodustab juuste väljalangemist meestel. Sel viisil aitab see ravim kiilaspäisuse protsessi tagasi pöörata ja edasist juuste väljalangemist vältida.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete naine (sest seda ravimit tohib kasutada ainult mehed, vt jaotist 'Rasedus'). Kliinilised uuringud on näidanud, et see ravim ei toimi naiste juuste väljalangemise korral.

Te olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate selle infolehe jaotisest 6.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

Mõju eesnäärmespetsiifilisele antigeenile (PSA)

See ravim võib mõjutada vereanalüüsi tulemusi, mida nimetatakse PSA-ks (eesnäärmespetsiifiline antigeen). Seda testi kasutatakse eesnäärmevähi uuringutes. Kui teete PSA-testi, rääkige oma arstile või apteekrile, et kasutate seda ravimit, kuna see ravim vähendab PSA kontsentratsiooni.

Mõju viljakusele

Viljatus on teatatud meestel, kes on pikka aega kasutanud finasteriidi ja kellel on ka teisi riskitegureid, mis võivad viljakust mõjutada. Pärast finasteriidi kasutamise lõpetamist on teatatud, et seemnevedeliku kvaliteet paranes või muutus normaalseks. Pikaajalisi uuringuid finasteriidi mõju kohta meeste viljakusele ei ole tehtud.

Rinnavähk

Vt jaotis 4.

Meeleolumuutused ja depressioon

Meeleolumuutused nagu depressiivne meeleolu, depressioon ja harvemini suitsiidimõtted on teatatud patsientidel, keda raviti Finasteride Accord'iga. Lõpetage Finasteride Accord 1 mg kasutamine, kui teil tekib mõni neist sümptomitest, ja võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga meditsiinilise nõu saamiseks.

Mõnel patsiendil on teatatud seksuaalfunktsiooni langusest. See võib kaasa aidata meeleolumuutustele, sealhulgas suitsiidimõtetele. Kui teil esineb seksuaalfunktsiooni languse kaebusi, võtke ühendust oma arstiga edasise meditsiinilise nõu saamiseks. Teie arst võib kaaluda ravi lõpetamist (vt allpool jaotis 4 lisateabe saamiseks nende kõrvaltoimete kohta).

Patsientide kaart, mis tuletab meelde ülaltoodut, on kaasas Finasteride Accord 1 mg tablettide pakendiga.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

Seda ravimit ei tohi kasutada lapsed. Puuduvad andmed, mis näitaksid finasteriidi efektiivsust või ohutust alla 18-aastastel lastel.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Finasteride Accordile ka teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate lähitulevikus teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile. See kehtib ka ravimite kohta, mille jaoks te ei vaja retsepti.

Millele peaksite toidu osas tähelepanu pöörama?

Seda ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Finasteride Accord 1 mg on mõeldud ainult meeste juuste väljalangemise raviks. Viljakuse mõju kohta vaadake jaotist 2.

Naised ei tohi Finasteride Accord 1 mg kasutada raseduse ajal esineva riski tõttu. Ärge puudutage purustatud või katki läinud Finasteride Accord 1 mg tablette, kui olete naine ja olete rase või võite olla rase.

Kui selle ravimi toimeaine satub raseda naise organismi või imendub läbi naha, võib see põhjustada meessoost lapse suguelundite väärarenguid.

Kui rase naine puutub kokku purustatud või katki läinud Finasteride Accord 1 mg tablettidega, pöörduge oma arsti poole.

Tablettide kilekate hoiab normaalsel kasutamisel ära kokkupuute toimeainega, kui tablette ei purustata ega katki tehta.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Puuduvad andmed, mis näitaksid, et see ravim mõjutab autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet.

Finasteride Accord sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et olete teatud suhkrute suhtes ülilitundlik, võtke enne selle ravimi võtmist ühendust oma arstiga.

Finasteride Accord sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta ja on seega sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst või apteeker on teile öelnud. Kas teil on kahtlusi õige kasutamise osas? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus on üks tablett sellest ravimist päevas (vastab 1 mg finasteriidile). Kilekattega tabletti võib võtta tühja kõhuga või koos toiduga. Kilekattega tabletid tuleb alla neelata tervelt ja neid ei tohi purustada ega katki teha.

See ravim ei toimi kiiremini ega paremini, kui võtate seda sagedamini kui üks kord päevas.

Meeste juuste väljalangemine on seisund, mis areneb pika aja jooksul. Üldiselt võib olla vajalik seda ravimit kasutada iga päev 3 kuni 6 kuud, enne kui märkate, et teie juuste tihedus suureneb või juuste väljalangemine väheneb.

Teie arst aitab teil kindlaks teha, kas see ravim teile sobib. On oluline, et jätkaksite selle ravimi kasutamist nii kaua, kui arst on määranud.

Patsiendid, kellel on maksafunktsiooni häired

Kogemused selle ravimi kasutamisega piiratud maksafunktsiooniga patsientidel puuduvad (vt ka 'Millal peate selle ravimiga olema eriti ettevaatlik').

Patsiendid, kellel on neerufunktsiooni häired

Neerufunktsiooni häiretega patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Kas olete võtnud liiga palju seda ravimit

Kui olete võtnud liiga palju seda ravimit või kui keegi teine on seda võtnud, võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Võtke ülejäänud tabletid või tühi karp kaasa, et ravimit oleks lihtsam tuvastada.

Kas unustasite seda ravimit võtta?

Kui unustasite seda ravimit võtta, võite unustatud annuse vahele jätta. Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Soovitav on jätkata selle ravimi kasutamist maksimaalse efekti saavutamiseks. Kui katkestate ravi vahepeal, on tõenäoline, et kaotate uuesti saavutatud juuksekasvu 9 kuni 12 kuu jooksul.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi mitte kõigil ei pruugi neid esineda. Mõned kõrvaltoimed on ajutised ja kaovad ravi käigus või pärast ravi lõpetamist.

Lõpetage selle ravimi kasutamine ja võtke kohe ühendust arstiga, kui teil esineb üks järgmistest:

Allergilise reaktsiooni sümptomid: huulte, näo, keele või kurgu turse;
neelamisraskused; nahalööbed (nõgestõbi) ja hingamisraskused.
Enesetapumõtted

Teatage oma arstile kohe muutustest rinnakoes, nagu tükid, valu, rinnanäärme suurenemine või eritised nibust, kuna need võivad olla tõsise seisundi, näiteks rinnavähi, tunnused.

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l inimesel 100-st):

vähenenud seksuaalsoov
ereksioonihäired
ejakulatsiooniprobleemid, sealhulgas seemnevedeliku (sperma) hulga vähenemine
seksi ajal
depressioon

Pole teada (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata):

allergilised reaktsioonid nagu lööve, sügelus, tugev sügelus ja kublad (nõgestõbi, urtikaaria) ning huulte ja näo turse
valulikud või paistes rinnad
munandite valu
veri spermas
kiire südametegevus
püsivad erektsioonihäired pärast ravi lõpetamist
püsiv vähenenud seksuaalsoov pärast ravi lõpetamist
püsivad ejakulatsiooniprobleemid pärast ravi lõpetamist
viljatus on teatatud meestel, kes on pikka aega kasutanud finasteriidi ja kellel on olnud muid viljakust mõjutavaid riskitegureid. Pärast finasteriidi ravi lõpetamist on teatatud, et seemnevedeliku kvaliteet paranes või muutus normaalseks. Finasteriidi mõju kohta meeste viljakusele ei ole läbi viidud pikaajalisi uuringuid.
muutused maksa talitluses, mida saab kindlaks teha vereanalüüsi abil
ärevus
Enesetapumõtted

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Hollandi kõrvaltoimete keskusele Lareb. Veebisait: www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatades saate aidata meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Selle ravimi jaoks ei ole eritingimusi säilitamiseks.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud karbile pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja viimane päev.
Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse vastutustundlikult ja ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on finasteriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg finasteriidi.

Muud selles ravimis sisalduvad ained on:

Tableti südamik: laktoosmonohüdraat; mikrokristalne tselluloos (E460); eelželatiniseeritud tärklis (mais); naatriumtärklisglükolaat (tüüp A); lauroülmakrogoolglütseriidid; magneesiumstearaat (E572).

Filmkate: hüpromelloos (E464); titaandioksiid (E171); makrogool 6000; punane raudoksiid (E172); kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Finasteride Accord välja näeb ja kui palju on pakendis?

Õhukese polümeerikattega tablett.

Finasteride Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid on punakaspruunid, ümmargused, mõlemalt poolt kumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus 'F1' ja teisel küljel pole märgistust.

Finasteride Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pakitud alumiinium/alumiinium blisterpakenditesse, mis sisaldavad 28, 30, 84 ja 98 tabletti.

Mitte kõiki nimetatud pakendi suurusi ei turustata.

Registrisse kantud all: RVG 100577

Müügiloa hoidja
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Holland

Tootja
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Holland

Laboratorios Normon S.A.
Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 Tres Cantos, Madrid, Hispaania

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.
ul. Lutomiarska 50, 95-200 Pabianice, Poola

Accord Healthcare Single Member S.A.
64th Km National Road Ateena
Lamia, Schimatari, 32009, Kreeka

See ravim on registreeritud EMP liikmesriikides järgmiste nimede all:

Liikmesriigi nimi Ravimi nimi

| | |
|----------|---|
| Eesti | Finasteride Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid |
| Itaalia | Finasteride AHCL 1 mg Compresse rivestite con film |
| Läti | Finasteride Accord 1 mg apvalkotās tabletes |
| Holland | Finasteride Accord 1 mg Filmomhulde Tabletten |
| Malta | Finasteride 1 mg Film-coated Tablets |
| Portugal | FINOX 1 mg comprimidos revestidos por película |

| | |
|-----------------|--|
| Hispaania | Finasterida Normon 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG |
| Ühendkuningriik | Finasteride 1 mg Film-coated Tablets |
| Bulgaaria | Finasteride Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid |
| Küpros | Finasteride Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid |
| Poola | Finahit, 1 mg, kaetud tabletid |
| Rootsi | Finasteride Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid |

Seda pakendi infolehte uuendati viimati septembris 2025.

Transtoyou